

OUTLOOK

| | |
|---|---|
| E N E L I N T E R I O R | |
| Anticonceptivos Orales Con Nuevas Progestinas y el Riesgo de Tromboembolia Venosa (TEV) | 6 |
| Las Vacunas Antitetánicas No Contienen Un Inmunógeno Anticonceptivo | 7 |

ARTÍCULO PRINCIPAL

Criterios de Elegibilidad de la OMS para el Uso de Anticonceptivos: Inyectables Combinados y Esterilización

Este es el segundo de una serie de artículos que presentan los nuevos criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar el uso de métodos anticonceptivos. En este número se incluyen los criterios de elegibilidad para tres métodos: los inyectables combinados, la esterilización masculina y la esterilización femenina. (Los criterios para los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos de progestinas puras, los DIU con cobre y los métodos de barrera se presentaron en el último número de *Outlook*, Volumen 13, Número 4). Estos criterios revisados están basados en las conclusiones de un grupo de trabajo constituido por científicos de 21 países; el grupo de trabajo realizó una revisión a fondo de la evidencia epidemiológica y clínica con respecto a la elegibilidad para cada método. El propósito es que estos criterios sean usados por los encargados de los programas de planificación familiar y salud reproductiva en la preparación de pautas para la entrega de servicios.

La puesta en práctica de estos nuevos criterios puede ayudar a mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar, eliminando las barreras innecesarias tanto médicas como de entrega de servicios. En el Volumen 13, Número 4 de *Outlook* se resumieron las principales conclusiones de los nuevos criterios de elegibilidad que pudieran afectar la práctica de los proveedores. Por ejemplo, la OMS concluyó que —en la medida en que el historial del cliente haya sido correctamente registrado y que no se especifique otra cosa— no es requisito efectuar exámenes de diagnóstico clínico y de laboratorio para el uso seguro de un método anticonceptivo.

Al fijar los nuevos criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, la OMS reconoció que la calidad de los servicios y accesibilidad son esenciales para una provisión adecuada de los métodos. Otras consideraciones importantes sobre la entrega de servicios se incluyen en el cuadro de la próxima página.

Consideraciones sobre la Entrega de Servicios

En los diferentes lugares donde se llevan a cabo programas de anticoncepción existen otras consideraciones programáticas y de entrega de servicios además de los criterios de elegibilidad. Los criterios de entrega de servicios concernientes a la provisión de todos los métodos anticonceptivos son:

Elección informada: las/los clientes deben recibir la información adecuada para proceder a una elección voluntaria informada.

Entrenamiento/instalaciones: el personal debe recibir el entrenamiento adecuado y las instalaciones deben estar debidamente equipadas, especialmente aquéllas que ofrecen métodos quirúrgicos;

Logística: se deben adquirir y mantener el equipo y los suministros necesarios para proporcionar un determinado método; también deben determinarse los recursos necesarios para el tratamiento de eventuales complicaciones.

Asesoramiento y selección: los proveedores de servicios deben recibir entrenamiento y pautas (resumen de historias clínicas, ficha con antecedentes médicos, etc.) que les ayuden a determinar si los clientes presentan alguna condición en que el uso de ciertos métodos anticonceptivos implique riesgos inaceptables para su salud.

Anticonceptivos Inyectables Combinados—hasta ahora un enfoque cauteloso

En la Tabla 1 aparece un resumen de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para iniciar el uso de anticonceptivos inyectables combinados. Si Ud. desea obtener una descripción completa de los criterios de elegibilidad para todos los métodos, escriba a la OMS (la dirección aparece al final de este artículo). Con el fin de establecer los nuevos criterios para los inyectables combinados, se tomaron en cuenta dos formulaciones: el Cyclofem® (acetato de medroxiprogesterona más estradiol cipionato) y Mesigyna® (enantato de noretisterona más estradiol valerianato).

La mayoría de las restricciones para el uso de los inyectables combinados, al igual que los AO de dosis bajas, se relacionan con su componente de estrógenos. Se piensa que el tipo y la magnitud de los efectos secundarios asociados a los estrógenos en los anticonceptivos inyectables combinados son menores que en el caso de los AO combinados; ello porque la acción de los estrógenos en los anticonceptivos inyectables combinados es de menor duración y su potencia es también menor. Por ejemplo, estudios de corto plazo con inyectables combinados han mostrado efectos menores sobre la presión arterial, la coagulación sanguínea, el metabolismo de los lípidos y la función hepática comparados con los AO combinados. Al mismo tiempo, a diferencia de los AO, las hormonas anticonceptivas asociadas con los inyectables combinados permanecen en el sistema de la mujer por varias semanas después de que se ha discontinuado su uso.

Debido a que existe poca evidencia epidemiológica sobre los efectos a largo plazo de los inyectables combinados, el comité de la OMS analizó cuidadosamente las

condiciones médicas que se ven afectadas por los estrógenos. En consecuencia, muchos de los criterios de elegibilidad para los inyectables combinados se clasificaron en la misma categoría que los de los AO combinados. Las condiciones que fueron clasificadas como menos restrictivas que para los AO incluyeron aquéllas que afectan la función hepática (tales como cirrosis, ictericia, afección a la vesícula biliar y tumor del hígado) y aquéllas relacionadas con la presión sanguínea y enfermedades cardíacas (ser fumadora y sufrir de hipertensión moderada). En la Tabla 1 se destacan las condiciones que fueron clasificadas en forma diferente que para los AO.

Como con todos los métodos, en la provisión de los inyectables combinados hay que considerar una serie de factores además de los criterios de elegibilidad médica. Asesorar a las mujeres a fin de que entiendan los posibles efectos secundarios, el posible retraso en la recuperación de la fertilidad y la importancia de colocarse la inyección en la fecha prescrita son de especial importancia. También es importante desarrollar sistemas para ayudar a las mujeres a recordar la fecha en que deben colocarse la inyección mensual y hacer un seguimiento de las mujeres que pudieran olvidarse de ellas.

Esterilización—el asesoramiento y la evaluación son elementos esenciales

La Tabla 2 resume los criterios actualizados de elegibilidad para la esterilización femenina. La OMS usó un sistema de clasificación diferente en la evaluación de los criterios para la esterilización masculina y femenina que para los otros métodos anticonceptivos, en parte porque no existen razones médicas que justifiquen que un hombre o una mujer no puedan ser candidatos para una esterilización. El sistema de clasificación para la esterilización enfatiza más bien la necesidad de identificar condiciones que requieren de una precaución especial para efectuar el procedimiento, aquellas condiciones que justifican postergarlo o en las que se recomienda que se realice en un centro especializado (ver cuadro siguiente).

Clasificación de las Condiciones de Salud para Optar a una Esterilización

| | |
|---|---|
| Aceptar <input type="checkbox"/> | No existe razón médica para negar la esterilización a una persona con esta condición. |
| Precaución <input type="checkbox"/> | El procedimiento es realizado normalmente en un centro de rutina, pero se requiere precaución y una preparación especial. |
| Postergar <input type="checkbox"/> | El procedimiento debe ser postergado hasta que la condición sea evaluada y/o tratada. Se debe proporcionar temporalmente algún método anticonceptivo alternativo. |
| Especial <input type="checkbox"/> | El procedimiento debe realizarse en un centro donde haya un cirujano y personal especializados, el equipo necesario para proporcionar anestesia general y apoyo médico de respaldo. Se debe proporcionar temporalmente algún método anticonceptivo alternativo. |

TABLA 1

Criterios de Elegibilidad para Iniciar el Uso de Anticonceptivos Inyectables Combinados

Los anticonceptivos inyectables combinados (Cyclofem^R y Mesigyna^R) se administran mensualmente y liberan un estrógeno natural, más una progestina. Son apropiados para la mayoría de las mujeres que desean un método anticonceptivo altamente eficaz y reversible y que no están en riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Los estrógenos en los anticonceptivos inyectables combinados tienen una duración más corta y son menos potentes que los utilizados en los AO combinados; en consecuencia, también pueden diferir los efectos secundarios asociados con el uso de los dos métodos. En esta tabla, las condiciones que aparecen **sombreadas** están clasificadas en forma diferente para los inyectables combinados que para los AO (en todos los casos, la clasificación es menos restrictiva).

Categoría 1 de la OMS: No hay restricciones para su uso

- Edad: desde la menarquia hasta los 40 años
- Obesidad
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Antecedente de pre-eclampsia
 - Antecedente de embarazo ectópico[†]
 - Post-aborto
 - ≥21 días postparto (no amamantando)
 - Sangrado menstrual irregular/dismenorrea
 - EIP (pasada o actual)[†]
 - Enfermedad benigna de la mama
 - Ectropion/erosión cervical
 - Fibromas uterinos
 - Cáncer del endometrio u ovárico
 - Enfermedad trofoblástica gestacional
 - Antecedente de diabetes del embarazo
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Enfermedad de la tiroides
 - Epilepsia
 - Hepatitis (portadora, caso no activo)
 - Esquistosomiasis
 - Malaria
 - Anemia por insuficiencia de hierro
 - Tuberculosis
- Riesgo de ETS/VIH (aconsejar uso del condón)
 - Aumento del riesgo de ETS/VIH
 - ETS (pasada o actual)
 - VIH positiva o SIDA

Categoría 2 de la OMS: Las ventajas superan a los riesgos

- Edad >40 años
- Fumadora < 35 años o fumadora leve > 35 años
- Dolores de cabeza (incluyendo jaqueca sin síntomas neurológicos focales)
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Lactancia (>6 meses postparto)
 - Enfermedad de la mama—masa no diagnosticada
 - Antecedente de ictericia (asociada al embarazo, a los AO, o a los inyectables combinados)
 - Cáncer cervical o lesiones precancerosas
- Condiciones Cardiovasculares
 - Afección a las válvulas del corazón, sin complicaciones
 - Hipertensión moderada (PA < 160/100)^{††}
 - Tromboflebitis superficial
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Talasemia
 - Anemia falciforme
 - Diabetes sin complicaciones
 - Enfermedad a la vesícula biliar actual o tratada médicamente
 - Cirrosis leve (compensada)

Categoría 3 de la OMS: Los riesgos superan a las ventajas

- Fumadora excesiva (>20 cigarrillos diarios), edad >35 años
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Lactancia (6 semanas-6 meses postparto)
 - <21 días postparto (no amamantando)
 - Antecedente de cáncer de mama
 - Sangrado vaginal de causa desconocida
- Condiciones Cardiovasculares
 - Historia de hipertensión o PA 160/100-180/100
 - Hiperlipidemias conocidas[‡]
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Uso de ciertos antibióticos o anticonvulsivantes[‡]
 - Cirrosis aguda (descompensada)
 - Tumores del hígado (benignos)

Categoría 4 de la OMS: No usar

- Jaquecas con síntomas neurológicos focales
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Embarazo o sospecha de embarazo
 - Lactancia (<6 semanas postparto)
 - Cáncer de mama (actual)
- Condiciones Cardiovasculares
 - Hipertensión severa (PA ≥ 180/110) con o sin enfermedad vascular
 - Antecedente o presencia de afección tromboembólica o apoplejía
 - Antecedente o presencia de isquemia o cardiopatía valvular complicada
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Diabetes con ciertas complicaciones vasculares y/o más de 20 años de duración^{‡‡}
 - Hepatitis activa^{‡‡}
 - Tumores del hígado (malignos)^{‡‡}

† Los anticonceptivos inyectables combinados pueden proteger de esta condición.

†† La PA debe ser monitoreada periódicamente.

‡ Podría ser Categoría 2 en los casos menos graves.
 ‡ Ciertos antibióticos (rifampicina y griseofulvina) y drogas anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbitúricos y primadona) probablemente reducen la eficacia de los anticonceptivos hormonales
 ‡‡ Podrían ser Categoría 3 dependiendo de la condición específica y de su gravedad.

TABLA 2

Criterios Médicos de Elegibilidad para la Esterilización Femenina

La esterilización femenina es un método anticonceptivo quirúrgico altamente eficaz que deber ser realizado por proveedores bien entrenados en un recinto apropiado. No existe condición médica alguna que restrinja el uso de este método por parte de las mujeres; algunos expertos aconsejan diferentes niveles de precaución. Dado que la esterilización es permanente, se debe prestar especial atención para asegurar que las mujeres escojan voluntariamente el método y que reciban un asesoramiento adecuado antes de tomar la decisión.

Aceptar: no existe razón médica alguna para negar el procedimiento

- Edad: menarquía hasta los 40 años o más
- Nuliparidad o baja paridad¹
- Fumadora
- Dolores de cabeza de cualquier índole
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Antecedente de embarazo ectópico
 - Postparto (<7 días o ≥42 días)
 - Lactancia
 - Post-aborto (sin complicaciones)
 - Sangrado menstrual irregular, leve o abundante
 - Antecedente de EIP (y posterior embarazo)
 - Enfermedad de la mama, excepto cáncer actual
 - Enfermedad trofoblástica gestacional
- Condiciones Cardiovasculares
 - Antecedente de desórdenes tromboembólicos
 - Hiperlipidemias conocidas
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Enfermedad de la tiroides (bocio simple)
 - Enfermedad de la vesícula biliar (asintomática o tratada médicamente)
 - Hepatitis (portadora, caso no activo), ictericia
 - Esquistosomiasis (sin complicaciones)
 - Malaria, TB (no pélvica)
- Riesgo de ETS/VIH (aconsejar uso del condón)
 - ETS dentro de los últimos 3 meses
 - Aumento del riesgo de ETS/VIH
 - VIH positiva

Precaución: realizarla con ciertas precauciones

- Obesidad
- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - EIP previa (sin embarazo posterior)
 - Cáncer de mama actual
 - Fibromiomas uterinos
- Condiciones Cardiovasculares
 - Antecedente de hipertensión/hipertensión moderada (PA<160/100)
 - Antecedente de isquemia cardíaca o infarto
 - Enfermedad no complicada de las válvulas del corazón (requiere antibióticos)
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Uso de ciertos antibióticos o anticonvulsivantes^{††}
 - Diabetes sin complicaciones
 - Hipotiroidismo
 - Talasemia
 - Anemia falciforme
 - Anemia moderada por insuficiencia de hierro
 - Cirrosis moderada (compensada)
 - Tumores del hígado (benignos o malignos)
 - Epilepsia
 - Esquistosomiasis con fibrosis del hígado[‡]
 - Hernia del diafragma
 - Enfermedad del riñón
 - Insuficiencia nutricional grave
 - Cirugía abdominal electiva concurrente

Postergar hasta que la condición sea evaluada y/o tratada

- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Embarazo
 - Post-parto (7-42 días)
 - Infección o hemorragia post-parto/post-aborto
 - Complicaciones recientes del parto[§]
 - Sangrado vaginal de causa desconocida
 - EIP dentro de los últimos 3 meses
 - Cáncer cervical, endometrial u ovárico
 - Enfermedad trofoblástica gestacional maligna
- Condiciones Cardiovasculares
 - Isquemia cardíaca actual^{¶¶}
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Enfermedad sintomática de la vesícula biliar
 - Hepatitis activa
 - Anemia grave por insuficiencia de hierro
 - Infección dérmica abdominal^{††}
 - Afección pulmonar aguda (bronquitis, neumonía)
 - Infecciones sistémicas o gastroenteritis^{***}
 - Cirugía abdominal de urgencia o infecciosa
- Riesgo de ETS/SIDA (aconsejar uso del condón)
 - ETS actual

Especial: realizar sólo en centros clínicos especializados

- Condiciones Gineco/Obstétricas
 - Cirugía previa del útero o infección uterina tratada
 - Endometriosis
 - Hernia (de pared abdominal o umbilical)
- Condiciones Cardiovasculares
 - Hipertensión grave o moderada (PA>160/100) o enfermedad vascular
 - Diabetes con complicaciones vasculares y/o diabetes de 20 años o más
 - Enfermedad complicada de las válvulas del corazón
- Enfermedades Crónicas/Otras Condiciones
 - Cirrosis grave (descompensada)
 - Hipertiroidismo
 - Trastornos de la coagulación
 - Enfermedad pulmonar crónica
 - Tuberculosis pélvica diagnosticada
- Riesgo de ETS/VIH (aconsejar uso del condón)
 - SIDA

Notas sobre la Tabla 2

- † Nuliparidad: el asesoramiento requiere un especial cuidado para asegurar que la cliente haga una elección informada.
- †† Antibióticos: rifampicina y griseofulvina; anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, barbitúricos y aprimadona.
- ‡ Si la fibrosis es grave, realizarla sólo bajo condiciones especiales.
- ◇ Incluye ruptura prolongada de membranas, trauma severo del tracto genital, ruptura o perforación uterina.
- ◇◇ Riesgo de anestesia y cirugía.
- Aumenta el riesgo de infección.
- Aumenta el riesgo de infección, complicaciones por deshidratación, efectos secundarios de la anestesia.

Para la esterilización femenina, las condiciones en las que se aconseja una precaución extra para el procedimiento incluyen antecedentes de hipertensión leve/enfermedad cardiovascular y muchas enfermedades crónicas (por ejemplo, talasemia, anemia falciforme, epilepsia); las condiciones que aconsejan postergar el procedimiento incluyen aquéllas asociadas a un parto reciente con complicaciones y presencia de enfermedad o infección; y las condiciones que aconsejan realizar la esterilización sólo en centros clínicos especializados incluyen condiciones graves que hacen que una cirugía abdominal sea dificultosa o riesgosa. En cualquier lugar que se realice el procedimiento debe haber un equipo de proveedores bien entrenados, así como recursos necesarios. Los procedimientos adecuados para asegurar asepsia son cruciales en la entrega de servicios de buena calidad.

Es muy importante asesorar adecuadamente antes de una esterilización femenina, a fin de determinar cuánto sabe la cliente de planificación familiar y proporcionarle la información adicional que pueda ayudarla a tomar una decisión informada. El consejero o proveedor debe también escuchar a la cliente atentamente para evaluar su disposición psicológica y emocional a ser sometida a una esterilización voluntaria. Si existen dudas, un concepto erróneo, o expectativas poco reales acerca del procedimiento significa que la cliente no se encuentra preparada para someterse al procedimiento.

Ya que la esterilización es un procedimiento de carácter permanente, es responsabilidad del proveedor asegurar que la cliente haya llegado a la decisión por elección voluntaria e informada. Se debe prestar especial atención a aquellos casos de hombres y mujeres jóvenes o que aún no han tenido hijos, así como a las/los clientes que presentan problemas de salud mental (incluyendo depresión), o a aquellas personas que viven situaciones de mucha tensión, tales como refugiados o víctimas de desastres naturales.²

Esterilización Masculina—pocas restricciones, pocas preocupaciones

La vasectomía es un procedimiento seguro; existen muy pocas condiciones médicas que influyen sobre la elegibilidad para optar a este procedimiento. La Tabla 3 proporciona una lista de aquellas condiciones médicas que ayudarán a decidir si hay que realizarlo tomando en cuenta ciertas precauciones, si hay que postergar el procedimiento o si se requieren procedimientos especiales. En general estas condiciones se clasifican en tres categorías: (1) anomalías de los órganos genitales que dificultan el procedimiento

o lo hacen más riesgoso, (2) infecciones que deben ser tratadas antes de realizar el procedimiento y (3) algunos desórdenes sistémicos que requieren precauciones especiales o una probable hospitalización. Al igual que la esterilización femenina, la vasectomía debe realizarse:

- con el asesoramiento adecuado para obtener un consentimiento informado,
- por proveedores bien entrenados, y
- en centros adecuados con buenos procedimientos de asepsia.

Cómo se utilizan las pautas de la OMS

La OMS está planificando preparar material de entrenamiento y protocolos clínicos que faciliten el uso de los nuevos criterios de elegibilidad en los programas de planificación familiar en todo el mundo. Mientras tanto, los programas y proveedores que usen los criterios de elegibilidad deben decidir la manera más eficaz y oportuna para evaluar la historia clínica de una cliente. Es particularmente importante identificar las condiciones de salud que requieren precauciones especiales o que restringen el uso de un determinado método.

Por ejemplo, para las clientes que escogen los inyectables combinados, primero es necesario responder preguntas básicas sobre la edad, historia reproductiva, si están amamantando o no y uso de otros medicamentos; luego es conveniente realizar preguntas específicas sobre

TABLA 3

Condiciones Médicas que Requieren Precaución, Postergación o Procedimientos Especiales Antes de Ofrecer una Vasectomía

Precaución: realizar con cierta precaución

- Herida previa del escroto
- Varicoceles
- Hidroceles
- Criptorquidismo

Postergar hasta que la condición haya sido evaluada y/o tratada

- Infecciones locales
 - Infección dérmica del escroto
 - ETS activa
 - Balanitis
 - Epididimitis u orquitis
- Infección sistémica o gastroenteritis
- Filariasis; elefantiasis
- Masa intraescrotal

Especial: realizada sólo en centros clínicos especializados

- Hernia inguinal
- Trastornos de la coagulación
- SIDA

las condiciones clasificadas en Categoría 3 o 4. (¿Fuma Ud. más de 20 cigarrillos diarios? ¿Ha tenido alguna vez cáncer de mama?) En los casos en que es difícil obtener información específica (por ejemplo, presencia conocida de hiperlipidemias), los programas deben decidir si es necesario definir los signos y síntomas que sugieren la presencia del trastorno, o si no es posible identificar la condición en ese centro. Los proveedores deben contar con la información necesaria que les permita evaluar las condiciones de salud y decidir cómo proceder cuando es difícil identificar una condición dada.

Para las condiciones de la Categoría 2, la imposibilidad de identificar una condición específica no representa un riesgo muy grande y, por lo tanto, puede ser apropiado agrupar las condiciones en una sola pregunta —por ejemplo, “¿Le han dicho alguna vez que tiene una enfermedad crónica como diabetes, anemia falciforme, problemas al corazón o de presión arterial?”

Cualquiera sea la manera en que los programas decidan usar los criterios de elegibilidad revisados, será importante adaptar su enfoque y terminología a las necesidades de la comunidad local. Puede ser útil ensayar previamente las preguntas que se le harán a los clientes para identificar aquéllas que son más fáciles de entender. También es importante realizar reuniones para introducir las pautas a los proveedores y así ayudarlos a identificar los posibles problemas y asegurar que se usen correctamente.

Conclusión

Las nuevas recomendaciones de la OMS proporcionan una base racional para proveer los diferentes métodos anticonceptivos. Están basadas en la más reciente información disponible acerca de la seguridad de los métodos. Las recomendaciones se pueden adaptar a las diversas situaciones y lugares en que se proveen los métodos anticonceptivos. Estas pautas tienen como objetivo ayudar a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos, manteniendo un alto nivel de calidad de atención.

1. Family and Reproductive Health/WHO. *Improving Access to Quality Care in Family Planning: Medical Eligibility Criteria for Initiating and Continuing Use of Contraceptive Methods*. Geneva: World Health Organization (1995).
2. *Safe and Voluntary Surgical Contraception*. World Federation of Health Agencies for the Advancement of Voluntary Surgical Contraception (1988).

NOTA DEL EDITOR: *Outlook* agradece la cooperación de la OMS en la preparación de este artículo. Si Ud. desea obtener una descripción más detallada de los criterios de elegibilidad para iniciar y continuar el uso de anticonceptivos, consulte el próximo informe de la OMS¹, que puede obtener escribiendo a Ms. Meena Cabral, Division of Family Health, WHO, CH-1211, Geneva 27, Switzerland.

En el artículo anterior sobre criterios de elegibilidad de la OMS (Vol. 13, Nº1), se infirió que la amenorrea de lactancia (LAM) presenta una tasa de falla relativamente alta. En realidad, los datos disponibles sugieren que la amenorrea de lactancia (LAM) es un método muy eficaz si se usa correctamente.

SEGURIDAD

Anticonceptivos Orales con Nuevas Progestinas y el Riesgo de Tromboembolia Venosa

Cuatro estudios recientes han indicado que los anticonceptivos orales (AO) combinados de dosis bajas que contienen las progestinas de tercera generación gestodene o desogestrel pueden aumentar el riesgo de tromboembolia venosa (TEV -formación de coágulos) comparados con los anticonceptivos orales (AO) de dosis bajas que contienen levonorgestrel o noretindrona.^{1,2,3,4,5} Los estudios sugieren que —comparadas con los AO que contienen levonorgestrel o noretindrona— las nuevas formulaciones pueden aumentar el riesgo de TEV en 1,5 a 2 veces y pueden ocasionar anualmente 10 a 20 casos adicionales de TEV por 100.000 usuarias (aunque las estimaciones presentan una gran variación). Sin embargo, el riesgo total de TEV entre las usuarias de la píldora sigue siendo la mitad o menos de la mitad del riesgo asociado al embarazo (cerca de 60 casos por 100.000 embarazos).^{3,6}

Sólo uno de los estudios realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó centros de países en desarrollo (donde no existe una amplia disponibilidad de AO con nuevas progestinas)¹. Al igual que los otros estudios, la OMS encontró un aumento del riesgo de TEV en las usuarias de píldoras combinadas (especialmente entre las mujeres de mayor peso o con antecedentes de presión arterial elevada durante el embarazo). Se determinó que el riesgo total de TEV era menor que el reportado en estudios previos de uso de AO y no hubo casos fatales por TEV. El aumento del riesgo de TEV fue detectado durante los primeros meses de uso de los nuevos AO y desapareció dentro de pocos meses después de su discontinuación. En un análisis específico del efecto de diferentes progestinas en los AO de dosis bajas sobre la TEV, los datos de la OMS mostraron en forma consistente una razón de riesgo más alta para los AO con desogestrel o gestodene que con los AO con levonorgestrel.²

Sin embargo, otro estudio que evaluó los datos provisorios de varios países europeos reportó que los AO con las progestinas más recientes pueden reducir el riesgo de infarto al miocardio (IM)⁷. El estudio reportó una razón de riesgo de 0,36 para IM entre las usuarias de AO con las

nuevas progestinas versus las usuarias de AO de segunda generación; sin embargo estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Ya que mueren muchas más mujeres de IM que de TEV, este resultado puede tener importantes implicaciones si se replica.

La asociación entre TEV y el tipo de progestina en las usuarias de AO fue inesperado. Las evaluaciones clínicas indicaron que el gestodene y desogestrel se asocia con un menor riesgo de efectos adversos sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos, comparadas con progestinas más antiguas. Por lo tanto, a menudo se asumió que las nuevas formulaciones de AO conllevarían un riesgo menor de enfermedades cardiovasculares que las píldoras que contienen las progestinas más antiguas y las mismas cantidades de estrógeno.

Los hallazgos de estos estudios concitaron preocupación entre varios grupos de asesoramiento médico. En el Reino Unido y Alemania algunos grupos llegaron incluso a publicar advertencias acerca de los riesgos potenciales asociados con el uso de AO de tercera generación, las que a su vez generaron controversias acerca de las implicaciones de los resultados de estos estudios.

Los expertos de la OMS recomendaron que estos descubrimientos fueran considerados a la luz de la evidencia que la incidencia de la TEV en las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo es baja, y que el riesgo adicional de TEV asociado al uso de los AO combinados más nuevos afecta a un número relativamente pequeño de mujeres. Además, las autoridades de la OMS indicaron que es necesario realizar más estudios, porque no se podía excluir la posibilidad de que estos resultados se debieran al azar o a algún sesgo. Mientras tanto, la OMS aconseja que los proveedores y las mujeres reciban información completa acerca de la posibilidad de un mayor riesgo de TEV asociado a las píldoras con gestodene o desogestrel, a fin de que puedan tomar una decisión informada sobre el uso de AO.

1. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Human Contraception. Venous thromboembolic disease and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. *The Lancet* 346(8990): 1575-1582 (December 16, 1995).
2. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Human Contraception. Effect of different progestogens in low oestrogen OCs on various thromboembolic disease. *The Lancet* 346(8990):1582-1588 (December 16, 1995).
3. Jick H., et al. Risk of idiopathic cardiovascular death and non-fatal venous thromboembolism in women using oral contraception with differing progestogen components. *The Lancet* 346(8990): 1589-1593 (December 16, 1995).
4. Spitzer, WO, et al. Third generation OCs and risk of venous thromboembolic disorders: an international case-control study. *British Medical Journal* 312: 83-88 (January 15, 1996).
5. Bloemenkamp, KWM, et al. Enhancement by factor V Leuven mutation of risk of deep vein thrombosis associated with OCs containing a third generation progestagen. *The Lancet* 346:1593-1596, (December 16, 1995).
6. Guillebaud J. Advising women on which pill to take. *British Medical Journal* 311:1111-1112 (October 28, 1995).
7. Lewis, MA, et al. Third generation OCs and risk of myocardial infarction: an international case-control study. *British Medical Journal* 312: (January 15, 1996).

Las Vacunas Antitetánicas No Contienen Un Inmunógeno Anticonceptivo

Recientemente se han reportado en México, Nicaragua, Filipinas y Tanzania¹ falsas acusaciones de que los programas de inmunización de la OMS están usando vacunas del toxoide tetánico (TT) que contienen un agente anti-fertilidad. Como resultado de estos falsos rumores, algunas mujeres se han negado a ser inmunizadas contra el tétanos, corriendo así el riesgo de contraer ellas y sus hijos aún no nacidos una enfermedad grave o fatal.

Sin embargo, el uso de la vacuna contra el tétanos en mujeres en edad reproductiva salva cada año aproximadamente a 700.000 niños y a 15.000 mujeres en todo el mundo de los efectos a menudo mortales del tétanos. Los rumores pueden estar afectando también los programas de planificación familiar, que enfatizan que la decisión de usar anticonceptivos debe tomarse en forma voluntaria después de haber recibido la información y el asesoramiento por parte de proveedores.

Los rumores pueden haberse originado de informes en la literatura científica sobre un ensayo clínico con una inmunización anticonceptiva que contenía el toxoide tetánico (TT) y proteínas de la difteria como portadores de una subunidad de gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona necesaria para que se produzca el embarazo.² La inoculación con hCG estimula la producción de anticuerpos anti hCG, lo que evita el embarazo. Sin embargo, la vacuna TT utilizada en los programas de inmunización no está asociada de modo alguno con este inmunógeno anticonceptivo experimental.

Los grupos que han difundido el rumor citan tres puntos principales como base de su denuncia. La OMS ha refutado cada uno de estos puntos.

Primero, los grupos cuestionan el hecho de que sean sólo mujeres en edad reproductiva las que reciban la vacuna TT. Toda las personas debieran estar protegidas contra el tétanos, y en los lugares donde se dispone de los recursos suficientes, se ofrece a toda la población. De acuerdo a la OMS, el centrarse en las mujeres en edad reproductiva es especialmente importante para prevenir el tétanos neonatal, ya que la inmunización de la mujer antes o durante el embarazo protege también al recién nacido. Los programas de la OMS están dirigidos también a todos los niños de menos de una año con una vacuna combinada triple: difteria, TT y pertussis (DTP).

Segundo, estos grupos cuestionan el por qué se necesitan múltiples inoculaciones, a pesar de que se supone que la eficacia de la vacuna es de 10 años. De acuerdo a la OMS, la duración de la inmunidad varía dependiendo del esquema de inmunización. El esquema de cinco dosis recomendado

por la OMS proporciona la máxima protección para la mujer a lo largo de sus años de vida reproductiva y, por lo tanto, proporciona inmunidad a sus hijos recién nacidos.³

Tercero, los grupos sostienen que los exámenes de laboratorio revelan la presencia de hCG en muestras de la vacuna TT. Sin embargo, las pruebas que utilizaron los grupos fueron inadecuadas; una reacción entre las sustancias inactivas de la vacuna y los reactivos usados arrojaron un resultado falso-positivo. En pruebas correctamente validadas realizadas a requerimiento de la OMS, no hubo evidencia de hCG.

El rumor de una posible conexión entre las vacunas TT y un agente anticonceptivo ha dañado los programas de inmunización y de planificación familiar. Debido a que estos programas son tan importantes para la salud de mujeres y niños, los proveedores de salud primaria y de planificación familiar debieran realizar todos los esfuerzos posibles para combatir rumores similares en sus comunidades y darle seguridad a las mujeres acerca de los beneficios y seguridad de la inmunización TT, y sobre la importancia de la elección libre e informada de un método anticonceptivo.

1. Milstien, J. et al. Damage to immunisation programmes from misinformation on contraceptive vaccines. *Reproductive Health Matters* 6:24-28 (November 1995).
2. Talwar G.P. et al. A vaccine that prevents pregnancy in women. *Proceedings of National Academy of Science* 91:8532-36 (1994).
3. Galazka, A.M. Tetanus. *The Immunological Basis for Immunization, Module 3*. Geneva: World Health Organization (1993).

Atención Lectores de *Outlook*

Outlook necesita su colaboración. Estamos empujando un nuevo ciclo de publicaciones con el financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations Population Fund-UNFPA) y de otros donantes; estamos buscando ideas sobre temas interesantes e importantes sobre salud reproductiva que podrían ser útiles a nuestros más de 20.000 lectores en países en transición y desarrollo. Les rogamos nos envíen a la dirección siguiente, preguntas sobre temas de salud reproductiva/anticoncepción que quisieran que respondiéramos, o áreas de temas generales que les gustaría que abordáramos:

Outlook

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699

U.S.A.

FAX: 206-285-6619

Los lectores pueden también comunicarse con *Outlook* a través de internet, a outlook@path.org y pueden obtener información adicional acerca de *Outlook* a través de la red computacional de información World Wide Web de PATH a www.path.org.

JUNTA ASESORA

- Mark Belsey, M.D., Jefe del Programa de Salud Materno Infantil y de Planificación Familiar, Organización Mundial de la Salud, Suiza
- Giuseppe Benagiano, M.D., Director del Programa Especial sobre Investigación, Desarrollo y Adiestramiento en Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, Suiza
- Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU.
- Rebecca J. Cook, Profesor Asociado de la Facultad de Leyes, Universidad de Toronto, Canadá
- Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU.
- Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile
- Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU.
- John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido
- Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia
- Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU.
- Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU.
- Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido
- Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU.
- Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU.
- Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU.
- Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.

© PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH) (PROGRAMA PARA TECNOLOGIA APROPIADA EN SALUD). 1996. DERECHOS RESERVADOS.



Outlook es publicado por PATH en Inglés y Francés y está disponible en Español, Chino, Portugués y Ruso. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en Español de *Outlook*, con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud, Programa Materno-Infantil y de Población; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), División para Latinoamérica y el Caribe y Programas Menores de PATH. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquéllas de sus patrocinadores, de individuos miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo.

Outlook se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editor: Jacqueline Sherris

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.

Teléfono: 206-285-3500

Fax: 206-285-6619

E-mail: outlook@path.org WWW: www.path.org

Las redactoras de este número fueron Amie Bishop, Maggie Kilbourne-Brook, Jacqueline Sherris y Elisa Wells.

Las asistentes de producción fueron Anamaria Concha y Emilia Lepe. Además de los miembros seleccionados de la Junta Asesora de *Outlook*, las siguientes personas revisaron este número: Ms. M. Cabral, Dr. O. Meirik y Dr. J. Milstien. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.