

OUTLOOK

ARTÍCULO PRINCIPAL

Píldoras Anticonceptivas de Emergencia: Seguras y Eficaces, Pero Poco Usadas

La anticoncepción de emergencia (AE) se refiere a los métodos que pueden usar las mujeres para impedir el embarazo luego de una relación sexual sin protección (acto sexual en el que no se ha usado un método anticonceptivo o en que el uso del método ha experimentado un accidente). Existen varios tipos de anticoncepción de emergencia que se usan en todo el mundo, incluyendo diversos regímenes hormonales y la inserción post-coital del DIU T de cobre. Todos deben utilizarse dentro de algunos días después de una relación sexual desprotegida y previenen el embarazo en la mayoría de las usuarias. Pese a su seguridad y eficacia relativamente alta, muchas mujeres desconocen la existencia de estos métodos o no saben cómo utilizarlos. Los datos también sugieren que los proveedores carecen de información acerca de la AE y, debido a ello, siguen para la entrega de servicios protocolos inconsistentes u obsoletos.

Al ofrecer información y servicios en anticoncepción de emergencia, los programas de planificación familiar pueden ayudar a las mujeres a evitar un embarazo no deseado. En el caso de aquellas mujeres que no están usando un método anticonceptivo y que desean evitar un embarazo, los servicios de AE pueden también servir como un primer punto de contacto con el/la proveedor/a de planificación familiar. Este artículo analiza la eficacia, seguridad, modo de acción, uso correcto y consideraciones sobre la entrega de servicios de dos de los regímenes hormonales más comúnmente usados.

Píldoras Anticonceptivas de Emergencia

Se han usado diversos regímenes de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), desde su introducción a mediados de los años sesenta para prevenir embarazos en víctimas de violación. Desde entonces, las indicaciones para el uso de las PAE han sido ampliadas para incluir a cualquier mujer en riesgo de embarazo como resultado de una relación sexual desprotegida, incluyendo a aquellas que experimentan la ruptura o desplazamiento de un método de barrera o que no han usado un anticonceptivo.

Regímenes de PAE. Los dos regímenes de PAE más usados son aquél que contiene una

NOTICIAS SOBRE PRODUCTOS

Metotrexato en la Interrupción de un Embarazo Reciente: Persisten las Inquietudes

Los métodos no quirúrgicos para la interrupción del embarazo reciente han sido objeto de una fuerte investigación en los últimos años; ello debido a la premisa de que son menos invasivos y menos costosos que los métodos quirúrgicos y muchos ayudan a aumentar el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo. Se han investigado dos drogas, el mifepristone (RU 486) y el metotrexato, ambos usados en combinación con una prostaglandina llamada misoprostol, para la interrupción no quirúrgica de un embarazo reciente. Actualmente, el mifepristone está disponible en China, Francia, Suecia y el Reino Unido. La investigación y experiencia clínica han mostrado que el régimen con mifepristone es efectivo en casi el 95 por ciento en mujeres con 49 días o menos de gestación, y que muchas mujeres lo prefieren a los métodos quirúrgicos.¹ El régimen con metotrexato utiliza drogas relativamente baratas ya aprobadas en muchos países para otros usos y está siendo investigado como una alternativa al mifepristone o al aborto quirúrgico.

El metotrexato ha sido usado por más de 40 años para tratar ciertos tipos de cáncer así como algunas condiciones no malignas como la soriasis y la artritis reumatoidea. Además, desde 1982 se han utilizado regímenes diferentes con metotrexato en la interrupción de un embarazo ectópico, con muy pocos efectos secundarios y ningún efecto posterior sobre la fertilidad.² El metotrexato bloquea el ácido fólico, necesario para la división y multiplicación celular (el mifepristone bloquea la progesterona, una hormona necesaria para mantener un embarazo). Aunque existen escasos datos de los países desarrollados que indiquen una amplia aceptabilidad de la droga por parte de las mujeres, existe una gran preocupación que motivó que un Comité sobre Toxicología de la OMS no recomendara su uso habitual en la interrupción del embarazo.³ El Comité no analizó la interrupción del embarazo en caso de sospecha de un embarazo ectópico; sin embargo, como se mencionó anteriormente, el metotrexato ha sido usado con éxito, por más de una década, para interrumpir un embarazo ectópico.

Las preocupaciones acerca del régimen metotrexato-misoprostol para su uso habitual en la interrupción de un embarazo son las siguientes:

- El régimen:** el régimen usado actualmente es de 50 mg de metotrexato por metro cuadrado de superficie corporal inyectados intramuscularmente, seguido siete días después por la administración intravaginal de misoprostol (800 mcg).^{4,5} Si es necesario se repite la dosis de misoprostol 24 horas después de la dosis inicial. (Por el contrario, el régimen con mifepristone considera un intervalo de dos días).
- Eficacia:** la eficacia total en mujeres con 49 días o menos de gestación es un poco más baja con el régimen de metotrexato que con el de mifepristone: alrededor de un 90 por ciento comparado con un 95 por ciento.
- Retraso en el aborto:** si bien más de la mitad de las mujeres abortan poco después de administrada la dosis de misoprostol (7 días después de iniciado el tratamiento), el aborto puede retrasarse hasta 28 días o más después de administrar el misoprostol. Un estudio reciente con 300 mujeres en tres centros de Estados Unidos, encontró que entre las mujeres con 49 días de gestación o menos (N=202), un 66 por ciento tuvieron un aborto completo a las 24 horas de administrada la dosis inicial o la segunda dosis de misoprostol (alrededor de una semana después de iniciado el tratamiento) y cerca del 90 por ciento abortaron dentro de los 28 días a contar de la última dosis de misoprostol. (Con el régimen con mifepristone, el aborto se produce generalmente dentro de las 12 horas después de la administración de misoprostol, o cerca de 48 a 60 horas después de iniciado el tratamiento con mifepristone).
- Efectos secundarios:** la mayoría de los efectos secundarios del régimen metotrexato/misoprostol son similares a los del régimen mifepristone/misoprostol: sangrado o goteo por varias semanas, calambres y algunas molestias gastrointestinales. Existe inquietud con respecto a un posible efecto secundario más serio: una disminución de la respuesta inmune debido a un posible efecto de toxicidad del metotrexato sobre la médula ósea. Este riesgo está asociado principalmente, pero no exclusivamente, al uso de dosis mayores de metotrexato.
- Teratogenicidad:** se ha asociado el metotrexato con anomalías fetales en mujeres a las que se les ha administrado dosis relativamente elevadas para el tratamiento de cáncer o artritis. En un estudio reciente en 100 mujeres que recibieron la droga para la interrupción del embarazo se encontró anomalías (defectos en las extremidades) en

