

OUTLOOK

E N E L I N T E R I O R

Índice de Outlook 1993-1996..... 7
Actualización sobre el Metotrexato: Recomendaciones del
Comité de Toxicología de la OMS en contra del
Uso Habitual para la Interrupción del Embarazo 8

ARTICULO PRINCIPAL

Involucrando a los Hombres en Salud Reproductiva

Los programas de planificación familiar y salud reproductiva en todo el mundo reconocen cada vez más que los hombres constituyen un grupo importante para sus servicios. Ellos no sólo tienen sus propias preocupaciones con respecto a la salud reproductiva, sino que también sus condiciones de salud y conductas afectan la salud reproductiva de las mujeres. Los Programas de Acción tanto de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en Cairo en 1994 como de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing, reconocieron el rol de los hombres en la salud reproductiva y enfatizaron la necesidad de desarrollar más programas con información y servicios destinados a ellos. Uno de los objetivos primordiales de estos programas es promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el área de la salud reproductiva.

Los aspectos de la salud reproductiva que interesan a los hombres incluyen la planificación familiar, la prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), la sexualidad y las disfunciones sexuales, la infertilidad y las condiciones urológicas, entre otras. Las principales maneras a través de las cuales los hombres se pueden involucrar directamente en la salud reproductiva de las mujeres son:

- usando métodos anticonceptivos que requieren de su participación directa, tales como los condones, la planificación natural de la familia, la vasectomía y el coito interrumpido;
- respaldando a su pareja en el uso de anticoncepción a través de una decisión tomada en conjunto con respecto a qué método usar y al número de hijos que desean tener; y
- previniendo la transmisión de ETS mediante el uso de condones, limitando su actividad sexual a una pareja única y procurando tratamiento.

Además, los hombres pueden desempeñar un rol importante previniendo la violencia de género, la que constituye un grave problema de salud reproductiva en muchas áreas (ver recuadro, página 3) y apoyando los esfuerzos por mejorar la condición de las mujeres.

Este artículo expone los motivos principales que justifican la participación de los hombres en los programas de salud reproductiva, analiza los factores que han restringido su participación y resume las conclusiones surgidas de los programas que han logrado con éxito transmitir a los hombres información sobre la salud reproductiva e incorporarlos a sus servicios.

TABLA 1

Esterilización Femenina y Masculina: Uso por Región, 1994

Región	Esterilización Femenina	Esterilización Masculina [†]
Africa	1	0,1
Asia y Oceanía	23	6
Asia Oriental ^{††}	33	10
Otros países	15	4
América Latina y el Caribe	21	1
Mundo	17	5

[†] Porcentaje de parejas entre 15-49 años.

^{††} China, Hong Kong, y la República de Corea.

Fuente: Uso de Anticonceptivos en el Mundo 1994. Departamento de las Naciones Unidas para la Divulgación de Asuntos Económicos y Sociales y Análisis de Políticas, División de Población. Nueva York, (1994). (*World Contraceptive Use 1994*. United Nations Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. Population Division. New York, 1994).

¿Por qué involucrar a los hombres en la salud reproductiva?

Entregar información y servicios sobre salud reproductiva a los hombres los beneficia tanto a ellos como a las mujeres en muchos aspectos. En primer lugar, aumenta el acceso a los métodos anticonceptivos que pueden usar los hombres, ampliando de esta manera la diversidad de opciones anticonceptivas para la pareja. Además, fortalece el respaldo que los hombres otorgan a las mujeres en el uso de anticonceptivos y mejora la posibilidad de tomar una decisión compartida con respecto al método que desean usar; por otro lado, previene la transmisión de ETS.

Ampliando la diversidad de opciones anticonceptivas. Los métodos anticonceptivos que requieren de una participación directa de los hombres incluyen los condones, la planificación natural de la familia y el coito interrumpido. En conjunto, éstos representan menos de un tercio de los métodos que se usan a nivel mundial, aunque los porcentajes para cada uno varían mucho según el país.¹ Por ejemplo, el coito interrumpido es muy popular en algunos países (casi el 35 por ciento de las parejas rumanas y un 26 por ciento de las parejas turcas reportan el uso de este método), pero es menos usado en muchos otros. Esto también es cierto para los métodos de planificación natural de la familia; se reportan tasas de hasta 15 por ciento en Sri Lanka, 20 por ciento en Perú, e incluso superiores en algunos países donde no existe disponibilidad de otros métodos. (Los datos de planificación natural de la familia a menudo vienen combinados con los datos para otros métodos, como el coito interrumpido, dificultando la posibilidad de determinar con certeza el uso del método). El condón es usado por un cinco por ciento de las parejas en edad reproductiva, cifra que ha aumentado en los últimos años a medida que existe un mayor interés en la prevención de las ETS. En el mundo, alrededor de un cinco por ciento de las parejas recurren a la vasectomía, en tanto que un 17 por ciento recurre a la esterilización femenina (ver Tabla 1). La discrepancia entre los porcentajes para

la vasectomía y la esterilización femenina es especialmente interesante, ya que la vasectomía es más eficaz, menos costosa y técnicamente más fácil de realizar que la esterilización femenina.

Muchas personas creen que los métodos masculinos son menos usados porque son inaceptables para los hombres; sin embargo, cuando los programas han hecho esfuerzos específicos para proporcionar a hombres y mujeres información y posibilidades de acceso a métodos como el condón y la vasectomía, el uso de estos métodos ha aumentado. Por ejemplo, en 1989 el Instituto de Seguridad Social de México, implementó un programa para aumentar la disponibilidad de servicios de vasectomía ambulatorios y promover este método entre los hombres. El programa tuvo como resultado un aumento del número anual de vasectomías (de 6.283 en 1989 a 16.882 en 1993) y una disminución de la proporción entre esterilizaciones femeninas y masculinas (de 21:1 en 1989 a 10:1 en 1993).²

Respaldo el uso de anticonceptivos en las mujeres. Idealmente, la decisión de una pareja acerca del número de hijos que desea tener y qué método anticonceptivo usar, debiera tomarse en conjunto, considerando los aspectos que inquietan tanto al hombre como a la mujer. Sin embargo, en lugares donde existe un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, las opiniones del hombre a menudo predominan en el proceso de toma de decisiones.

Diversos estudios han mostrado que si los hombres cuentan con información sobre temas de salud reproductiva y participan en sesiones de consejería, es posible que respalden en mayor medida el uso de la anticoncepción y que estén más conscientes del concepto de decisión compartida. Por ejemplo, un estudio realizado en Etiopía mostró que el incluir a los esposos en la educación sobre planificación familiar en el hogar aumentó significativamente el uso de anticonceptivos modernos, ya que la mayoría de las mujeres etíopes no usarían un método anticonceptivo sin que sus maridos lo supieran. Los educadores de salud también tuvieron éxito en abordar los conceptos erróneos que tenían los esposos sobre los efectos secundarios de los anticonceptivos modernos, un impedimento usual en la práctica de la planificación familiar.³

Los resultados de un estudio realizado en Bangladesh sugieren que la participación de los esposos en sesiones de consejería sobre implantes anticonceptivos Norplant[®] (con información sobre los efectos secundarios, procedimientos de inserción y extracción del método y cómo los hombres pueden ayudar cuando sus mujeres presentan efectos secundarios) influye en las tasas de continuación. Las tasas de continuación del Norplant[®] a tres años fueron significativamente más altas entre las mujeres cuyos esposos participaron en sesiones de consejería comparadas con las de aquellas mujeres cuyos esposos no participaron.⁴

Los programas que proporcionan información a los hombres son especialmente importantes en culturas donde son ellos los que toman las decisiones en la mayoría de los asuntos, incluyendo los de fertilidad y planificación familiar. Por ejemplo, en países donde a las mujeres no se les permite alejarse de sus casas sin la compañía de un miembro masculino de la familia, los esposos cumplen un

Abuso en las Mujeres: Un Grave Problema de Salud Reproductiva

El abuso sexual, físico y emocional en las mujeres por parte de sus parejas masculinas constituye un problema grave que tiene serias consecuencias para la salud. En muchos países, un cuarto hasta más de la mitad de las mujeres informan haber sido físicamente abusadas por su pareja actual o anterior.⁸ El riesgo de ser abusadas es mayor cuando sus parejas están bajo la influencia del alcohol o drogas.

El abuso puede tener como consecuencia embarazos no deseados y contagio de ETS e incluso producir un aborto. Las consecuencias a largo plazo del abuso físico y sexual incluyen entre otras, dolor pélvico crónico, enfermedad inflamatoria de la pelvis y disfunciones sexuales.

El abuso puede tener también un impacto directo sobre la facultad de la mujer para usar anticonceptivos. En algunos países, las mujeres son reticentes a practicar la planificación familiar por miedo a las represalias de sus esposos; grupos de foco realizados en México y Perú encontraron que las mujeres temían a la violencia, al abandono, o a ser acusadas de infieles si mencionaban la anticoncepción.

Aunque es posible que los programas de salud reproductiva no puedan proporcionar servicios integrales para la mujer víctima de abuso, sí pueden ayudar a abordar el problema a través de:

- entrenamiento a proveedores para que puedan reconocer los signos de abuso, abordar el tema con las clientes y referirlas a un centro adecuado en caso que lo necesiten.
- exhibiendo en las salas de espera de los consultorios información sobre el abuso y los servicios disponibles; y
- incluyendo información sobre abuso y su impacto sobre la salud de la mujer en folletos y otro tipo de material escrito para hombres.

Estas medidas representan un paso importante para romper la cadena de abuso que enfrentan muchas mujeres.

rol muy importante en la obtención de suministros y en el apoyo a sus mujeres en el uso correcto de los métodos de planificación familiar.⁵

Previendo las ETS. Además de sufrir los efectos de las ETS, los hombres las transmiten a las mujeres, incluyendo el VIH/SIDA. Algunos estudios en clínicas de países en desarrollo dedicadas a planificación familiar, atención materno-infantil y prenatal, encontraron que una a dos mujeres de cada diez están infectadas con una ETS.⁶ Las consecuencias para la salud reproductiva pueden ser particularmente graves en la mujer, ya que muchas ETS son asintomáticas y, si no son tratadas, pueden tener serias consecuencias, incluyendo infertilidad.

Los hombres pueden ayudar a prevenir la transmisión de ETS a sus parejas usando condones, limitando su actividad sexual a una pareja única y buscando tratamiento en caso de presentar una ETS. El tratamiento del hombre en la pareja es particularmente importante, ya que una mujer tratada por una ETS puede fácilmente reinfectarse si su pareja no está siendo tratada en forma paralela. El contactar a ambos miembros de la pareja es crucial para la prevención del VIH. La detección de VIH y

los programas de consejería en que se trabaja con los dos miembros de la pareja son significativamente más exitosos en prevenir la transmisión de VIH en parejas donde un miembro es VIH positivo, comparados con aquellos programas que sólo logran contactar a un miembro de la pareja.⁷

Factores que limitan la participación de los hombres

Varios factores programáticos y culturales han limitado la posibilidad de que los hombres desempeñen un rol activo en la práctica de la planificación familiar y en las decisiones sobre salud reproductiva.

Servicios dirigidos a las mujeres y los niños. La mayoría de los servicios de planificación familiar y salud reproductiva han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres y los niños, y por ende, a menudo los hombres no los consideran como una fuente de información y de servicios. Muchos de los servicios pueden ser poco apropiados o no bien acogidos por los hombres, y los proveedores a veces no tienen el entrenamiento o las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades de salud reproductiva de los hombres. Es posible, incluso, que los hombres se sientan avergonzados de acudir a consultorios que atienden principalmente a mujeres.

Escasa disponibilidad de anticonceptivos masculinos. Como se mencionó anteriormente, los métodos anticonceptivos masculinos disponibles son los condones, la planificación natural de la familia, la vasectomía y el coito interrumpido. Al igual que los métodos para las mujeres, estos anticonceptivos tienen sus ventajas y desventajas y cada cliente potencial tendrá que decidir por sí solo si un determinado método se ajusta a sus necesidades. En tanto que continúa la investigación sobre nuevos métodos masculinos (que incluyen las inyecciones hormonales y los implantes), es poco probable que surja un nuevo método ampliamente disponible antes de muchos años (ver Outlook, Volumen 13, Número 2).

Rumores y desinformación. Debido a que en general hay poco acceso a información exacta sobre métodos anticonceptivos masculinos, es posible que muchos hombres y mujeres no sepan cómo usarlos correctamente o puedan tener concepciones erróneas y miedos que les impiden usar los métodos. Por ejemplo, los hombres pueden no estar dispuestos a considerar la vasectomía porque la asocian a la castración o creen que les puede causar impotencia; en forma similar, es posible que no deseen usar condones porque creen que si lo hacen puede disminuir la satisfacción sexual o causar una reacción alérgica.

Sesgo de los proveedores en contra de los métodos masculinos. Los proveedores también pueden tener conceptos erróneos o sesgos en relación a los métodos masculinos o al rol de los hombres en la planificación familiar. Como consecuencia, es posible que no proporcionen información acerca de los métodos masculinos o asuman que los hombres no están interesados. Por ejemplo, proveedores entrevistados en China dijeron que no mencionaban los condones a sus clientes porque pensaban que no era un método eficaz.⁹ Las inquietudes acerca de la menor eficacia de ciertos métodos masculinos pueden ser abordadas a través de la consejería sobre el uso correcto y consistente (ver Outlook, Volumen 12, Número 4); también

Los Hombres Jóvenes Enfrentan Desafíos Especiales

Los hombres jóvenes representan un grupo importante para los programas de salud reproductiva, aunque constituyen un desafío muy particular. En muchos países, el nivel de actividad sexual entre los adolescentes va en aumento, así como el riesgo de transmisión de ETS. A pesar de que es evidente que los jóvenes necesitan información, consejería y servicios, sus necesidades no están siendo satisfechas por la mayoría de los programas de salud reproductiva.

Los resultados de una investigación cualitativa con muchachos de Sao Paulo, Brasil, ayudan a ilustrar algunos de los particulares desafíos sociales y sexuales que enfrentan los hombres jóvenes.¹¹ Durante varios meses, se realizaron debates sobre sexualidad con dos grupos de adolescentes de 14 a 18 años. Los temas planteados por los jóvenes incluyeron:

- la necesidad de responder a las expectativas que la sociedad tiene con respecto a los hombres
- la presión de amigos y padres para que los jóvenes tengan experiencia sexual
- la inquietud por no poder cumplir con las expectativas de las adolescentes mujeres
- inquietudes acerca del tamaño del pene, lograr y mantener una erección (que los investigadores creen puede relacionarse con la reticencia a usar condones)
- preocupación sobre la orientación sexual
- la creencia de que son las muchachas las que deben ser responsables de la anticoncepción
- la necesidad de información, pero temor de admitir su ignorancia acerca de temas sexuales

Aunque los temas específicos abordados por los jóvenes en estas discusiones no pueden ser generalizados a otros lugares y culturas, ilustran la complejidad de los factores que influyen sobre las decisiones sexuales y las prácticas de salud reproductiva. Cuando se diseñan servicios para la juventud, los programas deben identificar cuáles son los temas que atañen a la juventud de un lugar en particular y trabajar con los adolescentes para desarrollar respuestas apropiadas.



Foto cortesía del BID, Agosto de 1993.
Banco Interamericano de Desarrollo.

pueden ofrecerse píldoras anticonceptivas de emergencia a las usuarias como método de respaldo en caso de que los condones no sean usados correctamente o en caso de ruptura (ver *Outlook*, Volumen 14, Número 2).

Cuando el ambiente social o religioso no son favorables. En sociedades donde los temas sexuales no se discuten abiertamente, los hombres se sienten incómodos hablando acerca de sus necesidades de planificación familiar e inquietudes sexuales con sus parejas y con educadores de la salud. Los jóvenes pueden enfrentar fuertes presiones sociales que les impiden buscar información y servicios de salud reproductiva (ver cuadro ésta página). Además, algunos hombres creen que el recurrir a la anticoncepción va en contra de sus creencias religiosas. Por ejemplo, casi un 25 por ciento de los hombres encuestados en Bangladesh, Egipto y Pakistán citaron la religión como una de las razones por las cuales no usarían métodos anticonceptivos en el futuro.¹⁰

Prioridad otorgada a los servicios de salud para la mujer. Muchos programas se resisten a invertir tiempo y dinero en proporcionar información y servicios a los hombres, cuando sus clientes mujeres tienen necesidades de salud y planificación familiar que no han sido satisfechas.

Enfoques exitosos para contactar a los hombres

La experiencia en varios países donde se han llevado a cabo programas que involucran a los hombres ha demostrado que los factores que limitan el compromiso de los hombres no son insuperables.⁵ De hecho, tanto hombres como mujeres han respondido favorablemente a aquellos programas que se han esmerado en proporcionar a los hombres acceso a información y servicios sobre planificación familiar y salud reproductiva.

Algunas actividades diseñadas para involucrar a los hombres pueden ser de bajo costo y fáciles de implementar. Por ejemplo, invitarlos a acompañar a sus parejas en las visitas regulares a la clínica de planificación familiar significa un gasto mínimo. Otros esfuerzos pueden requerir una inversión inicial, pero eventualmente pueden generar ingresos. El consultorio para hombres de Profamilia en Bogotá logró autofinanciarse después de dos años de operación; el consultorio genera ingresos por consultas urológicas y otros servicios, los que utiliza para subsidiar su programa de vasectomías.⁵ A continuación se describen algunas conclusiones importantes obtenidas de programas exitosos.

Involucrar a los hombres en el diseño del programa y su implementación. Los propios hombres constituyen la mejor fuente de información respecto a cuáles son las mejores estrategias para lograr una entrega de servicios y alcance eficaces. De este modo, es esencial involucrar a los hombres en el diseño del programa y su implementación, a fin de asegurar que los servicios y los materiales de información se ajusten a sus inquietudes y necesidades. Con el fin de poner en práctica sus objetivos, muchos programas también recurren a hombres, quienes son incorporados como personal estable del programa, educadores de salud, o para que motiven la participación de otros hombres.

Incrementar la disponibilidad de servicios. Mientras algunos programas han establecido consultorios que con éxito prestan servicios exclusivos para hombres, pro-

bablemente es más fácil y menos costoso para la mayoría de los programas incorporar servicios para hombres a los servicios ya existentes. La experiencia de Profamilia en Colombia, que opera tanto con consultorios sólo para hombres como para hombres y mujeres en conjunto, sugiere que el simple hecho de prestar atención a las necesidades de los hombres y el tratarlos respetuosamente ayuda a atraer más hombres como clientes.¹²

La manera de adaptar los servicios existentes y adecuarlos para atraer a los hombres implica dedicar horas para los hombres, invitarlos a venir con sus parejas, contar con una entrada de acceso separada y una sala de espera exclusiva para hombres, contratar a proveedores y educadores de salud de sexo masculino, transformar la decoración del consultorio y proporcionar un conjunto de servicios que se adapte a sus necesidades.

Los servicios que pueden ser interesantes para los hombres incluyen:

- información y servicios de planificación familiar
- diagnóstico y tratamiento de ETS
- información sobre la anatomía y fisiología del hombre y de la mujer
- atención médica general
- exámenes físicos requeridos por el empleador
- tratamiento de problemas urológicos
- consejería sobre sexualidad, disfunciones sexuales y cómo abordar las necesidades sexuales con la pareja
- detección de cáncer prostático y testicular
- evaluación de la infertilidad masculina

Entrenar a los proveedores acerca de las necesidades de salud reproductiva de los hombres. A medida que los programas empiecen a expandir sus servicios, los proveedores requerirán entrenamiento acerca de las necesidades reproductivas de los hombres, de manera que puedan adquirir la experiencia clínica e información adecuadas para asistir a los hombres de manera efectiva. Es especialmente importante, el entrenamiento destinado a aclarar los conceptos erróneos de los proveedores sobre los métodos anticonceptivos, ya que los sesgos personales pueden influir en que algunos proveedores no recomienden un cierto método. Cuando sea apropiado, un entrenamiento clínico en el examen de genitales masculinos y sobre vasectomía puede ayudar a expandir la disponibilidad de estos servicios. Todos los proveedores de salud reproductiva necesitan entrenamiento en consejería y habilidades de comunicación interpersonal (ver *Outlook*, Volumen 13, Número 1).

Proporcionar información y seguimiento personal. La expansión de los servicios para incluir a los hombres implica incrementar la información y ponerla al alcance de este grupo. Los programas han usado una diversidad de formas de acercamiento para llegar a los hombres, incluyendo campañas a través de medios de difusión masivos que los alienta a tomar mayor responsabilidad en planificación familiar/prevención de ETS, y la promoción en lugares donde predominan los hombres, como son los eventos deportivos, los grupos militares y en los lugares de trabajo (ver cuadro, página 6).

Las necesidades de información sobre salud reproductiva de los hombres y sus fuentes preferidas de información varían de acuerdo al lugar, la edad del grupo y otros

Mensajes para los Hombres

A continuación aparecen algunos mensajes utilizados por los programas en todo el mundo para incentivar la participación de los hombres en salud reproductiva.

Preocupémonos de nosotros, preocupémonos de nuestras esposas y niños por medio de la planificación familiar.

Antes de que Ud. sea papá, sea un hombre maduro y responsable.

Los verdaderos hombres son responsables y aceptan la responsabilidad de sus propios actos, el bienestar de sus hijos, la felicidad de sus familias.

Un campeón cuidadoso usa condón.

Sé hombre: Protege a tu esposa de un embarazo no deseado, usa condón.

Los hombres protegen a sus familias -el SIDA no está en tus manos.


TU ESPOSA Y TUS HIJOS TE NECESITAN



PROTEGE A TU FAMILIA
USA CONDON CADA VEZ QUE TENGAS RELACIONES SEXUALES

Fuente: Material Audio-visual Clearinghouse;¹³ ONG Consorcio para el SIDA (NGO AIDS Consortium) y PATH/Kenia.

Contactando a los Hombres Filipinos en el Lugar de Trabajo



La Fundación para la Educación sobre el SIDA ReachOut, una ONG enfocada hacia la educación en SIDA/ETS y planificación familiar, está implementando un programa para los trabajadores portuarios que son clientes de prostitutas en la Bahía Norte de Manila. Debido a su conducta sexual, estos trabajadores contraen frecuentemente ETS y traen estas enfermedades a casa contagiando a sus esposas o parejas.

Para abordar este problema, ReachOut creó una red de apoyo con las compañías navieras, los cargadores portuarios y las agencias de transporte. Se analizaron los riesgos de salud reproductiva y necesidades de los trabajadores portuarios a través de grupos de discusión (grupos de foco) y se recurrió a artistas locales para el desarrollo de mensajes y material educativo, que incluyen información sobre planificación familiar así como una discusión acerca de cómo las ETS y el SIDA afectan a sus parejas y familias. Monitores distribuyen estos materiales y condones a los trabajadores portuarios mientras esperan la llegada de los barcos y en reuniones semanales se reparten a estibadores y cargadores.

ReachOut también usa un programa computacional especial de consejería sobre SIDA, llamado RiskAdvisor[†]. Empleando en computadores portátiles en la zona portuaria, las sesiones de consejería por computación ayuda a que los hombres logren una percepción más precisa sobre el riesgo de exposición al SIDA y otras ETS.

Como resultado de este programa, la demanda de condones ha aumentado dramáticamente entre los 5.000 trabajadores del puerto. Antes de esta intervención, los trabajadores portuarios requerían sólo cerca de 350 condones mensuales; seis meses después, la demanda de condones aumentó a aproximadamente 1.400 condones mensuales.¹⁴

[†] Para obtener información sobre el programa RiskAdvisor, contáctese con el World Wide Web de Path <http://www.path.org/riskadvs/riskbroc.htm>.

factores. Cuando se diseña un programa de información es importante:

- *Definir la audiencia;* por ejemplo, un programa de vasectomía podría tratar de contactar a hombres que ya tienen un hijo o más y que desean limitar el número de hijos.
- *Identificar las necesidades de información de los hombres,* incluyendo aquellos aspectos que no saben acerca de un tema, qué tipos de rumores o conceptos erróneos han escuchado y qué tipo de preguntas tienen.
- *Probar previamente el material para asegurar que transmitan el mensaje deseado;* lo que es adecuado para un grupo puede constituir un mensaje equivocado para otro grupo.

En el todo el mundo, los programas han usado una diversidad de mensajes para involucrar a los hombres (ver cuadro página 5).

Algunos programas han encontrado que las campañas de información deben considerar un enfoque más “personalizado” para que efectivamente produzcan un cambio conductual. Las estrategias que se han usado para personalizar el mensaje incluyen usar a los hombres como pares monitores, conseguir el apoyo de líderes locales de opinión, y alentar a los hombres a participar en grupos organizados tales como Clubes de Padres o de Hombres, que proporcionan una atmósfera adecuada para que se sientan cómodos conversando sobre temas relacionados con la salud reproductiva. El involucrar a líderes religiosos puede

ayudar a superar lo que se percibe como barreras religiosas. Por ejemplo, La Asociación de Planificación Familiar de Bangladesh tiene un programa intensivo para educar a líderes religiosos locales acerca de ciertas interpretaciones del Corán que apoyan la planificación familiar.

Cómo se abordan las barreras programáticas. Un programa exitoso para los hombres requiere de políticas médicas, reguladoras y de entrega de servicios. Las posibles barreras políticas que se deben considerar incluyen:

- exigencias demasiado altas o inadecuadas de los criterios de elegibilidad médica para la vasectomía (ver Outlook, Volumen 14, Número 1).
- impuestos de importación y sobretasas que aumentan el precio de los condones
- regulaciones que limitan la publicidad de los condones
- regulaciones que limitan la distribución de los condones, basadas en la edad o el estado civil del cliente, el tipo de proveedor de salud, o el tipo de local de venta.

Evaluación del impacto del programa. La evaluación puede ayudar a los programas a monitorear el impacto, ya sea anticipadamente o no, de los servicios para hombres y qué alcance tendrán. Por ejemplo, mientras la evaluación de una campaña multimedia para motivar a los hombres en Zimbabwe encontró que el programa en general era exitoso en promover una mayor comunicación sobre planificación familiar entre hombres y mujeres, un efecto no anticipado de la campaña fue un aumento en el número de hombres que sentían que debían tomar solos las decisiones sobre planificación familiar.¹⁵ A medida que

se continúan desarrollando y mejorando las estrategias para involucrar a los hombres, los resultados como éstos pueden ser de gran ayuda para los programas. Cuando los resultados revelan que las actividades están cumpliendo con los objetivos propuestos, entonces éstas deberían expandirse y fortalecerse para contactar a los hombres. Cuando los resultados sugieren que las actividades no están teniendo el efecto esperado, los programas deben hacer los cambios necesarios.

Conclusión

Las opciones y conductas sexuales de los hombres pueden afectar tanto su salud reproductiva como la de sus parejas. Las experiencias exitosas de los programas en varios países demuestran que los hombres están dispuestos a tomar acciones para proteger la salud reproductiva cuando tienen acceso a información y servicios. Un factor esencial de los programas que trabajan con hombres es alentarlos a apoyar a las mujeres en sus necesidades y decisiones de salud reproductiva. A medida que los programas se mueven hacia el concepto de responsabilidad compartida en planificación familiar y salud reproductiva, es esencial proporcionar a los hombres información y servicios sobre su propia salud reproductiva y la de sus parejas.

1. World Contraceptive Use 1994. United Nations, Population Division. New York, New York (1994).
2. Juarez, C. and Alarcon, F. Prestación de Servicios de Planificación Familiar a Varones en el IMSS. Paper presented at the Second Latin American Operations Research Conference, Ixtapa, Mexico, September 19-22, 1994, as cited in Vernon, R. Operations research on promoting vasectomy in three Latin American countries. *International Family Planning Perspectives* 22(1):26-31 (March 1996).
3. Terefe, A. et al. Modern contraception use in Ethiopia: does involving husbands make a difference? *American Journal of Public Health* 83(11):1567-1571 (November 1993).
4. Amatya, R. et al. The effect of husband counseling on NORPLANT contraceptive acceptability in Bangladesh. *Contraception* 50:263-273 (September 1994).
5. Green, C.P. et al. Male involvement in reproductive health, including family planning and sexual health. United Nations Population Fund Technical Report (1995).
6. Lande, R. Controlling sexually transmitted diseases: issues in world health. *Population Reports* L(9) (June 1993).
7. Becker, S. Couples and reproductive health: a review of couple studies. *Studies in Family Planning* 27(6):291-306 (November-December 1996).
8. Heise L.L. et al. Violence against women: the hidden health burden. *World Bank Discussion Papers* No. 225 (1994).
9. Liu, Y. et al. Factors affecting men's participation in family planning: findings of a qualitative research project in China. Final report. (1995).
10. Ezeh, A. et al. Men's fertility, contraceptive use, and reproductive preferences. *Demographic and Health Surveys Comparative Studies, N° 18*. Calverton, Maryland: Macro International (March 1996).
11. Simonetti, C. et al. Listening to boys: a talk with ECOS staff. In: Zeidenstein, S. and Moore, K., eds. *Learning About Sexuality: A Practical Beginning*. New York (1996) pp. 324-332.
12. AVSC International and Profamilia. Men as partners in reproductive health: lessons learned from Colombia (Working title) (Forthcoming).
13. Media and Materials Clearinghouse (M/MC). Ideabook # 1: messages for male motivation. Baltimore, Maryland. Johns Hopkins Center for Communication Programs. (May 1996).
14. Fleras, J. AIDS/STD intervention program for dockworkers: final narrative report (August 8, 1996).
15. Kim Y.M. et al. Involving men in family planning: the Zimbabwe male motivation and family planning method expansion project, 1993-1994. Johns Hopkins School of Public Health Center for Communication Programs IEC Field Report Number 3 (January 1996).

NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue preparado por Sarah Khorram y Elisa Wells, con la asistencia del personal de PATH.

Índice de *Outlook* 1993-1996

A continuación detallamos un índice de todos los artículos de *Outlook* impresos desde 1993 hasta 1996. El índice de los artículos para el período 1983-1992 se incluyó en el Volumen 10, Número 3. Los lectores interesados en obtener una copia de cualquiera de estos artículos deben contactarse con:

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, José Ramón Gutiérrez 295, P.2, Depto. 3, Santiago, CHILE. Fax: 56-2-6336204.

Los números publicados desde Diciembre 1994 están disponibles en inglés y pueden obtenerse por intermedio del World Wide Web de PATH, <http://www.path.org/outlook/index.htm>.

Cuando aparece un (*) después de una título, éste indica que se trata de un artículo principal del número en cuestión.

Métodos de Barrera (ver también Espermicidas)

Métodos de barrera vaginales: ¿opciones subutilizadas? - 11(4) 1993*

Condones

Los condones protegen de las ETS y del VIH: es fundamental un uso correcto y consistente - 12(4) 1995*

Condones de poliuretano disponibles en 1994 - 11(3) 1993

Actualizaciones sobre regulación: Condón femenino Reality® - 11(2) 1993

Diversos factores afectan la ruptura de los condones - 11(2) 1993

Anticoncepción, General

Investigación y desarrollo en anticoncepción: avances hacia una agenda centrada en la mujer - 13(2) 1996*

Efectos secundarios de los anticonceptivos: cómo responder a las inquietudes de las usuarias 12(3) 1995*

Tecnologías anticonceptivas en desarrollo: muchas iniciativas, progreso lento - 11(3) 1993*

Asesoramiento en planificación familiar: ¿cómo satisfacer las necesidades individuales de los clientes? - 13(1) 1995*

Cómo actúan los anticonceptivos - 11(3) 1993

Mejorando el acceso a los anticonceptivos: la OMS revisa los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos - 13(4) 1996*

Inspeccionando la calidad de los anticonceptivos a nivel de los servicios - 12(4) 1995

Criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos: inyectables combinados y esterilización - 14(1) 1997*

Anticoncepción de Emergencia

Declaración de consenso sobre anticoncepción de emergencia - 13(3) 1996

Píldoras anticonceptivas de emergencia: seguras y eficaces, pero poco usadas - 14(2) 1997*

Renovado interés en anticoncepción de emergencia - 12(4) 1995

Anticoncepción Hormonal, General

Las vacunas antitetánicas no contienen un inmunógeno anticonceptivo - 14(1) 1997

Implantes

Suministro del NORPLANT®: experiencia y desafíos - 13(3) 1996*

Anticonceptivos Inyectables

Otros tres países aprueban la Depo Provera - 11(4) 1993 (1994)

Actualizaciones sobre regulación: nuevo anticonceptivo inyectable - 11(1) 1993

Actualizaciones sobre regulación: Cyclofem - 11(2) 1993

Dispositivos Intrauterinos

La salud durante el uso prolongado de DIUs - 12(1) 1994

Anticonceptivos Orales

Anticonceptivos orales con nuevas progestinas y el riesgo de tromboembolia venosa (TEV) - 14(1) 1997
 Seguridad de los anticonceptivos orales: actualización sobre las inquietudes más frecuentes - 11(3) 1993* (1994)
 Actualizaciones sobre regulación: norgestimato y desogestrel - 11(1) 1993

Interrupción del Embarazo

Investigaciones en curso sobre el uso del mifepristone en reproducción - 12(1) 1994
 Aspiración manual endouterina en el tratamiento del aborto incompleto - 12(1) 1994*
 Metotrexato en la interrupción de un embarazo reciente: persisten las inquietudes - 14(2) 1997
 Actualizaciones sobre regulación: mifepristone - 11(1)1993
 Actualizaciones sobre regulación: RU 486 - 11(2) 1993

Salud Reproductiva, General

Involucrando a los hombres en salud reproductiva - 14(3) 1997*
 Salud reproductiva de la mujer: el rol de los programas de planificación familiar - 12(2) 1995*

Esterilización, Femenina y Masculina

Esterilización masculina y femenina: consecuencias a largo plazo para la salud - 11(1) 1993*
 Preguntas de los lectores: método del pellet de quinacrina en la esterilización femenina no quirúrgica - 11(4) 1994
 Vasectomía y cáncer: la investigación continúa - 13(1) 1995

Actualización sobre el Metotrexato: Recomendaciones del Comité de Toxicología de la OMS en Contra del Uso Habitual para la Interrupción del Embarazo

El número anterior de *Outlook* (Volumen 14, Número 2) incluía un artículo que describía temas acerca del metotrexato más misoprostol para la interrupción de un embarazo reciente. Desde la publicación de ese artículo, un Comité de Toxicología de la Organización Mundial de la Salud ha revisado las investigaciones relacionadas con el uso de metotrexato y se ha declarado en contra de su uso habitual para la interrupción del embarazo.¹ (El comité no analizó el uso del metotrexato para la interrupción del embarazo cuando existe sospecha de un embarazo ectópico y ha sido informado favorablemente por más de una década). El Comité de Toxicología enumeró varias razones para su recomendación, particularmente la preocupación por la teratogenicidad de la droga y la disminución de la respuesta inmune que se observó en algunas mujeres que la usaron. Estas preocupaciones se vieron realizadas por la baja tasa de eficacia del metotrexato comparada con la del mifepristone y por el desafío que significa la entrega de servicios asociados al régimen de la droga (una demora de una semana o más entre la administración del metotrexato y el misoprostol). Para obtener un resumen más detallado de las recomendaciones del Comité de la OMS, por favor contactarse con *Outlook*.

1. Comité de Toxicología de la OMS. Metotrexato en la interrupción de un embarazo reciente: una revisión de su toxicología. OMS(Enero de 1997).

JUNTA ASESORA

•Mark Belsey, M.D., Jefe del Programa de Salud Materno Infantil y de Planificación Familiar, Organización Mundial de la Salud, Suiza •Giuseppe Benagiano, M.D., Director del Programa Especial sobre Investigación, Desarrollo y Adiestramiento en Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, Suiza •Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU.
 •Rebecca J. Cook, Profesor Asociado de la Facultad de Leyes, Universidad de Toronto, Canadá •Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU. •Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile •Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU. •John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido •Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia •Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU. •Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU. •Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido •Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU. •Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU. •Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU. •Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.

© PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH) (PROGRAMA PARA TECNOLOGÍA APROPIADA EN SALUD). 1997. DERECHOS RESERVADOS.

Outlook es publicado por PATH en Inglés y Francés y está disponible en Español, Chino, Portugués y Ruso. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en Español de *Outlook*, con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud, Programa Materno-Infantil y de Población; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), División para Latinoamérica y el Caribe y Programas Menores de PATH. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquéllas de sus patrocinadores, de individuos miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo.

Outlook se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editor: Jacqueline Sherris
 PATH
 4 Nickerson Street
 Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.
 Teléfono: 206-285-3500
 Fax: 206-285-6619
 E-mail:outlook@path.org WWW:www.path.org

La redactora de este número fue Elisa Wells. Las asistentes de producción fueron Anamaria Concha y Emilia Lepe.

Además de los miembros seleccionados de la Junta Asesora de *Outlook*, las siguientes personas revisaron este número: Dr. C.P. Green, Dr. M. Ladjali y M.N. Wegner. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.