

OUTLOOK

E N E L I N T E R I O R
El condón femenino: Para Mujeres y Hombres 4
Ducha Vaginal: ¿Innecesaria y Potencialmente Dañina?... 6

ARTICULO PRINCIPAL

Previnendo las Infecciones en el Personal de la Salud

Linda Tietjen

Las enfermedades infecciosas continúan siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo, y el personal que trabaja en el área de la salud corre el riesgo de contraerlas. La propagación de las infecciones al interior de los centros de salud se debe en gran medida a la falta de costumbre del personal de lavarse las manos **antes** y **después** del contacto con cada paciente -una lección aprendida hace más de 100 años. La propagación epidémica de las enfermedades a virus que se transmiten por la sangre -incluyendo la hepatitis B y C, y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)— enfatizan la importancia de las medidas de seguridad con que se trabaja en los centros de atención de salud. Las estrategias de prevención de infecciones debieran centrarse en:

- prevenir la propagación de la infección por contaminación cruzada (persona a persona), y
- proteger al personal de la salud en todos los niveles, proporcionándoles condiciones de trabajo seguras.¹

La mayoría de las infecciones pueden contagiarse antes de que se presenten los síntomas. Por lo tanto, la exposición ya sea a la sangre del paciente o a cualquier fluido de su cuerpo a través de pinchazos de agujas u otras heridas y salpicaduras en los ojos y boca (membranas mucosas), aumenta el riesgo de exposición. Muchos trabajadores de la salud conocen sólo vagamente el riesgo al que se exponen mientras trabajan; algunos todavía creen que es poco lo que se puede hacer para protegerlos.

Este artículo trata sobre lo que puede hacer el personal de la salud para protegerse (y al mismo tiempo proteger a sus clientes) de la exposición a enfermedades infecciosas. No hemos abordado en este número los procedimientos específicos de descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización necesarios para asegurar que los recintos y el equipamiento se mantengan libres de infecciones. Estos procedimientos aparecen resumidos en

Linda Tietjen (BSN, MPH) es Miembro Asociado de la Facultad en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Johns Hopkins y consultora para la prevención de infecciones para la Corporación JHPIEGO.

Outlook, Volumen 7, Número 2 (del que puede solicitar una copia a PATH) y en el manual Prevención de Infecciones para los Programas de los Servicios de Planificación Familiar (Infection Prevention for Family Planning Service Programs¹), el que se puede solicitar a JHPIEGO, Brown's Wharf, 1615 Thames Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21231, U.S.A.

¿Cuánto Riesgo Implica el Trabajo de Atención de Salud?

En una reciente encuesta realizada en EE.UU. se determinó que sólo los conductores de camiones y los obreros tenían un índice de accidentes del trabajo más elevado que los trabajadores del área de la salud.² Si bien la exposición a agentes biológicos y las infecciones posteriores no constituyen el único riesgo al que se enfrenta el personal de la salud en su trabajo, las infecciones implican el mayor riesgo, especialmente aquéllas causadas por organismos presentes en la sangre. El contacto con la sangre y otros fluidos del cuerpo es el riesgo ocupacional más frecuente al que se expone el personal de la salud. Sólo en Estados Unidos se producen anualmente más de 800.000 heridas por agujas, pese a que continuamente se realizan campañas de educación al respecto y otros esfuerzos para prevenirlas.³

Aunque existe una consciencia creciente de la gravedad del VIH y la hepatitis B y C, y de su mecanismo de transmisión, muchos trabajadores de la salud no perciben que corren el riesgo de contraerlas. Incluso aquéllos que saben cuán importante son las precauciones de lavarse las manos y usar guantes, no lo hacen en forma habitual. Esto se debe en parte a la creencia equivocada de que el VIH se limita a ciertos grupos "de riesgo"—trabajadoras del sexo, usuarios de drogas intravenosas, u homosexuales—y a las áreas urbanas. Aunque esto puede haber sido así hace varios años atrás, en 1996 la OMS estimó que en todo el mundo había más de 22,6 millones de personas infectadas de SIDA, que este virus estaba afectando en forma creciente a la población heterosexual y que se estaba expandiendo a zonas rurales.⁴

Otros factores también contribuyen a que el personal no cumpla con las medidas de precaución, incluyendo la percepción de que los centros de salud son en sí lugares de trabajo que implican riesgo y que poco se puede hacer para que sean más seguros, y la creencia de que existe un conflicto de intereses entre proporcionar la mejor atención de salud y el protegerse contra las infecciones.⁵ En muchos lugares, por el hecho de no contar con el personal suficiente y porque la composición del equipo de trabajo es inadecuada para las necesidades de los clientes, el problema se hace aún mayor.⁶

Cómo Lograr que Los Programas de Prevención de Infecciones Tengan Éxito

A fin de impedir la propagación de las infecciones, es crucial la puesta en práctica de estrategias efectivas para asegurar que el personal cumpla las pautas de prevención.

"La mayor parte de los agentes infecciosos se transmiten por contacto con la sangre y los fluidos corporales, y la mayoría de las infecciones pueden contagiarse antes de que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, es esencial que el personal de los centros de salud trate a todos sus pacientes como si estuvieran infectados."

La educación y otros esfuerzos destinados a lograr la seguridad de los centros debieran estar dirigidos a todo el personal —no sólo a los médicos y enfermeras. En algunos países, el personal de aseo presenta un porcentaje de heridas por

pinchazos de agujas que ocupa el segundo lugar después del personal de las salas de cirugía. Esto se debe en gran medida a que el procedimiento para desechar las agujas usadas es incorrecto, y a que no se ha enseñado al personal de aseo las medidas que debe tomar para protegerse.¹

Para lograr que se cumplan las pautas de prevención de infecciones, es importante que los administradores de programas apoyen continuamente los esfuerzos destinados a implementar medidas de seguridad. Esto incluye asegurar que las deficiencias identificadas sean corregidas, que las prácticas peligrosas sean eliminadas y que el personal sea alentado activamente a proponer mejores prácticas de seguridad. También es importante que los supervisores regularmente otorguen respaldo y recompensen las prácticas apropiadas de prevención de infecciones, y que los roles modelo, especialmente los médicos y el personal superior, respalden las prácticas recomendadas y sirvan de ejemplo en cuanto a la conducta apropiada.⁷ Finalmente, los programas educativos que se orientan a solucionar los problemas —no sólo a proporcionar informa-

Lavarse las Manos y Usar Guantes: Fundamental para Todo Trabajador de la Salud

Lavarse siempre las manos durante 10 a 15 segundos antes y después de cada contacto con el/la paciente puede ser el único procedimiento más importante para prevenir infecciones. El uso de jabón y agua cuando estén disponibles o una fricción con alcohol/glicerina (sin agua) son efectivos. Se encontró que el personal de salud en EE.UU. sólo se lavaba las manos un 40 por ciento de las veces, incluso en las unidades de tratamiento intensivo, donde a menudo los pacientes están en condiciones más vulnerables y donde es más frecuente que haya organismos resistentes.⁸

Todo el personal de la salud debe usar guantes antes de tener contacto con sangre u otros fluidos del cuerpo de cualquier paciente. Esto también incluye al personal que ordena y lava el instrumental después de un procedimiento. El tipo de guantes a ser usados depende de la tarea. Para cirugía, se requieren guantes esterilizados; guantes desechables baratos para realizar exámenes pélvicos; y guantes gruesos corrientes para lavar instrumentos, limpiar las salpicaduras y manipular la basura. Deben cambiarse los guantes después de cada contacto con el/la paciente. Por ejemplo, luego de haber cambiado un vendaje, hay que sacarse los guantes y lavarse las manos antes de escribir alguna nota o hacer cualquier otra cosa.

Si los guantes quirúrgicos son reutilizados (ya sea esterilizados o cuidadosamente desinfectados), el personal de cirugía debiera usar "doble juego de guantes" para aquéllos procedimientos en que es habitual el contacto con sangre y fluidos corporales (por ejemplo, en los partos vaginales o por cesárea); ello porque se pueden haber producido perforaciones invisibles en los guantes reutilizados.

ción— y que tomen en cuenta factores psicosociales (minimizar la tensión emocional, la ansiedad y los problemas interpersonales) —pueden tener como efecto que el personal se adapte mejor a las medidas de prevención y ello derive en una mayor seguridad en el trabajo.³

¿Cómo Disminuir los Riesgos en la Atención de Salud?

La mayor parte de los agentes infecciosos se transmiten por contacto con la sangre y los fluidos corporales, y la mayoría de las infecciones pueden contagiarse antes de que se presenten los síntomas. Por lo tanto, es esencial que el personal de salud trate a los pacientes como si estuvieran infectados. Las medidas de precaución descritas e ilustradas en esta página debieran ser utilizadas en forma habitual por todo el personal con todos sus pacientes.⁹

Las medidas de precaución proporcionarán suficiente protección al trabajar con la mayoría de los pacientes. Se debe aislar a los pacientes sólo si las secreciones (en contacto con el aire) o excreciones (orina o heces) no pueden ser contenidas. Esto incluiría, por ejemplo, a pacientes que tienen una tuberculosis activa.

Las medidas de precaución para prevenir infecciones constituyen parte importante de todo procedimiento. Por ejemplo, en los centros de atención para mujeres, los procedimientos ginecológicos, incluso los exámenes pélvicos, pueden exponer al personal a los fluidos corporales. Se detallan a continuación los procedimientos específicos que deben realizarse durante un examen pélvico:

- Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de cada examen.
- Cuando sea posible, pedirle a la paciente que se lave la zona genital antes del examen pélvico.
- Usar instrumentos limpios y cuidadosamente desinfectados (o esterilizados) y guantes quirúrgicos (en ambas manos). Como alternativa, se pueden usar guantes para examen.
- Eliminar en forma adecuada el material de desecho (gasa, algodón y guantes desechables).
- Descontaminar los instrumentos y los materiales reutilizables inmediatamente después de haberlos usado.
- Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón después de sacarse los guantes.

Finalmente, aunque no se trate específicamente de una medida de precaución, cuando sea posible el personal de salud debiera aprovechar las inmunizaciones disponibles, especialmente la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna protege no sólo al trabajador y su familia sino también a los compañeros de trabajo y los pacientes.

Resumen

Es cada vez más importante que el personal del área de la salud conozca y practique medidas simples y poco costosas que pueden reducir en forma notoria el riesgo de contraer y contagiar una enfermedad grave que podría constituir una amenaza para la vida. Es de responsabilidad de todo el personal ayudar a crear un entorno seguro para los pacientes y sus compañeros de trabajo.

1. Tietjen, L.G. et al. *Infection Prevention for Family Planning Service Programs*. Durant, OK: Essential Medical Information Systems, Inc. (1992).

Protéjase



Lávese las manos antes y después de cada contacto con el paciente —este es el único procedimiento práctico para prevenir la contaminación cruzada (ver cuadro página anterior).




Use guantes antes de tocar cualquier vía húmeda —herida en la piel, mucosas, sangre u otros fluidos corporales (secreciones o excreciones), instrumental sucio, guantes y desechos de procedimientos médicos (ver cuadro página anterior).



Use barreras físicas (gafas protectoras, mascarillas y delantales de plástico) si se anticipan salpicaduras y posibilidades de que escorra cualquier fluido corporal, (secreciones o excreciones) por ejemplo, secreción vaginal. Nunca coma, fume o lleve cualquier cosa a su boca en lugares en que podría haber sangre.

Utilice prácticas de trabajo seguras, tales como tomar precauciones al manipular instrumentos cortantes; eliminar en forma adecuada los desechos de procedimientos médicos; no tapar, quebrar o doblar las agujas o desarmar las jeringas. Los procedimientos específicos para prevenir heridas de aguja incluyen:

- Colocar recipientes adecuados para dejar las agujas y otros instrumentos cortantes cerca de la cama del paciente o de las mesas de examen.
- Entrenar a todo el personal para que no vuelva a tapar las agujas y jeringas usadas, si no que las deje en recipientes destinados para ello (Un tercio de todas las pinchazos de aguja se deben a que el personal intenta volver a tapar las jeringas).¹⁰
- Si se debe recubrir una aguja, entrene al personal para realizar este procedimiento con una sola mano, técnica que se ilustra a la izquierda.



Ilustraciones del Programa de Control de Infecciones de Transmisión por Sangre de PATH en Ucrania, Enero 1997.

2. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. *Current Population Survey, 1995 Annual Averages* (1995).
3. Rogers, B. Health hazards in nursing and health care: an overview. *American Journal of Infection Control* 25:248-261 (1997).
4. XI International Conference on AIDS. *The Status and Trends of the Global HIV/AIDS Pandemic: Final Report* (July 7-12, 1996).
5. Gershon, R. Facilitator report: Bloodborne pathogens exposure among health care workers. *American Journal of Industrial Medicine* 29:418-420 (1996).
6. Institute of Medicine: *Nursing Staff in Hospitals and Nursing Homes—Is It Adequate?* (1996).
7. Lipscomb, J. and Rosenstock, L. Health care workers: protecting those who protect our health. *Infection Control Hospital Epidemiology* 18:397-399 (1997).
8. Griffin, K. They should have washed their hands. *Health* 82-90 (November/December 1996).
9. Blumenthal, P. and McIntosh, N. *Pocket Guide for Family Planning Service Providers* (1996-1998) (1996).
10. Jagger, J. et al. Rates of needle stick injury caused by various devices in a university hospital. *New England Journal of Medicine* 5:284-218 (1988).

NOTICIAS DE PRODUCTOS

**El Condón Femenino:
Para Hombres y Mujeres**

El condón femenino es el primer método de barrera usado por mujeres que proporciona una doble protección: previene los embarazos y protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se presenta como otra opción anticonceptiva para hombres y mujeres, particularmente para aquéllos/as en riesgo de ETS. El condón femenino está fabricado de un plástico de poliuretano con un anillo del mismo material en cada extremo. El anillo del extremo cerrado se utiliza para insertar el dispositivo dentro de la vagina y para mantenerlo en su lugar en el cérvix; el anillo del extremo abierto permanece fuera de la vagina después de la inserción y cubre la zona genital externa (ver ilustración a la derecha).

El condón femenino fue comercializado por primera vez en Suiza en 1992; a contar de 1996 está disponible en 13 países, incluyendo varias naciones europeas, los Estados Unidos, Sudáfrica, Tailandia y Corea.¹ En la comunidad internacional existe un interés renovado en el condón femenino, dado que entre las mujeres de muchos países en desarrollo aún hay necesidades anticonceptivas por satisfacer y altas tasas de ETS—incluyendo el virus de inmunodeficiencia humano (VIH). Una encuesta realizada en 60 países por UNAIDS—Programa de las Naciones Unidas para el Control del SIDA— estimó la demanda mundial para 1998 de condones femeninos (a precios razonables) en 13 millones.²

Eficacia en la Prevención del Embarazo y de las ETS


El condón femenino usado correctamente y en forma consistente en cada relación sexual, es eficaz para prevenir los embarazos; si no se usa conforme a estas pautas, las

tasas de falla aumentan. Un estudio estima que si el condón femenino se usa siempre en forma correcta (uso perfecto) se embaraza cerca del cinco por ciento de las usuarias durante el primer año. La tasa de falla para un año aumenta a un 21 por ciento con pautas de uso no perfecto. Un estudio en 377 mujeres de seis centros de EE.UU. y tres de América Latina reportó una tasa acumulativa de embarazo accidental para seis meses de uso de 15 por ciento entre las usuarias imperfectas del condón femenino (12,4 por ciento entre las mujeres de EE.UU. y 22,2 entre las mujeres latinoamericanas). Entre las usuarias que usaron el condón femenino en forma perfecta, la tasa de falla para 6 meses disminuyó tres veces— a un 4,3 por ciento (2,6 por ciento para las mujeres de EE.UU. y 9,5 por ciento para las mujeres latinoamericanas).⁴ Las tasas de discontinuación luego de seis meses fueron de un 55 por ciento para las mujeres latinoamericanas y un 32 por ciento para las norteamericanas.

Existen pocos datos sobre el grado de protección del condón femenino contra las ETS. Sin embargo, los resultados sobre uso-eficacia de dos estudios son prometedores. Según una investigación hecha en EE.UU. en la que se analizó la tasa de tricomoniasis vaginal recurrente en 104 mujeres que recibieron tratamiento para la infección, la tasa de reinfección fue de 0 para las usuarias perfectas del condón femenino, alrededor de un 15 por ciento entre 34 usuarias imperfectas y 14 por ciento entre 50 controles (no usuarias) por un período de seguimiento de 45 días.⁵ Estudios de laboratorio han encontrado que el condón femenino es impermeable a los organismos causantes de ETS, incluyendo el VIH.

Nuevas evidencias de un estudio realizado con trabajadoras del sexo en Tailandia sugieren que la disponibilidad de condones femeninos puede reducir la tasa de ETS en esta población, probablemente porque disminuye el número de relaciones sexuales no protegidas. Aquellas trabajadoras del sexo a las que se les ofreció tanto condones femeninos como masculinos mostraron un 34 por ciento de disminución en la incidencia de ETS y un 25 por ciento de disminución en el número de relaciones sexuales no protegidas, comparadas con aquéllas a las que se les ofreció sólo el condón masculino.²

El condón femenino usado correctamente puede ofrecer una mejor protección contra algunas ETS que los condones masculinos. Esto se debe a que el condón femenino cubre una mayor área de los genitales externos que el



Insertando el condón femenino.

Ilustración cortesía de Wisconsin Pharnacal, como se publicó en Outlook, Volumen 10, Número 2, Septiembre de 1992.

TABLA 1

Resumen de Estudios Seleccionados de Aceptabilidad en Países Africanos

País	Número de Participantes	Aceptabilidad de la Usuaría	Aceptabilidad de la Pareja
Kenia	100 mujeres; 46 parejas	<ul style="list-style-type: none"> • el 93% se mostraron siempre satisfechas/os con el condón femenino • al 86% le gustó mucho 	<ul style="list-style-type: none"> • Los hombres en general encontraron aceptable el condón femenino; un hombre reaccionó violentamente cuando una mujer le sugirió usarlo
Malawi	57 parejas; 46 TDS [†]	<ul style="list-style-type: none"> • al 95% de las mujeres no TDS y al 100% de las TDS les gustó el condón femenino • el 81% de las participantes del estudio prefirió el condón femenino al masculino 	<ul style="list-style-type: none"> • Al 96% de los hombres les gustó mucho o bastante el condón femenino • El 67% lo prefirió al condón masculino; el 93% dijo que lo usaría nuevamente.
Uganda	100 TDS; 90 mujeres urbanas y 30 mujeres rurales	<ul style="list-style-type: none"> • al 90%-100% de las TDS, al 90% de las mujeres urbanas y al 100% de las mujeres rurales les gustó mucho o bastante el condón femenino 	<ul style="list-style-type: none"> • el 90% de las mujeres TDS y de las mujeres rurales dijeron que a su pareja estable le había gustado mucho o bastante.
Zimbabwe	89 TDS, 84 mujeres urbanas y 23 mujeres rurales	<ul style="list-style-type: none"> • A más del 90% de todas las mujeres les gustó mucho o bastante. • El 66% de las mujeres urbanas, el 100% de las mujeres rurales y el 80% de las TDS lo prefirieron al condon masculino. 	<ul style="list-style-type: none"> • Más del 75% de las mujeres urbanas y rurales dijeron que a sus parejas estables les gustaba. • Alrededor del 75% de las TDS dijeron que a sus clientes les había gustado.

† TDS= Trabajadoras del Sexo

Adaptado de OMS, 1997.¹

condón masculino. Además, el poliuretano del condón femenino es más firme y más resistente a la ruptura que los condones de látex masculinos.

Perspectivas de las Usuarías

Los estudios de aceptabilidad del condón femenino fueron realizados tanto en países desarrollados como en desarrollo, aunque en general con un número pequeño de participantes. Si bien los resultados de aceptabilidad han sido diversos, hombres y mujeres en muchos lugares han reportado que el condón femenino les “gusta mucho” o “bastante” (ver Tabla 1). Cuando se les pide comparar el condón femenino con el masculino, los porcentajes van desde un 40% hasta un 100% de hombres y mujeres que dicen preferir el condón femenino al masculino.¹

La aceptabilidad del condón femenino se ve afectada por sus cualidades estéticas: una preocupación específica que las mujeres a menudo mencionan es la de la apariencia y sensación de protuberancia del anillo externo.^{1, 6} Otras preocupaciones acerca del dispositivo han incluido la dificultad para insertarlo, el dolor causado por el anillo interior en ambos miembros de la pareja, el ruido que se produce durante la relación sexual y la eventualidad de que el anillo quede comprimido al interior de la vagina durante la relación sexual.¹

¿Es el condón femenino un método realmente controlado por la mujer? Una de las razones esenciales que motivó el desarrollo del método fue el poder proporcionar a las mujeres un método de barrera acerca del cual no tuvieran que negociar con su pareja. En tanto el uso de los condones femeninos generalmente lo inician las mujeres, es esencial la cooperación y aceptación de la pareja para un uso sostenido y eficaz. A menudo se ha manifestado que es la resistencia de la pareja lo que motiva que no se use o se interrumpa su uso. Por otro lado, a menudo las mujeres han descubierto que a sus parejas también les

gusta el condón femenino y que lo prefieren a otros métodos (ver Tabla 1). Datos anecdóticos de proyectos actuales de comercialización social revelan que entre un 20 a un 50 por ciento de los compradores de los condones femeninos son varones.⁷

Disponibilidad y Problemas de Costo

Aunque el condón femenino no es un método perfecto, la demanda es importante entre ciertos grupos de mujeres y hombres. Sin embargo, en los países en desarrollo, los condones femeninos no están ampliamente disponibles.

Una manera de incrementar el acceso a los condones femeninos es a través de la comercialización social. Hasta ahora, ésta se ha visto limitada a esfuerzos en pequeña escala, generalmente enfocados a prevenir las ETS/VIH. Por ejemplo, Servicios para la Población Internacional (Population Services International-PSI) comercializó en 1996, a modo de prueba, un total de 96.000 condones femeninos en cinco países —Bolivia, Haití, Guinea, Sudáfrica y Zambia.⁷ El condón femenino se posicionó como una alternativa eficaz al condón masculino para proteger tanto de embarazos no deseados como de las ETS/VIH. Se pusieron a la venta en farmacias, en pequeños almacenes generales y a través de los trabajadores comunitarios. Su comercialización fue realizada mayormente a través de la comunicación interpersonal, con escaso apoyo de los medios de comunicación y dirigida principalmente a las trabajadoras del sexo y a los estudiantes universitarios.⁷

En Zimbabwe, un proyecto de comercialización social a gran escala iniciado en Julio de 1997 promovió los condones femeninos como: “la funda de protección anticonceptiva: para hombres y mujeres”. El condón de protección se podía adquirir en farmacias y consultorios en todos los principales pueblos y ciudades de Zimbabwe y su costo era aproximadamente el equivalente de US\$ 0.14 por

condón. Durante los primeros cuatro meses se vendieron más de 100.000.⁷

El alto costo de los condones femeninos comparado con el de los condones masculinos constituye una barrera para su uso. En los países en desarrollo, cuando se vende a través de los canales regulares, el condón femenino cuesta entre US\$ 2 y US\$ 3 —un precio que la mayoría de las mujeres no puede costear.^{1, 2, 8} La UNAIDS negoció un precio preferencial para el sector público de aproximadamente US\$ 0,63 por condón, pero esto todavía es demasiado caro para muchas mujeres en todo el mundo. Los resultados de estudios de comercialización social sugieren que las consumidoras hubieran estado dispuestas a comprar el condón femenino sólo a un precio muy inferior, por ejemplo US\$ 0,03 en Zimbabwe, US\$ 0,06 en Haití, hasta US\$ 0,32 en Bolivia.^{1,6,7} Sin embargo, estos precios aún siguen siendo más elevados que los precios de los condones masculinos.

Debido a su alto costo, se ha informado que las mujeres a menudo reutilizan el condón femenino (el que se ha aprobado sólo para ser usado una vez). La reutilización plantea varias inquietudes, incluyendo la posibilidad de que el condón se rompa, que no resista, que se haga permeable a los microorganismos y eventualmente se contamine con microbios.¹ Actualmente, se están investigando estos aspectos que implican el hecho de reutilizarlos.

Implicaciones de los Programas

Cuando se usa en forma correcta y consistente, el condón femenino puede ser bastante eficaz en prevenir el embarazo y las ETS. Los datos crecientes sobre la aceptabilidad y demanda del dispositivo sugieren que puede ser aceptable para ciertas mujeres y hombres. A fin de que el método sea más accesible, se deben bajar los precios y buscar la manera adecuada para promocionarlo. En muchos lugares es importante dirigir la promoción del condón femenino tanto a hombres como a mujeres, dado que la cooperación de los hombres es fundamental para usarlo. También es importante abordar las inquietudes de las usuarias en cuanto a la estética y al uso inadecuado. Al igual de lo que sucede con todos los métodos, hombres y mujeres estarán mejor dispuestos a entender y usar el condón femenino adecuadamente cuando: personal entrenado de los consultorios o trabajadores comunitarios les describen claramente el uso del método; se les explica que se requiere cierta práctica para que el uso sea cómodo; y cuando se enfatiza en el apoyo, la consejería, el uso consistente y el seguimiento. Por último, es importante que continúen los estudios sobre la eficacia y la aceptabilidad del condón femenino, de manera que se defina con más exactitud el concepto de uso apropiado.

1. World Health Organization. The female condom: a review. Geneva. WHO/HRP/WOM/97.1
2. UNAIDS. The female condom and AIDS. UNAIDS point of view (April 1997). <http://www.unaids.org/unaids/bpc/pointv/femalepv.pdf> (October 24, 1997).
3. Trussel, J. et al. Comparative contraceptive efficacy of the female condom and other barrier methods. *Family Planning Perspectives* 26(2):66-72 (1994).
4. Farr, G. et al. Contraceptive efficacy and acceptability of the female condom. *American Journal of Public Health* 84(12):1, 960-964 (1994).
5. Soper, D.E. et al. Prevention of trichomoniasis by compliant use of the female condom. *Sexually Transmitted Diseases* 20(3):137-139 (1993).

6. Ray, S. et al. Acceptability of the female condom in Zimbabwe: positive but male centered responses. *Reproductive Health Matters* 5:494-503 (1995).
7. Stallworthy, G. (Population Services International). Personal correspondence, October 24, 1997.
8. AIDSCAP. The female condom: from research to the marketplace (August 1997).

SEGURIDAD

Duchas Vaginales: ¿Innecesarias y Potencialmente Dañinas?

Las duchas vaginales —que consisten en lavar la vagina como medida de higiene, para aliviar los síntomas de una infección o en un intento para evitar un embarazo— son una antigua práctica realizada por millones de mujeres en todo el mundo. Sólo en los Estados Unidos, se estima que más de 20 millones de mujeres usan la ducha vaginal en forma habitual, ya sea con una preparación comercial o casera. También es habitual entre las mujeres africanas y asiáticas. En estas culturas, generalmente se usan sustancias secas —como hojas de hierbas o polvos— para tratar los síntomas de una infección o para aumentar la sensación de placer durante la relación sexual (ver cuadro, página 7). Pocos estudios han abordado los riesgos y beneficios de la ducha vaginal y los resultados de estudios disponibles no son consistentes.

Un reciente meta-análisis que incluyó estudios publicados en los últimos treinta años indica que la ducha vaginal frecuente puede asociarse a efectos adversos para la salud. El meta-análisis incluyó principalmente estudios hechos en los Estados Unidos; también se incluyeron algunos estudios de América Latina. En todos se ajustaron los resultados de acuerdo a factores confundentes, como el número de parejas sexuales, el estado civil y la frecuencia de relaciones sexuales. El análisis encontró que la ducha vaginal usada una vez a la semana o con mayor frecuencia se asociaba a un aumento significativo del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y a un riesgo moderado de embarazo ectópico. El análisis encontró también un cierto aumento del riesgo de cáncer cervical entre las mujeres que usaban duchas vaginales frecuentes, pero este resultado fue poco claro.¹ Las implicaciones de este meta-análisis son importantes debido a lo común de esta práctica y dado que muchos proveedores de salud y mujeres no están en conocimiento de los potenciales riesgos.

¿Por qué las mujeres practican la ducha vaginal? Un estudio hecho en EE.UU. encontró que entre las mujeres urbanas la razón más frecuente era por higiene —para sentirse limpias después de la relación sexual y/o después de la menstruación.² Alrededor de la mitad de las mujeres de este estudio usaban la ducha vaginal con una preparación comercial, el 30 por ciento usaba una mezcla casera de vinagre y agua, un 10 por ciento usaba sólo agua y el 10 por ciento usaba otro tipo de preparaciones.

En general, el uso de la ducha vaginal se asoció a tres características: pertenencia a una clase socio-económica baja, mayor riesgo de contraer ETS y presencia de síntomas sugerentes de infección vaginal.

Pese a la percepción de que la ducha vaginal favorece la higiene genital, la mayoría de los proveedores de salud aconsejan que ésta no es necesaria después del período menstrual o después de la relación sexual, ya que la pared vaginal se auto-limpia. A menos que una mujer presente una condición médica en que se le haya prescrito específicamente la ducha vaginal, la práctica es innecesaria e incluso puede ser perjudicial.

Posibles Riesgos de la Ducha Vaginal

Aunque sólo dos estudios caso-control realizados durante los últimos treinta años han analizado específicamente el tema, aparece una probable asociación entre la ducha vaginal y la EPI. Los resultados de estos estudios —que contemplaron posibles factores confundentes, incluyendo el número de parejas sexuales, sugieren que las mujeres que usan duchas vaginales presentan un aumento de un 73% del riesgo de EPI comparadas con las mujeres que no las usan.¹ El riesgo relativo general combinado de estos dos estudios fue 1,73 (95% intervalo de confianza [IC]=1,07 - 2,79). Mientras mayor era la frecuencia de las duchas vaginales, mayor era el riesgo de presentar una EPI. Una explicación posible para este aumento del riesgo es que la ducha vaginal ayuda a los agentes patógenos a ascender por el cérvix hacia el útero y las trompas de Falopio. Es necesario seguir investigando para poder confirmar una relación de causa-efecto.

La asociación entre ducha vaginal y embarazo ectópico también se ha visto respaldada por algunos estudios. Los resultados combinados de cinco estudios caso-control realizados en hospitales mostraron que las mujeres que practicaban duchas vaginales presentaban un aumento del riesgo de un 76 por ciento de tener un embarazo ectópico comparadas con las que no lo hacían.¹ Nuevamente, estos estudios fueron controlados respecto de factores confundentes.

Algunos investigadores sugieren que existe una mayor probabilidad de que la ducha vaginal fomente las infecciones ascendentes en ciertos periodos del ciclo menstrual.¹ Inmediatamente después de la regla, el orificio cervical es pequeño y presenta un tapón mucoso grueso y viscoso que impide el paso de muchos patógenos. A medida que se aproxima la ovulación, el orificio se abre, la mucosa se adelgaza y escurre más fácilmente. Por lo tanto, los investigadores sugieren que la ducha vaginal puede ser causa de mayor riesgo en el período de ovulación. Otro factor influyente puede ser la presión con que se aplica la solución de la ducha vaginal.

Desde los años 1930, se ha sugerido que la ducha vaginal puede ser un factor de riesgo de cáncer cervical. Sin embargo, los resultados de los estudios no han sido consistentes. Los resultados combinados de seis estudios caso-control a gran escala mostraron una débil asociación entre ducha vaginal y cáncer cervical (riesgo relativo = 1,25, 95% IC=0,99 - 1,59). Se encontró una asociación más significativa entre las mujeres que practicaban la ducha vaginal al menos una vez por semana (riesgo relativo ajustado = 1,86, 95% IC=1,29 - 2,68). Sin embargo, aún es poco claro el posible mecanismo biológico de asociación y

¿Sexo Seco: Implica Riesgo de ETS?

El sexo seco es una práctica cultural habitual en muchos países de Sudáfrica, África Central y África Oriental. Consiste en utilizar hierbas, productos farmacéuticos, métodos absorbentes tales como paños, u otras sustancias para secar y estrechar la vagina antes de la relación sexual. Habitualmente se utilizan una amplia variedad de sustancias, incluyendo jabones, piedras, pasta de diente y muchos tipos de hierbas. Estas prácticas se realizan por una diversidad de razones culturales y a menudo se aprenden de las mujeres mayores, de parientes o como parte del ritual de iniciación de las jóvenes adolescentes. La razón citada con más frecuencia del por qué se usa el sexo seco es que aumenta el placer sexual del varón, pero las mujeres también dicen usar estas hierbas y sustancias para limpiar la vagina antes y después de la relación sexual y para tratar los síntomas de infección vaginal.

Dada la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual en estas regiones, los investigadores y los programas de prevención del SIDA se han interesado en el efecto de estas sustancias sobre el tejido vaginal y las implicaciones de su uso con el condón. Algunos estudios han mostrado una asociación entre el uso de sustancias intravaginales y el VIH; otros no. En Zaire, un estudio en 377 trabajadoras del sexo encontró que la introducción de cualquier producto en la vagina se asociaba a seropositividad para VIH (razón de chance de 2,4; 95% IC=1,2 - 4,8), aunque el uso de agentes intravaginales específicos para estrechar la vagina no mostró asociación.³

En general las sustancias que se usan para producir sexo seco pueden causar inflamación vaginal, descamación del tejido vaginal y abrasión del pene o de la vagina, todos factores que pueden aumentar el riesgo de transmisión de ETS/VIH. Las hierbas y otras sustancias pueden también enmascarar los síntomas de alguna ETS, aumentando así el riesgo de transmisión del VIH. Las prácticas del sexo seco también pueden afectar el uso del condón y su eficacia. En un estudio realizado entre educadores sobre el VIH/SIDA en Zimbabwe, las mujeres reportaron que los condones usados con sexo seco a menudo se rompían, ya sea porque la vagina se encontraba demasiado estrecha, o posiblemente debido a la interacción química o abrasiva con las sustancias.⁴

Aunque existe poca información disponible, los proveedores de salud que trabajan en regiones donde las prácticas del sexo seco son habituales debieran estar preparados para conversar sobre estas prácticas con sus clientes e informarles que con ellas se exponen a un aumento del riesgo de ETS.⁴

se ha planteado la preocupación de que la ducha vaginal puede ser una simple manera de identificar otros factores de riesgo de cáncer cervical, incluyendo la infección por VPH.¹

La ducha vaginal también puede afectar la fertilidad. Entre 849 mujeres casadas que habían tenido al menos un parto en Estados Unidos, la ducha vaginal apareció como un factor de disminución de la fertilidad.⁵ Las mujeres que practicaban la ducha vaginal presentaron una probabilidad 30 por ciento menor de quedar embarazadas cada mes. Las mujeres jóvenes que practicaban duchas vaginales presentaron una disminución significativamente mayor de la fertilidad que las mujeres mayores. No está claro el mecanismo que explique esta disminución,

aunque se ha sugerido que pudieran producirse alteración de los pH de la vagina o de los tejidos. Aunque las duchas vaginales parecen inducir a una disminución de la fertilidad, su efecto es leve y no se debiera confiar en ellas como método para prevenir un embarazo.

Los resultados de los pocos estudios que han evaluado la ducha vaginal y el riesgo de infección por ETS sugieren que las duchas vaginales frecuentes pueden asociarse con un aumento del riesgo de ETS y VIH, aunque también es posible que las mujeres en riesgo de ETS sean más proclives a practicar la ducha vaginal. En Indonesia, un estudio de 599 mujeres embarazadas que estaban siendo atendidas en una clínica prenatal encontró que la presencia de ETS se asociaba a los hábitos de ducha vaginal.⁶ Comparadas con las mujeres que nunca habían practicado duchas vaginales, las mujeres que siempre lo habían hecho con un preparado comercial o con una sustancia tradicional llamada hoja del bedel presentaron un aumento substancial del riesgo de enfermedades de transmisión sexual (razón de chance 9,4, 95% IC=1,8 - 50,3). La ducha sólo con agua después de la relación sexual no se asoció con riesgo de ETS.

Los investigadores también están evaluando una posible asociación entre frecuencia y tipo de ducha y la infección por VIH. En un estudio de 397 mujeres referidas a una clínica de ETS en la República de África Central, las que practicaban la ducha vaginal con una preparación tradicional no comercial, tenían una mayor probabilidad de infección por VIH que las mujeres que nunca lo habían hecho (razón de chance 1,7, 95% IC=1,0 - 3,0). Por otra parte, las mujeres que practicaban la ducha vaginal con antisépticos comerciales presentaron una menor probabi-

lidad de infección por VIH (razón de chance 0,6, 95% IC=0,4 - 0,9). En todos los análisis, los investigadores ajustaron los resultados a potenciales factores confundentes, tales como estado civil, número de parejas sexuales y frecuencia de las relaciones sexuales.³ Es necesario seguir investigando para confirmar estos resultados.

Conclusión

Aunque los datos sobre los efectos de la ducha vaginal son escasos, pareciera que esta práctica puede ser más perjudicial que beneficiosa. Usada con frecuencia, parece asociarse a una mayor probabilidad de ETS, EPI y embarazo ectópico. Las mujeres que recurren a la ducha vaginal también experimentan una menor fertilidad. Se debe seguir investigando para confirmar estos descubrimientos. Mientras tanto, se debiera aconsejar a las mujeres en el sentido que la ducha vaginal no es necesaria y puede ser perjudicial.

1. Zhang, J. et al. Vaginal douching and adverse health effects: a meta analysis. *American Journal of Public Health* 87(7):1207-1211 (July 1997).
2. Rosenberg, M. et al. Vaginal douching, who and why? *Journal of Reproductive Medicine* 36(10):753-758 (October 1991).
3. Mann, J. et al., eds. *AIDS in the World*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (1992).
4. Civic, D. and Wilson, D. Dry sex in Zimbabwe and implications for condom use. *Social Science Medicine* 42(1): 91-98 (1996).
5. Baird, D.D. et al. Vaginal douching and reduced fertility: *American Journal of Public Health* 86(6):844-850 (June 1996).
6. Joesoef, M.R. et al. Douching and sexually transmitted diseases in pregnant women in Surabaya, Indonesia. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 174 (1 Pt 1): 115-119 (January 1996).

JUNTA ASESORA

•Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de la Salud de Italia •Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU. •Rebecca J. Cook, Profesor de Facultad de Leyes, Universidad de Toronto, Canadá •Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU. •Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile •Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU. •John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido •Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia •Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU. •Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU. •Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido •Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU. •Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU. •Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU. •Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. de Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.

© PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH) (PROGRAMA PARA TECNOLOGIA APROPIADA EN SALUD). 1997. DERECHOS RESERVADOS.

OUTLOOK

Outlook es publicado por PATH en Inglés y Francés y está disponible en Español, Chino, Portugués y Ruso. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en Español de *Outlook*, con el patrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), División para Latinoamérica y el Caribe. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquéllas de sus patrocinadores, de los miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo. *Outlook* se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editor: Jacqueline Sherris, Ph.D.

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.

Teléfono: 206-285-3500

Fax: 206-285-6619

E-mail:outlook@path.org URL:www.path.org

Las redactoras de este número fueron Maggie Kilbourne-Brook y Tuong Nguyen.

Además de algunos miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, las siguientes personas revisaron este número: M. Cabral, J. Cottingham, G. Stallworthy, Dr. G. Thomas, Dr. K. Vogelsson y Dr. J. Zhang. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.