

OUT LOOK

Salud Reproductiva de los Adolescentes: Los Programas que Marcan una Diferencia

La adolescencia* es una etapa de la vida que trae consigo crecimiento, cambios, oportunidades y, con bastante frecuencia, riesgos para la salud reproductiva. En todo el mundo, existe cada vez más consenso sobre la necesidad de contar con mejores servicios de asistencia social y de salud para los adolescentes ^(NT), incluyendo servicios de salud reproductiva. En respuesta a las recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 –CIPD (ver cuadro, página 2), organizaciones de muchos países han creado diversos programas dirigidos a satisfacer en mejor medida las necesidades de salud reproductiva de este grupo. Si bien hoy en día los programas son escasos y limitados para cubrir las necesidades mundiales, y su evaluación no se ha hecho en forma adecuada, los proyectos pilotos y los esfuerzos innovadores en muchas regiones sí nos proporcionan valiosa información acerca de cuáles son las actividades que ayudan a marcar una diferencia y cuáles no.

Aproximadamente mil millones de personas —cerca de una de cada seis que viven en el planeta— son adolescentes, y el 85 por ciento de ellos vive en países en desarrollo.¹ Muchos tienen una vida sexual activa (aunque no siempre por opción propia), y en algunas regiones aproximadamente la mitad son casados.² Diversos son los desafíos que enfrentan los adolescentes respecto de su salud reproductiva. Cada año, alrededor de 15 millones de jóvenes entre 15-19 años dan a luz, 4 millones se someten a un aborto y 100 millones contraen alguna enfermedad de transmisión sexual curable (ETS). En todo el mundo, el 40 por ciento de todos los casos nuevos de infección por VIH se presenta entre los 15 y los 24 años, y cifras recientes muestran que se producen 7.000 casos nuevos cada día.³ Son muchos los factores vinculados que contribuyen a estos riesgos, tales como las expectativas con respecto a un matrimonio temprano y a las relaciones sexuales, el acceso a la educación y al empleo, la falta de equidad entre los géneros, la violencia sexual y la influencia de los medios de comunicación masivos y de la cultura popular. A menudo, los adolescentes carecen de la información básica sobre salud reproductiva, no saben cómo negociar con respecto a sus relaciones sexuales y tienen poco acceso a servicios de salud reproductiva confidenciales y a bajo costo.

Inquietudes tales como si se respetará su privacidad, si podrán cancelar lo que se les cobra, si se los enjuiciará o se sentirán enjuiciados por los proveedores de servicios limitan aún más el acceso a los servicios allí donde los hay, de igual modo que las barreras legales restringen el acceso a la información y a los servicios. Muchos adolescentes no tienen una relación cercana y

*Nota del Editor: La adolescencia es considerada por la OMS como el período de la vida entre los 10 y los 19 años. La juventud es definida por las Naciones Unidas como el período entre los 15-24 años. El término "jóvenes" a menudo es usado para englobar a ambos grupos de edad, vale decir a aquellas personas entre los 10 y los 24 años.

(NT) Nota del Traductor: el término "adolescentes" y "jóvenes" en este artículo, se refiere tanto a los de sexo masculino como femenino.

estable con sus padres o con otros adultos para conversar sobre aquellos aspectos de su salud reproductiva que les inquietan.

A pesar de todas estas dificultades, los programas que se preocupan por las necesidades de información y servicios de los adolescentes sí pueden marcar una verdadera diferencia. Aquellos programas exitosos son los que ayudan a los jóvenes a desarrollar capacidades que les permitan formular planes para sus vidas, que respetan sus necesidades e inquietudes, que logran involucrar a la comunidad en sus esfuerzos y que proporcionan servicios clínicos sin emitir juicios y respetando la confidencialidad. En este artículo queremos revisar los aspectos que influyen en la salud reproductiva de los adolescentes, analizar los programas que se han implementado y evaluar lo que se ha aprendido a través de ellos.

Riesgos para la Salud Reproductiva

La salud reproductiva de los adolescentes se ve afectada por el embarazo, el aborto, las ETS, la violencia sexual y por los sistemas que restringen el acceso a la información y a los servicios clínicos. Otros factores que influyen son la nutrición, el bienestar psicológico y las desigualdades económicas y de género, que contribuyen a que jóvenes tengan relaciones sexuales forzadas, obligadas o por necesidad económica.⁴

Embarazo. En muchos lugares del mundo, las mujeres se casan y dan a luz siendo aún adolescentes (ver Tabla 1). En ellas, el embarazo y el parto implican mayores riesgos de morbilidad y mortalidad que en las mujeres entre veinte y treinta años (ver *Outlook*, Volumen 16, Número Especial), especialmente en aquellos lugares donde la atención médica es limitada. Frente a un parto prolongado o con complicaciones, a hemorragia y a otros factores, las jóvenes menores de 18 años enfrentan un riesgo dos a cinco veces mayor de morir, en comparación con las mujeres entre 18-25 años⁵. Las enfermedades asociadas al embarazo que implican un potencial riesgo para la vida, como la hipertensión y la anemia, también son más comunes entre las madres adolescentes, especialmente en aquellos lugares donde la desnutrición es endémica.

Aborto en condiciones de riesgo. En las adolescentes, los embarazos no deseados a menudo concluyen en aborto. Encuestas realizadas en países en desarrollo revelan que hasta un 60 por ciento de los embarazos en mujeres menores de 20 años no son embarazos programados o deseados.⁶ Más del 50 por ciento de los abortos realizados a fines de los 80 en Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelandia y los Estados Unidos se realizaron en mujeres menores de 25 años.⁷

Tabla 1. Porcentaje de Mujeres entre los 20 y 24 años que Dieron a Luz a los 20,[†] Regiones y Países Seleccionados

China	14 %
América Latina y El Caribe	27-50 %
Norte de Africa/Medio Oriente	13-41 %
Africa Sub-Sahariana	25-75 %
Sur de Asia	16-66 %
Sudeste de Asia ^{††}	21-33 %
Estados Unidos	22 %

[†] Datos de 1980 y 1990.

^{††} Datos de Indonesia, Filipinas y Tailandia.

Fuente: AGI, 1998.⁹

Recomendaciones de la CIPD a los Servicios de Salud Reproductiva para Adolescentes

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) instó a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a desarrollar programas que abordaran los aspectos de salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Al mismo tiempo se instó a que los países eliminaran las barreras legales, reguladoras y sociales que restringen el acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva para adolescentes¹⁰ y se definieron qué elementos era necesario poner al alcance de los jóvenes, incluyendo:

- información y consejería sobre planificación familiar;
- servicios clínicos para adolescentes sexualmente activos;
- servicios para adolescentes embarazadas, y para madres y padres adolescentes;
- consejería en aspectos sobre género, violencia, conducta sexual responsable, enfermedades de transmisión sexual; y
- prevención y tratamiento del abuso sexual y del incesto.

Desde que se llevó a cabo la CIPD, ha habido importantes progresos. Son más los países que están formulando programas y políticas de salud reproductiva para adolescentes, y existen más programas orientados a mirar de manera integral los servicios, considerando cómo las influencias de la sociedad afectan las conductas. Los adolescentes están participando cada vez más en el desarrollo y evaluación de programas, y hay un énfasis renovado en la importancia de que los programas se desarrollen en un ambiente en que no se enjuicie a los jóvenes y se respete la confidencialidad.¹¹

En muchos países en desarrollo, las estudiantes embarazadas a menudo se someten a abortos para evitar que se las expulse de la escuela.⁸

A menudo, el aborto inducido implica mayor riesgo para las adolescentes que para las mujeres de más edad. Las adolescentes suelen esperar más antes de solicitar atención, ya sea porque no tienen acceso a un proveedor de salud o porque no se han dado cuenta de que están embarazadas. El problema es aún mayor en países donde sólo se practican abortos en condiciones de riesgo. En Nigeria, por ejemplo, el 50-70 por ciento de las mujeres que se hospitaliza por complicaciones de un aborto inducido son menores de 20 años; una revisión que abarcó un período de 13 años encontró que, en un hospital universitario, el 72 por ciento de las muertes maternas en mujeres menores de 19 años se habían debido a complicaciones por aborto en condiciones de riesgo.¹²

ETS, incluyendo el VIH. Las infecciones por ETS pueden acarrear problemas de salud para toda la vida, incluyendo infertilidad y dolor crónico, y aumentar el riesgo de transmisión del VIH. Cada año se producen aproximadamente 333 millones de casos curables de ETS; los datos disponibles sugieren que un tercio de las infecciones por ETS en países en desarrollo ocurre en jóvenes de 13-20 años.¹³ En sectores rurales de Kenya, por ejemplo, el 41 por ciento de las mujeres entre 15-24 que acuden a los consultorios de salud materno-infantil y los de planificación familiar se han infectado con una ETS, en comparación con un 16 por ciento de todas las mujeres en edad reproductiva.⁹

Los adolescentes presentan un mayor riesgo de adquirir el VIH/SIDA. Estimaciones recientes indican que más del 40 por ciento de las infecciones por VIH ocurre en jóvenes entre los 15-24 años, lo que representa 7.000 de un total de 16.000 nuevos casos infectados cada día. Las infecciones nuevas entre las

mujeres son más frecuentes que en los hombres en razón de 2 a 1.³ Son varios los factores que predisponen a las jóvenes a un riesgo mayor de adquirir una ETS, incluyendo el VIH/SIDA. A menudo tienen relaciones sexuales no planificadas o no deseadas^{14,15} (ver el párrafo de Factores socioculturales que aparece más adelante). Incluso cuando se trata de relaciones sexuales a las que sí han consentido, en general las adolescentes no están preparadas para usar el condón u otro método anticonceptivo y —por falta de experiencia— es más probable que usen el método de manera incorrecta.¹⁶ Además, las muchachas adolescentes presentan un mayor riesgo de infección que las mujeres de más edad debido a la falta de madurez de su sistema reproductivo.

Mutilación Genital Femenina (MGF). La MGF, que consiste en la ablación parcial o total de los genitales externos u otra forma de mutilación de los genitales femeninos, es una práctica fuertemente arraigada en algunas culturas y tiene graves consecuencias para la salud reproductiva de adolescentes y mujeres adultas. La mayoría de las mujeres a las que se les ha practicado una MGF vive en uno de los 28 países africanos, y cerca de dos millones de niñas son sometidas a esta intervención cada año.¹⁷ Además del trauma psicológico asociado a la mutilación, la MGF puede ir acompañada de infección, hemorragia y estado de conmoción. El sangrado no controlado o la infección pueden conducir a la muerte dentro de horas o días. Algunas formas de MGF dan origen a dolor crónico en las relaciones sexuales, a infecciones pélvicas recurrentes y prolongadas, y a partos complicados. El programa de acción de la CIPD establece que la MGF constituye una violación a los derechos humanos e insta a los gobiernos a suprimir su práctica. En el próximo número de *Outlook* analizaremos con más detalles la MGF.

Factores socioculturales. El abuso y la coerción sexual aumentan el riesgo para la salud de los adolescentes, al igual como sucede con las normas culturales asociadas al género y las relaciones sexuales. Por ejemplo:

- En algunos países, como el caso de India, todavía son comunes los matrimonios arreglados en las niñas menores de 14 años.
- Hay relaciones sexuales en niñas que son aún pequeñas —entre los 9 y 12 años. Ello debido a que los hombres mayores buscan a jovencitas menores como parejas sexuales para evitar el contagio de infecciones de ETS/VIH.²
- Algunas culturas esperan que los muchachos tengan su primera relación sexual con una prostituta.
- Entre los adolescentes son especialmente las muchachas las que experimentan relaciones sexuales forzadas. En Uganda, por ejemplo, el 40 por ciento de un total de 400 estudiantes de la educación primaria sexualmente activas informaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales.¹⁸
- En Africa Sub-Sahariana, la primera experiencia sexual de algunas muchachitas ocurre con un “papá acaramelado” que le regala ropa, paga su escuela y le compra los libros a cambio de sexo.
- En los países en desarrollo, millones de niños/as viven y

trabajan en las calles, y muchos de ellos se ven enfrentados a tener que practicar “sexo de supervivencia”, en el que intercambian actividad sexual por comida, dinero, protección o drogas.¹⁹ Por ejemplo, una encuesta realizada en Ciudad de Guatemala encontró que —de 143 niños entrevistados que viven en la calle— el 40 por ciento había tenido su primer encuentro sexual con un desconocido; todos habían intercambiado sexo por dinero; todos habían sido abusados sexualmente y el 93 por ciento se había infectado con una ETS.²⁰

- En Tailandia, se estima que 800.000 prostitutas son menores de 20 años; de éstas, 200.000 son menores de 14 años. Algunas son vendidas por sus padres en el mercado de la prostitución, con el fin de obtener sustento para el resto de la familia.¹⁵

El Desafío de Desarrollar Programas Eficaces

Los programas enfocados a mejorar la salud reproductiva de los adolescentes enfrentan varios desafíos. Además de su labor en cuanto a proporcionar información y servicios clínicos apropiados, deben ayudar a los jóvenes a desarrollar su capacidad para tomar decisiones y otras capacidades importantes. Es necesario que los programas tomen en cuenta los factores subyacentes que influyen en la elección de los adolescentes (como las normas culturales, la influencia de sus pares, los medios de comunicación masivos y la precariedad de la situación económica en que están insertos) y que implementen estrategias que satisfagan las necesidades de este grupo. Además, es importante que los programas consigan el apoyo comunitario y político para las actividades que se han propuesto.

Adecuar los servicios clínicos a las necesidades de los adolescentes. Tendrán más éxito aquellos servicios de salud que cuenten con proveedores entrenados para abordar las preocupaciones específicas de salud de los adolescentes y aconsejarlos acerca de los temas de salud reproductiva más

sensibles (ver cuadro, página 4). En todo tipo de intervención, los proveedores deben considerar el estado civil de los jóvenes, su estado general de salud y la situación de poder que viven con respecto a las relaciones sexuales. Con frecuencia, los adolescentes manifiestan que los siguientes elementos son importantes para satisfacer sus necesidades: confidencialidad, un lugar y horario de atención apropiados, un ambiente juvenil y acogedor, disponibilidad para acoger tanto a hombres como a mujeres, una instancia fuerte de consejería, proveedores especialmente entrenados y servicios clínicos integrados.²¹

Cómo entregar la información.

Para que un programa tenga éxito, es esencial que la información en salud reproductiva que se entregue sea adecuada y relevante. Tanto la educación y consejerías realizadas en la clínica como las realizadas en la escuela son importantes para este esfuerzo (ver cuadro, página 5). Es obvio que los padres son una fuente de información muy importante, aunque ellos sientan que no cuentan con toda la información o les incomode discutir estos temas con sus hijos, o simplemente desapruében que los jóvenes manifiesten interés por el tema de la sexuali-

“Restringir el acceso a la educación en salud sexual con el propósito de retrasar la primera relación sexual y creer que de ese modo se está fomentando el sexo seguro constituye una violación a los derechos del niño. Niños y niñas necesitan saber cómo hacerse cargo de sus propias vidas, cómo protegerse a sí mismos y a las demás personas del VIH”

Peter Pilot,
UNAIDS

Anticoncepción para Adolescentes Sexualmente Activos

Los adolescentes que solicitan asesoría en anticoncepción desean que ésta se lleve a cabo en forma confidencial, que sea precisa, que no se emitan juicios reprobatorios y que la puedan recibir en un ambiente acogedor y cómodo. Cualquier joven que busque asesoría en anticoncepción tiene el derecho a recibir información clara y precisa sobre los métodos anticonceptivos, incluyendo su uso correcto, los efectos secundarios y cómo acceder a un proveedor de salud en caso que algún aspecto le merezca dudas. Por lo general, los adolescentes gozan de buena salud y pueden optar entre una variedad de métodos anticonceptivos.

Los condones son claramente la primera opción para los adolescentes sexualmente activos, ya sea solteros y/o que mantienen una relación monógama. Si se usan de manera correcta y consistente, los condones proporcionan una buena protección contra las ETS y la infección por VIH, tienen pocos efectos secundarios y son de fácil acceso. Otra alternativa a considerar es la abstinencia, tanto para aquellos jóvenes que aún no han iniciado su vida sexual como para aquéllos que sí lo han hecho. A los adolescentes que opten por un método hormonal u otro método se les debe aconsejar que además usen el condón cada vez que tienen una relación sexual con alguien que pueda estar contagiado con alguna infección de transmisión sexual. Existen otras alternativas:

- Los métodos de barrera femeninos, incluyendo el condón femenino, el diafragma y los espermicidas son buenas opciones para algunas adolescentes y proporcionan algún grado de protección contra las ETS. La aceptabilidad y el uso correcto de estos métodos pueden presentar problemas.
- Las píldoras anticonceptivas de emergencia no protegen contra las ETS; sin embargo, es importante que los adolescentes tengan acceso a ellas, ya que las pueden tomar hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección. Hay mayor tendencia entre los adolescentes a no planificar sus relaciones sexuales o a que se les haga más difícil el uso del condón o de otros métodos.
- Los anticonceptivos orales no protegen contra las ETS, pero en muchos lugares son una alternativa popular entre los adolescentes. Sin embargo, su uso correcto y consistente puede ser difícil para algunas jóvenes, especialmente cuando experimentan efectos secundarios comunes como sensibilidad de las mamas y aumento de peso. La consejería es esencial para un uso eficaz.
- Los métodos tradicionales tales como el coito interrupto y la planificación familiar natural no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual; sin embargo, no se los debe descartar como alternativa sexual para los adolescentes. El coito interrupto, por ejemplo, puede ser el único método disponible en algunas circunstancias y los jóvenes debieran saber cómo practicarlo.

Los dispositivos intrauterinos (DIU) y la esterilización quirúrgica voluntaria por lo general no son alternativas apropiadas para los adolescentes.

Los métodos de progestina pura (píldoras, implantes e inyectables) son apropiados para adolescentes de 16 años o más, principalmente debido a preocupaciones teóricas de que podrían afectar el desarrollo óseo en adolescentes más jóvenes.

Para mayor información acerca de los métodos anticonceptivos y los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ver *Outlook*, Volumen 13, Número 4, 1995 y Volumen 14, Número 1, 1996 y *Mejorando el Acceso a la Calidad de Atención en Planificación Familiar: Criterios de Elegibilidad Médica para el Uso de Anticonceptivos* de la División de Salud Reproductiva y de la Familia de la OMS, 1996 (Improving Access to Quality Care in Family Planning: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use-Geneva: WHO, 1996).

dad. Conversar sobre el tema en un lenguaje juvenil, apropiado y acogedor a través de programas de radio a los que los jóvenes puedan llamar, en centros para actividades juveniles, a través de revistas y líneas telefónicas de consultas también constituyen estrategias eficaces para llegar a los adolescentes (ver cuadro, página 6).

Cómo desarrollar ciertas capacidades. Los adolescentes necesitan contar con ciertas capacidades prácticas que les permitan velar por su salud. El programa "Opta por tu Futuro" implementado en cinco países de África al Sur del Sahara, nos otorga un ejemplo de cómo abordar este desafío. En él se recurre a ejercicios, dramatizaciones, visitas a la comunidad, y a otros medios para ayudarlos al desarrollo de capacidades, incluyendo cómo protegerse de una ETS, a ponerse metas y a mejorar la comunicación con la familia y los amigos. El currículum también aborda las desigualdades de género que influyen en la salud y fomenta la responsabilidad compartida hombres/mujeres para superar este obstáculo.²² Otro ejemplo de esta iniciativa es el diseño de un currículum enfocado a desarrollar habilidades que permitan hacer planes para la vida, el que se implementó en algunas escuelas secundarias en Kenya. Además de proporcionar información acerca de ETS, embarazo y anticoncepción, de entre los mismos adolescentes se capacita a educadores para que enseñen sobre el SIDA en las escuelas.

"El que los jóvenes sean seres sexuados parece ser uno de los hechos más difíciles de aceptar en la mayoría de las sociedades".

Dr. Pramilla Senanayake,
IPPF.

Se debe tomar en cuenta el contexto de vida de los jóvenes. En todo el mundo, las perspectivas de los jóvenes se ven determinadas por sus circunstancias de vida. Las niñas con poca o ninguna educación pueden considerar que el matrimonio a temprana edad y la crianza de los hijos sea su única alternativa en la vida (ver cuadro, página 5). Es posible que los niños que viven en la pobreza no encuentren una razón para planificar el futuro y proteger su salud. Otros factores que influyen en la salud y la conducta de los adolescentes son:

- la pobreza, incluyendo la mala nutrición;
- los conflictos políticos, incluyendo la situación de los grupos desplazados;
- la presión de los pares y la influencia de los medios de comunicación;
- la desigualdad de género y la explotación sexual (ver página 3); y
- las expectativas culturales respecto a la crianza de los hijos

Un artículo publicado recientemente propone una estrategia de planificación basada en las diferentes experiencias sexuales de los jóvenes (ver cuadro, página 7).

Cómo asegurar que los programas se adecúen a las necesidades de los adolescentes. En primer lugar, los que planifican los programas deben identificar claramente a qué grupo de adolescentes desean llegar, para luego involucrarlos de *manera significativa* en el desarrollo del programa. Algunas organizaciones, como la Federa-

ción Internacional para una Paternidad Planificada (International Planned Parenthood Federation-IPPF) han instituido comités asesores integrados por jóvenes, cuyo propósito es el de contribuir a configurar las ideas del programa. El Proyecto Niños de la Calle que tuvo su origen en el Programa sobre Abuso de Drogas de la OMS, recomienda que las personas que trabajan con los niños de la calle siempre estén informándose de los cambios en las necesidades de sus clientes y que, para tal efecto, realicen tres a cuatro series de grupos de foco por año.⁵

Cómo lograr el apoyo de la comunidad. Los programas para adolescentes a menudo encuentran obstáculos para ganarse el apoyo de la comunidad, porque los adultos temen que el acceso a la educación y a los servicios pueda estimular la actividad sexual en los adolescentes. Luego de evaluar los programas, se ha encontrado que ello no es así (ver cuadro más adelante). Algunos programas han demostrado que explicar los objetivos a los padres, a los líderes religiosos y a los líderes comunitarios e invitarlos a participar en sesiones de discusión con adolescentes ayuda a mitigar la oposición. En Nyeri, la Asociación de Planificación Familiar de Kenya insta a los padres a acercarse a sus hijos para intercambiar información sobre temas de salud reproductiva, y estimula la existencia de un debate permanente respecto de estos temas.²⁴ En Uganda, el Programa para Mejorar la Vida Reproductiva de los Adolescentes (Program for Enhancing Adolescent Reproductive Life-PEARL) involucra en sus actividades a representantes del gobierno, ONGs, grupos comunitarios, gente joven y otros, en un intento por aumentar la consciencia sobre los temas de salud reproductiva, contribuir a la promoción, protección y defensa de los derechos reproductivos y entregar buenos servicios.¹



Este anuncio elaborado por la Asociación de Planificación Familiar de Tanzania el año 1995 pone énfasis en la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos en salud reproductiva.

Estrategias Programáticas

La experiencia sugiere que —para llegar a los jóvenes— a menudo es más efectivo combinar distintos enfoques. Sin em-

bargo, son pocos los programas en los que se ha evaluado rigurosamente el impacto, por lo que continua siendo un desafío determinar cuáles serían las estrategias más efectivas.

La Importancia de la Educación—Incluyendo la Educación Sexual

Colaborar para que los jóvenes no abandonen la escuela —especialmente las niñas— es un aspecto importante en cualquier esfuerzo para mejorar la salud reproductiva de los adolescentes. La educación contribuye a que los jóvenes desarrollen ciertas capacidades y adquieran información que les permita sobrevivir en el mercado laboral. Por otro lado, la educación les proporciona mayores opciones para cuidar de su salud y la de sus familias, y contribuye a que las niñas pospongan el matrimonio y la crianza de los hijos. En Colombia, por ejemplo, el 46 por ciento de las niñas con educación básica incompleta (siete años) dan a la luz antes de los 20 años, pero sólo el 19 por ciento de aquellas con siete o más años de escolaridad han sido madres a esa edad. En México, las mujeres sin educación básica tienen una probabilidad tres veces mayor de dar a luz a los 20 años, y en Egipto esta probabilidad es cinco veces mayor.²⁵

En muchos países, la educación sexual forma parte del curriculum escolar para estudiantes de los cursos más avanzados. Al investigar sobre el impacto de los programas de educación sexual para adolescentes en varios países desarrollados, se ha encontrado que los programas exitosos son los que:

- se enfocan en disminuir las conductas que favorecen la infección por ETS/VIH y los embarazos no deseados;
- proporcionan información básica y precisa sobre los riesgos de una relación sexual sin protección;
- enseñan a los jóvenes a postergar las relaciones sexuales y a usar los anticonceptivos;
- consideran las influencias sociales y de los medios de comunicación sobre la conducta sexual;
- desarrollan habilidades de comunicación;
- inculcan conductas que les ayuden a rehusarse a las relaciones sexuales no deseadas y fomentan una conducta sexual responsable; y
- ayudan a que los jóvenes comprendan las influencias provenientes tanto de la comunidad como de otras fuentes.

Una revisión de 35 estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo concluyó que la educación sexual en las escuelas *no es un factor que contribuya* a una actividad sexual prematura *ni a* un aumento de la actividad sexual entre los jóvenes. De hecho, en la mitad de los programas estudiados, la educación sexual se asoció con una postergación del inicio de la actividad sexual, a una disminución de la actividad sexual en general o un aumento del uso de anticonceptivos y de protección contra las ETS entre los jóvenes sexualmente activos.²⁶ Los programas que incentivan la postergación del inicio de la actividad sexual y que a su vez proporcionan información sobre sexo seguro y anticoncepción son más eficaces que aquéllos que sólo promueven la abstinencia sexual. Los programas son más eficaces cuando están dirigidos a adolescentes menores que todavía no llevan una vida sexual activa.^{27,28}

Conversación Directa: Un Foro para Responder a las Inquietudes sobre Salud Sexual de los Adolescentes

Desde 1993, La Fundación para una Conversación Directa de Uganda publica una revista cuyo objetivo es abordar las inquietudes de los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. *Conversación Directa* aparece mensualmente y se distribuye en las escuelas de todo el país. En ella se plantean temas que se han discutido en clubes de *Conversación Directa*. En 1998, la Fundación para una Conversación Directa lanzó la publicación *Conversación de Jóvenes*, dirigida a muchachos entre 10 y 12 años, a través de la cual se prepara a los niños acerca de temas a los que se enfrentarán en los años venideros, tales como los cambios de su cuerpo y la presión de sus pares. La revista estimula a que los niños pospongan el inicio de una vida sexual activa, eviten situaciones de riesgo y se defiendan de los adultos predadores, poniendo énfasis en los derechos que tienen, incluyendo el derecho a la atención de salud, a la educación y a la seguridad.

Los lectores de *Conversación Directa* comparten sus sentimientos y plantean importantes inquietudes. Un estudiante de Kampala escribió "Me asusta ver que hoy en día aún tenemos jóvenes que tienen relaciones sexuales sin protección". Otros cuestionan rumores tales como: "He escuchado que las píldoras producen cáncer o que los bebés nacen con malformaciones". Tanto médicos como consejeros responden a estas preguntas, poniendo énfasis en el respeto hacia la propia persona, en el respeto hacia los demás y en el auto cuidado con respecto a la salud. Un número de la revista analizó el tema de la violencia sexual, incluyendo la violación y el sexo coercitivo, y ofreció apoyo a las víctimas de violencia sexual. Ambas revistas promueven la abstinencia como la conducta más segura para los adolescentes y estimulan a que los jóvenes inviertan su tiempo en otras actividades, por ejemplo en el deporte, como una manera saludable de compartir con otros adolescentes. En el caso de los adolescentes con una vida sexual activa, los estimulan a que usen el condón y que se sometan a pruebas de detección de ETS/VIH.

Conversación Directa invita a los jóvenes a participar en discusiones sobre salud, y reconoce que a menudo es la presión la que influye en los jóvenes y los lleva a involucrarse en conductas de riesgo. Un programa que contempla visitas a escuelas permite que los estudiantes hagan directamente sus preguntas a los consejeros y al personal clínico. La revista *Conversación Directa* está disponible en dialectos locales y se distribuye también a jóvenes que no asisten a la escuela. Existe un programa de radio que se transmite en tres idiomas, en el que se abordan estos temas. Un sitio Web publica las versiones electrónicas de las revistas e invita a los planificadores de programas a consultar este material para desarrollar actividades similares en otros lugares.²⁹

En Uganda se promueven actividades como *Conversación Directa* y otros programas enfocados a la protección contra las ETS/VIH. Estudios recientes indican que, en comparación con lo que sucedía hace diez años, en ese país los jóvenes están adoptando prácticas sexuales más seguras, están postergando el inicio de una vida sexual activa, y que están disminuyendo los casos nuevos de infección por VIH, especialmente entre los adolescentes.³

Los servicios clínicos orientados a la juventud son muy comunes en Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina. Existen lugares donde se proporciona un amplio rango de servicios clínicos y de asistencia social, tales como la prevención del embarazo y las ETS, consejería y exámenes de detección. En 1990, por ejemplo, el hospital María Auxiliadora comenzó a ofrecer servicios a un millón de adolescentes que viven en los alrededores de Lima, Perú. El hospital creó 10 centros de atención para adolescentes, en los que se ofrecen diferentes servicios, incluyendo consejería enfocada a la prevención. Pareciera que cuando los servicios de ETS se encuentran vinculados a otros servicios de salud reproductiva, ello redundaría en un mayor beneficio para los adolescentes.³⁰

Consultorios en establecimientos educacionales. Algunos países desarrollados y en desarrollo cuentan con este tipo de centros. Los servicios que se ofrecen varían ampliamente, pero todos incluyen al menos un chequeo básico de salud y servicios de referencia. En los países desarrollados, algunos consultorios de establecimientos educacionales entregan condones y proporcionan consejería sobre embarazo y prevención de ETS, así como servicios de referencia para otros métodos anticonceptivos y de salud reproductiva. Ello, sin embargo, a menudo genera controversia y, en los países en desarrollo, estos servicios frecuentemente se ven limitados por políticas restrictivas, por escasez de personal, falta de lugares privados para entregar consejería y carencia de recursos.⁵

Los centros juveniles multi-servicios ofrecen servicios anticonceptivos como parte de un programa integral para jóvenes, que incluye educación, recreación y capacitación para la vida laboral. En Jamaica, se lleva a cabo con éxito el programa del Centro de Mujeres para Adolescentes Embarazadas. Desde 1978, este programa ha permitido que las jóvenes

adolescentes continúen con su educación durante el embarazo, regresen a la escuela después del nacimiento del bebé y se preparen de otro embarazo durante la adolescencia. Mientras permanecen en el programa, las jóvenes continúan con sus estudios, reciben información y servicios de planificación familiar, aprenden cómo cuidar a sus hijos y reciben otros servicios que les enseñan a proyectar sus vidas en el largo plazo.³¹ Una reciente evaluación del programa encontró que sólo el 1,4 por ciento de las jóvenes que participaron tuvieron otro embarazo antes de graduarse o de conseguir un empleo.¹

Programas de extensión a la comunidad. Estos son especialmente importantes para grupos tales como los jóvenes que no asisten a la escuela, los jóvenes de "la calle" y las muchachas que tienen poca libertad para salir del lugar donde viven. Estos proyectos comunitarios utilizan diversos recursos para llegar a los jóvenes en sus lugares de trabajo o en los sitios de recreación. En Méjico, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social de México (ISSM) y la Asociación Mexicana de Planificación Familiar (AMPF) se han unido en un esfuerzo para educar a miembros de las pandillas a cómo capacitar otros adolescentes que tampoco asisten a establecimientos educacionales. Luego que los de las pandillas han asistido a sesiones educativas, se los invita a integrar un grupo de teatro que, a través de funciones en lugares públicos y en escuelas, ofrece en sus actuaciones información dirigida a sus pares.³⁰

Grupos de jóvenes, como por ejemplo los de scouts o equipos deportivos, han demostrado ser muy útiles en la entrega de información sobre salud reproductiva como parte de programas enfocados a promover el bienestar general de los miembros participantes. En 1987, por ejemplo, se estableció en Kenya la Asociación de Jóvenes Deportistas de Mathare (AJDM) como un proyecto para involucrar a niños y niñas en


actividades de desarrollo comunitario a través de las actividades deportivas. Actualmente, cerca de 3.000 niñas entre 10-18 años participan en el programa de fútbol comunitario. AJDM ha ampliado sus actividades para incorporar entrenamiento sobre VIH y ha iniciado un proyecto de equidad de géneros. Investigaciones realizadas en Estados Unidos han encontrado que las niñas que participan en actividades deportivas organizadas son física y psíquicamente más saludables, presentan menores tasas de ausentismo escolar, tienen una mayor autoestima y muestran menores tasas de estrés y depresión, todos factores que les ayudan a tomar decisiones más saludables.³²

Los programas de salud en los lugares de trabajo constituyen recursos importantes para llegar a jóvenes de ambos sexos. Por ejemplo, un programa que se lleva a cabo en Tailandia proporciona información sobre salud reproductiva a jóvenes que duermen en sus lugares de trabajo. Se entrena a líderes elegidos por los propios pares, los que proporcionan información utilizando diversos medios de difusión populares, como libros de historietas, novelas románticas y grupos de discusión formados por los propios pares. Las discusiones permiten que los participantes aprendan y practiquen habilidades, como ser conductas que les permitan negociar y planificar con respecto a su salud sexual, por ejemplo a usar el condón.³³

Implicancias y Conclusiones

Los jóvenes enfrentan muchos riesgos para su salud reproductiva: embarazos no deseados a una edad temprana, abortos en condiciones de riesgo, infecciones por ETS/VIH y violencia sexual. Es necesario que los programas enfocados a mejorar la salud reproductiva de los adolescentes sepan cómo operan estos riesgos y tomen en cuenta los diversos factores que influyen en la vida de los adolescentes. Es importante estar enterados de circunstancias tales como si los adolescentes han iniciado su vida sexual, si están casados, si asisten a la escuela o trabajan. También se debe considerar el impacto de la pobreza, la desigualdad entre los géneros, las restricciones legales y las diferentes expectativas dentro de la cultura.

Los programas exitosos son los que proporcionan una consejería adecuada, servicios clínicos apropiados y se enfocan en ayudar a que los jóvenes desarrollen ciertas capacidades que les permitan hacer elecciones que redunden en su salud. Estos programas manifiestan respeto por las necesidades, las inquietudes y los sentimientos de los jóvenes, incorporándolos al diseño y la puesta en práctica de las actividades. Los programas exitosos trabajan también con los padres, los grupos comunitarios y los líderes religiosos, a fin de obtener su apoyo



Este anuncio producido por el Programa de Salud Reproductiva Ruso destaca un mensaje sencillo: "La juventud es maravillosa. No dependas del azar. Usa anticonceptivos". Producido por el Centro para Programas de Comunicación de la Universidad de Johns Hopkins, 1996.

y participación. Debido a que la necesidad de servicios de salud para adolescentes está creciendo vertiginosamente, es importante que los programas nuevos y ampliados se desarrollen en base a experiencias que hayan demostrado ser exitosas. Allí donde las circunstancias lo permitan, los programas deben ser monitoreados, evaluados y documentados de modo de asegurar que se hayan comprendido sus desafíos y que puedan replicarse sus éxitos.

Una Herramienta de Planificación que Contribuye a la Adecuación de las Necesidades y de los Programas

Estudios actuales muestran que no existe una buena coordinación entre los programas vigentes y las necesidades de salud de los jóvenes de países en desarrollo. Un artículo reciente sugiere que, además de tomar en cuenta las diferencias más notorias entre los jóvenes, tales como el género, la edad y el estado civil, los que planifican los programas empiezan por reconocer que los jóvenes presentan diferencias en cuanto a su experiencia sexual.²⁴ Para los efectos de una buena planificación, los jóvenes pueden ser agrupados en tres categorías: aquéllos que aún no han iniciado su vida sexual activa; aquéllos con una vida sexual activa y que no han experimentado ninguna consecuencia para su salud (como embarazo no deseado o ETS); y aquéllos que mantienen una vida sexual activa y han experimentado alguna consecuencia adversa para su salud.

Esta agrupación basada en la experiencia puede ser útil para que los que planifican hagan un uso eficiente de los recursos clínicos y comunitarios, incluyendo las organizaciones comunitarias, los lugares de recreación, los centros de salud y otros. Muchos adolescentes tienden a acudir a los consultorios como último recurso, pero se beneficiarán de los programas comunitarios que contribuyan a su capacitación general, que les entreguen información sobre salud, les proporcionen consejería y ofrezcan acceso a condones. Servicios clínicos cálidos dirigidos especialmente a adolescentes pueden destinarse a la atención de un número más pequeño de adolescentes que necesitan cuidados del embarazo, manejo de ETS y otros servicios de salud reproductiva.

1. UNFPA. *UNFPA and Adolescents*. New York: UNFPA (1997). Also available at <http://www.unfpa.org/PUBLICAT/TECH/ADOLESTM>.
2. Blanc, A. and Way, A. Sexual behavior, contraceptive knowledge and use. *Studies in Family Planning* 29(2):106-116 (June 1998).
3. UNAIDS. *Report on the Global HIV / AIDS Epidemic: December 1997*. <http://www.unaids.org/highband/document/epidemio/report97.html> (accessed November 1998).
4. Gage, A. Decision-making regarding sexual activity and contraceptive use. *Studies in Family Planning* 29(2):154-166 (June 1998).
5. WHO. *Programming for Adolescent Health and Development*. Report of the WHO/UNFPA/UNICEF Study Group on Programming for Adolescent Health. Geneva. WHO (in press).
6. International Council on Management of Population Programmes (ICOMP). Adolescents/youth reproductive health hazards. *Feedback* 23(3):5 (1997).
7. Henshaw, S.K. and Morrow, E. *Induced Abortion: A World Review 1990 Supplement*. Table 4. New York: The Alan Guttmacher Institute (1990).
8. Zabin, L. and Kiragu, K. Health consequences of adolescent sexuality and fertility behavior in sub-Saharan Africa. *Studies in Family Planning* 29(2):210-232 (June 1998).
9. The Alan Guttmacher Institute (AGI). *Into a New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives*. New York: AGI (May 1998).
10. UNFPA. *Programme of Action. International Conference on Population and Development (ICPD)*. New York: UNFPA (1994).
11. UNFPA. *Report on the Round Table on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights. Key Future Actions*. <http://www.unfpa.org/ICPD/report1.htm> (accessed August 1998).
12. Unuigbo, J.A. et al. Abortion-related mortality in Benin City, Nigeria: 1973-1985. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 26:435-439 (1998).
13. Islam, M.Q. STDs: the burden and the challenge. *AIDS Scaptions* 3(1):4-7 (May 1996).
14. International Center for Research on Women (ICRW). *Vulnerability and Opportunity: Adolescents and HIV/AIDS in the Developing World*. Washington, D.C.: ICRW (1996).
15. PATH. *Adolescent Girls and Their Rights. Adolescent Girl's Health and Nutrition—With Special Emphasis on Reproductive Health*. Background paper for UNFPA expert group meeting for adolescent girls and their rights. Washington, D.C.: PATH (October 1997).
16. Richters, J. et al. Why do condoms break or slip off in use? An exploratory study. *International Journal of STD and AIDS* 6(1): 8-11 (January/February 1995).
17. PATH. *The Facts: Female Genital Mutilation*. Washington, D.C.: PATH (1997). Information also available at <http://www.path.org/html/fgm.htm>.
18. Bagarukayo, H. et al. An operational study relating to sexuality and AIDS prevention among primary school students in Kabale District of Uganda. 1993. Entebbe: Uganda, as cited in Heise, L. et al. *Sexual Coercion and Reproductive Health: A Focus on Research*. New York: Population Council (1995).
19. WHO. *Substance Use Among Street Children and Other Children and Youth in Especially Difficult Circumstances*. Fact Sheet N151. Geneva: WHO (1998). Also available at <http://www.who.int/inf/fs/en/fact151.html>.
20. Casa Alianza. *Street Children and AIDS*. <http://www.casa-alianza.org> (accessed December 1998).
21. FOCUS on Young Adults. *Why Focus on Young Adults?* <http://www.pathfind.org/ourwork.htm> (accessed October 1998).
22. Centre for Development and Population Activities: *Adolescent and Gender Project for Sub-Saharan Africa*. <http://www.cedpa.org/trainprog/saharan/subsahaf.htm> (accessed August 1998).
23. Wilson, A. PATH/Washington, D.C. Personal communication (December 1998).
24. Hughes, J. and McCauley, A. Improving the fit: adolescent's needs and future programs. *Studies in Family Planning* 29(2):233-245 (June 1998).
25. The Alan Guttmacher Institute (AGI). *Issues in Brief: Risks and Realities of Early Childbearing Worldwide*. New York: AGI (February 1997).
26. Grunseit, A. and Kippax, S. *Effects of Sex Education on Young People's Sexual Behavior*. Geneva: Global Programme on AIDS, WHO (1993).
27. Population Action International (PAI). Youth at risk: meeting the sexual health needs of adolescents. *Population Policy Information Kit* Number 9 (April 1994).
28. Kirby, D. School based programs to reduce sexual risk behaviors: a review of effectiveness. *Public Health Reports* 109(3):339-360 (1994).
29. Straight Talk Foundation. *Straight Talk* Web site. <http://www.swiftuganda.com/~strtalk/str8talk.html> (accessed December 1998).
30. Pathfinder International. *Insights From Adolescent Project Experience: 1992-1997*. Galen, MA: Pathfinder (1998).
31. Barnett, B. et al. *Case Study of the Women's Center of Jamaica Foundation Program for Adolescent Mothers*. Research Triangle Park, Family Health International (June 1996). Also available at <http://www.fhi.org/en/wsp/wspubs/wspubs.html>.
32. Brady, M. Laying the foundation for girls' healthy futures: can sports play a role? *Studies in Family Planning* 29(1):79-82 (March 1998).
33. Cash, K. and Anasuchatku, B. Experimental educational interventions for AIDS prevention among Northern Thai single female migratory adolescents. *Women and AIDS Program Research Report Series*. Washington, D.C.: International Center for Research on Women (1995).

NOTA DEL EDITOR: En el número de Junio de 1998 de la revista *Studies in Family Planning* Ud. podrá encontrar información importante en la que se basó este artículo. El número completo está dedicado a temas relacionados con los adolescentes, y en él se exploran los factores sociales, económicos, biológicos y demográficos que afectan la salud de los adolescentes en los países en desarrollo. El documento de la OMS, *Programación para la Salud y Desarrollo de los Adolescentes (Programming for Adolescent Health and Development)* y el informe del Alan Guttmacher Institute *Hacia Un Mundo Nuevo: Vida Sexual y Reproductiva de la Mujeres Jóvenes (Into a New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives)* también proporcionan importante información que respalda este artículo. Existe una colección de folletos sobre temas de salud reproductiva en adolescentes llamada *In Focus*, la que está disponible en forma impresa; además aparece publicada en tres idiomas en el sitio Web de FOCUS sobre Adultos Jóvenes (<http://www.pathfind.org/focus/publicat.htm>).

La redactora de este número fue Maggie Kilbourne-Brook y la asistente de edición Paulette McKay. Doug Swan fue el asistente de producción. Además de miembros seleccionados de la Junta Asesora de Outlook, las siguientes personas revisaron este número: Dr. J. Hughes, Dr. E. Murphy y Dr. A. Wilson. Outlook agradece sus comentarios y sugerencias.

Outlook es publicado por PATH en Inglés y Francés y está disponible en Español, Chino, Portugués y Ruso. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en Español de Outlook, con el patrocinio de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y de la USAID. Las personas de ICIMER a cargo de la producción de Outlook en Español son Ana María Concha y Emilia Lepe. Outlook presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en Outlook no son necesariamente aquéllas de sus patrocinadores, de individuos miembros de la Junta Asesora de Outlook, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y niños de los países en desarrollo. Outlook se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editor: Jacqueline Sherris, Ph.D.

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.

Teléfono: 206-285-3500

Fax: 206-285-6619

E-mail: outlook@path.org URL: www.path.org

© PATH (PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH) (PROGRAMA PARA UNA TECNOLOGIA APROPIADA EN SALUD). 1998. DERECHOS RESERVADOS.

JUNTA ASESORA

*Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de Salud de Italia *Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU. *Willard Cates, Jr. M.D., M.P.H., Presidente Family Health International, EE.UU. *Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU. *Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile *Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU. *John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido *Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia *Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU. *Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU. *Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido *Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU. *Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU. *Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU. *Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.