

OUTLOOK

Número Especial:
Maternidad
Segura

Hacia Una Maternidad Segura: Éxitos y Desafíos

Cada minuto, una mujer muere por causas vinculadas al embarazo o al parto. En general, se trata de mujeres jóvenes, que ya tienen otros hijos/as y que viven en países en desarrollo. Por cada mujer que muere, cerca de 100 sobreviven al parto, pero quedan afectadas por alguna enfermedad, discapacidad o daño físico como consecuencia de las complicaciones del embarazo.¹ En general, se estima que 585.000 mujeres mueren anualmente por estas causas, y el 99 por ciento de estas muertes ocurre en el mundo en desarrollo.² Las mujeres de África Occidental y Oriental enfrentan los riesgos más altos de mortalidad materna, al igual que las de algunas regiones del Asia.

La mayoría (60 a 80 por ciento) de las muertes maternas se producen por hemorragia obstétrica, parto obstruido, septicemia, trastornos hipertensivos del embarazo y complicaciones derivadas de un aborto en condiciones peligrosas³ (ver Figura 1). Las complicaciones del embarazo que ocasionan la muerte materna no se pueden anticipar, y la mayoría ocurre dentro de las horas siguientes o de pocos días después del parto.⁴

La muerte de una madre influye tremendamente en la salud y calidad de vida de los hijos/as que la sobreviven. A su muerte, éstos desarrollan un riesgo diez veces mayor de morir dentro de dos años en comparación con aquéllos que conservan a ambos padres vivos.⁵ Por otro lado, a menudo estos hijos no siguen recibiendo el cuidado de salud y la educación que necesitan para su desarrollo. La muerte de una madre tiene un impacto que va más allá de su familia directa, ya que al morir no sólo se pierde el aporte que ella hace al ingreso de la familia, sino que también la contribución que hace a la unidad familiar, a la educación de la generación siguiente, al cuidado de los más ancianos y a la estabilidad de la comunidad entera.

En 1987, las agencias internacionales y los gobiernos pusieron en marcha el Programa para una Maternidad Segura (The Safe Motherhood Initiative), cuyo objetivo sería el de concientizar al mundo entero acerca del impacto de la mortalidad y morbilidad maternas, y buscar soluciones para estos graves problemas. Se formó un grupo inter-agencias, el que lo conforman la OMS, UNICEF, UNFPA, el Banco Mundial, el Population Council (Consejo de Población) y la IPPF. La meta del proyecto es lograr que para el año 2000 la mortalidad y morbilidad maternas hayan disminuido a la mitad. La experiencia mundial ha demostrado que es posible evitar las muertes asociadas al embarazo, y ha surgido un número importante de investigaciones sobre estrategias para reducir la mortalidad por causas obstétricas. Al mismo tiempo, ha sido difícil demostrar una disminución significativa de la mortalidad materna.^{2,6,7} Los datos disponibles sugieren que ésta sigue siendo alta en muchas partes del mundo (ver Tabla 1).

El compromiso con el Programa para una Maternidad Segura se vio fortalecido con ocasión de que se eligiera éste como el tema para el Día Mundial de la Salud de la OMS en 1998 (y en la Reunión de Expertos sobre Maternidad sin Riesgos realizada en Octubre de 1997 en Sri Lanka). Representantes de los gobiernos, de las agencias internacionales y de ONGs se reunieron en Washington, D.C. con motivo del Simposium Internacional sobre Maternidad Segura realizado el 7 de Abril de 1988 para Día Mundial de la Salud. El mensaje fue claro: la maternidad puede y debe ser un proceso libre de riesgos.

Este artículo analiza los componentes que se han incorporado a los programas de maternidad sin riesgos, analiza las lecciones aprendidas de la experiencia en terreno y esboza cuáles deberían ser las acciones prioritarias de los programas. También se destacan aquí las conclusiones y declaraciones surgidas del Simposium Internacional sobre Maternidad Segura de 1998.

Componentes Básicos de un Programa de Maternidad sin Riesgos

Los esfuerzos para alcanzar una maternidad libre de riesgos varían entre los diferentes países, dependiendo de los recursos disponibles y del entorno social y cultural en que viven las mujeres. A través de los años, estos esfuerzos han incluido la entrega de servicios de planificación familiar, el fomento de la atención de salud materna, el mejoramiento de la atención obstétrica esencial (ver cuadro página 4), y la atención a la condición socioeconómica de las mujeres.^{2,8} Todos estos esfuerzos requieren de sólidos lazos entre los distintos niveles de atención de salud, especialmente entre el que se proporciona a nivel de la comunidad y aquellos que constituyen el primer nivel de referencia (generalmente hospitales de comuna o distrito).

“La mortalidad y morbilidad de las madres y futuras madres constituyen actualmente una tragedia que se puede evitar y que afecta a todos: la familia, la comunidad, la sociedad y, sobre todo, a los hijos/as”
—Carol Bellamy, Directora Ejecutiva, UNICEF, Día Mundial de la Salud, 1998.

La atención a nivel comunitario pone de relieve la prevención, incluyendo la planificación familiar y las prácticas higiénicas en la atención del parto. En este nivel, es de suma importancia desarrollar estrategias para concientizar a la población sobre las causas de la mortalidad materna y sobre la importancia de acceder a servicios oportunos y adecuados. La planificación familiar y una buena atención durante el embarazo, el parto y el puerperio son claves. También es crucial detectar tempranamente las complicaciones y derivar estos casos a los centros de atención adecuados, ya que hay muchas complicaciones obstétricas que no pueden ser tratadas a nivel comunitario. Un miembro de la familia, las parteras tradicionales (PT) y los agentes de salud de la comunidad son personas claves que pueden detectar estas complicaciones en forma precoz y derivarlas a tiempo.


En los establecimientos que constituyen el primer nivel de referencia, el énfasis se encuentra en el tratamiento y manejo de las complicaciones. Estos establecimientos deberían ser capaces de proporcionar los servicios obstétricos esenciales, incluyendo el tratamiento de las complicaciones del aborto y, allí donde sea legal hacerlos, servicios de aborto. También es muy importante que exista una efectiva comunicación entre los proveedores de salud a nivel comunitario y de referencia. Una vez que se detecta una complicación en el ámbito de la comunidad, la demora en derivar y transportar a la mujer al lugar donde debe recibir la atención apropiada puede costarle la vida tanto a la madre como al bebé.

Disminución de la Mortalidad Materna: Lecciones Aprendidas

Las causas obstétricas directas de mortalidad materna son conocidas y pueden ser tratadas, aunque no ha resultado fácil prevenirlas. Las causas indirectas de mortalidad y morbilidad maternas incluyen patologías maternas previas, como la malaria y la insuficiencia cardíaca. También hay un complejo conjunto de otros factores que inciden en el grupo de causas indirectas, como son los factores sociales, culturales, económicos y políticos, para los que no existe una solución única. Ninguna intervención aislada podrá resolver la tragedia de la mortalidad materna. Al evaluar las estrategias empleadas durante la pasada década, las siguientes intervenciones entregaron buenos resultados:

Prevenir los embarazos no deseados. Ayudar a las mujeres a prevenir los embarazos no deseados contribuye a reducir el número de embarazos, a que se produzcan menos muertes por causas obstétricas y a que haya menos abortos. La planificación familiar fue una de las intervenciones de salud materno-infantil introducidas en Matlab, Bangladesh a comienzos de 1976. Los datos registrados en esa área entre fines de los años 70 y fines de los 80 sugieren que los servicios de planificación familiar probablemente contribuyeron a disminuir las muertes maternas en un 2 por ciento anual, particularmente las que se producían por

Figura 1. Causas de Mortalidad Materna



* Otras causas directas incluyen el embarazo ectópico, la embolia y las complicaciones derivadas de procedimientos anestésicos.

** Las causas indirectas incluyen la anemia, la malaria, y enfermedades cardíacas.

Fuente: Family Care International, 1998.²

Tabla 1. Riesgo de Muerte por Embarazo en el Transcurso de Vida Reproductiva de las Mujeres, 1990

Región	Riesgo de Muerte
Africa	1 de 16
Asia	1 de 65
América Latina y el Caribe	1 de 130
Europa	1 de 1.400
América del Norte	1 de 3.700
Todos los países en desarrollo	1 de 48
Todos los países desarrollados	1 de 1.800

Fuente: adaptado de Family Care International, 1998.²

causas obstétricas directas y abortos. Durante ese mismo período, el uso de anticonceptivos aumentó de menos de un 8 por ciento a un 48 por ciento.⁹

Mejorar los servicios de planificación familiar a través de un asesoramiento orientado a la usuaria, de la oferta de una amplia variedad de métodos anticonceptivos (incluyendo anticoncepción de emergencia), y de servicios disponibles para todas aquellas personas que los necesiten (incluyendo los adolescentes) son factores importantes dentro de cualquier esfuerzo para reducir la mortalidad materna. Además, en las comunidades de escasos recursos es probable que sea más fácil implementar servicios de planificación familiar que iniciar otras intervenciones para disminuir la tasa de mortalidad materna (muertes maternas por 100.000 mujeres en edad reproductiva).¹⁰ Por otro lado, la planificación familiar no tendrá impacto sobre la tasa de mortalidad materna (muertes maternas por 100.000 nacidos vivos). Para que ello ocurra se requiere implementar intervenciones obstétricas específicas.

Disminuir las consecuencias del aborto en condiciones peligrosas. Aunque el aborto en condiciones peligrosas es una de las causas de muerte materna que se puede evitar y tratar sin dificultad, aún representa al menos un 13 por ciento de las muertes en el mundo entero: una de cada ocho muertes maternas se produce por esta causa.^{5,11} La tasa más alta de muertes por aborto en malas condiciones se registra en América Latina y el Caribe: más del 20 por ciento.⁵ La existencia de servicios de planificación familiar adecuados se asocia a una disminución de los abortos y las muertes por aborto. En Ciudad de México, por ejemplo, al aumentar el uso de anticonceptivos en un 24 por ciento entre 1987 y 1992 contribuyó a que la tasa de aborto disminuyera en un 39 por ciento. En Kazakstan, un aumento del 32 por ciento en el uso de la píldora y del DIU a comienzos de los 90, coincidió con que la tasa de aborto disminuyera en un 15 por ciento.^{12,13}

Las muertes por aborto se pueden evitar si las compli-

caciones se detectan a tiempo y se tratan en forma adecuada. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 se ratificó que la atención pos aborto (APA) era una estrategia eficaz para reducir la mortalidad materna, y que ella implicaba la integración de tres elementos: tratamiento de emergencia para el aborto incompleto y sus complicaciones, servicios de asesoramiento y de planificación familiar pos aborto, y nexos con otros servicios de salud reproductiva. La experiencia de Gana demostró que entrenar a las parteras (también llamadas matronas) en APA era una estrategia factible y adecuada para descentralizar los servicios pos aborto y contribuyó a incrementar el uso de servicios de planificación familiar pos aborto y otros servicios de salud reproductiva.¹⁴

Atención prenatal: impacto limitado sobre la mortalidad materna. La atención prenatal es importante para detectar en forma temprana las complicaciones del embarazo y para educar a las mujeres acerca de la etapa que están viviendo. Los elementos de esta atención varían mucho entre los distintos países e incluyen servicios diversos, como la educación de la mujer, el tratamiento de patologías existentes, el tratamiento de las complicaciones, y la detección de los factores de riesgo.^{8,15} Algunos aspectos importantes de la atención prenatal incluyen:

- Detectar y tratar la anemia, la malaria y las ETS.
- Identificar y manejar las complicaciones, tales como un parto mal presentado, la hipertensión, el edema y preclampsia.
- Instruir acerca de las complicaciones que podrían presentarse y del momento y modo de acceder a los servicios médicos necesarios.

Los escasos datos que existen sobre el impacto de la atención prenatal en la mortalidad materna son contradictorios. En la República Democrática del Congo (anteriormente Zaire) se descubrió que la atención prenatal había contribuido a disminuir la mortalidad materna debido a que se producían menos casos de anemia aguda y de partos complicados.¹⁵ Los hallazgos de Gambia y Tanzania demostraron, sin embargo, que las consultas de atención prenatal no tenían impacto sobre la mortalidad materna.^{16,17} En general, si se la atención prenatal se aborda como estrategia aislada, ella no contribuye a disminuir la mortalidad materna en forma significativa.

Los esfuerzos enfocados a identificar los grupos que corren alto riesgo de sufrir complicaciones obstétricas también han arrojado resultados contradictorios. El reconocimiento de estos grupos en razón de la edad, paridad, estatura e historia obstétrica no ha demostrado ser una estrategia efectiva. Por ejemplo, en el Proyecto Kasongo de la República Democrática del Congo, el 90 por ciento de las mujeres que fueron referidas debido a que tenían antecedentes de historias obstétricas difíciles (partos complicados) no volvieron a presentar

“De todas las muertes maternas, aquéllas que se producen por abortos realizados en condiciones peligrosas son probablemente las más evitables. Eliminando sólo estas muertes, algunos países hubieran alcanzado el objetivo propuesto hace 10 años en cuanto a disminuir la mortalidad materna en un 50%”.

—Ingar Brueggemann, Secretaria General, IPPF, Día Mundial de la Salud, 1998

complicaciones del parto.^{8,18} Derivar innecesariamente a las mujeres que no presentan complicaciones impone una sobrecarga al sistema de salud, daña la credibilidad de los proveedores y entraña un peligro para las mujeres de “bajo riesgo”, ya que los recursos y la educación se canaliza hacia las mujeres de “alto riesgo” que a menudo tienen partos normales. Ya que todo embarazo supone un riesgo, todas las mujeres encintas deben tener acceso a intervenciones encaminadas a salvarles la vida.

El manejo adecuado de las complicaciones obstétricas es clave. La mayoría de las complicaciones obstétricas que conducen a la muerte no se pueden prevenir ni anticipar, pero sí pueden tratarse con una atención oportuna y adecuada. Frente a una complicación que hace peligrar la vida, la supervivencia de la madre dependerá de la rápida llegada a un centro de atención obstétrica. Los componentes claves de la atención obstétrica esencial aparecen detallados en el cuadro de esta página.

La mayoría de los servicios obstétricos esenciales pueden ser proporcionados en el ámbito de la comunidad por las parteras o médicos generales. Las transfusiones de sangre y los procedimientos quirúrgicos deben realizarse en los establecimientos de referencia por obstetras o médicos entrenados para hacerlo. Frente a una complicación que no puede ser tratada a nivel comunitario, el personal de salud debe proporcionar los primeros auxilios obstétricos y derivar a la paciente en forma inmediata. Es muy útil la existencia de protocolos estándares de tratamiento para asegurar que en general todo el personal y los centros hospitalarios apliquen los mismos procedimientos y traten las complicaciones en forma adecuada. Por otro lado, el uso de estándares sirve como base para supervisar la calidad de la atención obstétrica. Todo centro debe contar siempre con transporte de emergencia.

Ofrecer servicios amplios de salud materna que incluyan la atención obstétrica esencial ayuda a disminuir la mortalidad materna. Por ejemplo, en una zona de Bangladesh, Matlab, se amplió el papel de las enfermeras parteras, capacitándolas para atender partos, manejar las complicaciones y su derivación, y tramitar el traslado en transporte de emergencia. La ampliación de los servicios maternos calificados dentro de la comunidad y la creación de vínculos eficaces con los centros de referencia, ayudó en este proyecto a que las mujeres que presentaron complicaciones obstétricas recibieran una pronta intervención para salvarles la vida. Las muertes por causas obstétricas disminuyeron de 440 a 140 por 100.000 nacidos vivos durante los tres años que duró el estudio.¹⁹ A su vez ocurrió que las tasas de muerte obstétrica también disminuyeron en las áreas cercanas donde no se ofrecieron estos servicios integrales. Se cree que en parte ello se debió al mayor acceso a atención obstétrica esencial en los hospitales.²⁰

Capacitación de las Parteras: la clave para una maternidad libre de riesgos. La disponibilidad de parteras capacitadas para entregar una atención de partos en condiciones seguras e higiénicas, y entrenadas para reconocer y manejar las complicaciones obstétricas (ya sea sin ayuda o recurriendo a la derivación) disminuye la mortalidad materna. Sin embargo, aproximadamente sólo un 55 por ciento de las mujeres de los países en desarrollo cuentan con atención de una partera competente. La presencia

de parteras calificadas, principalmente en el hogar de la mujer que daría a luz, contribuyó significativamente a disminuir la mortalidad materna en Suecia a fines de 1800 y a principios de 1900, antes de que existiera en ese país la atención obstétrica esencial. Entre 1871 y 1895, la mortalidad materna disminuyó a la tercera parte: de 630 a 230 muertes por 100.000 nacidos vivos.²¹ Los resultados del estudio de Matlab revelaron que la presencia de parteras en las aldeas había contribuido a un aumento del uso de los servicios clínicos por parte de las mujeres y del manejo de las complicaciones obstétricas.¹⁹

Las parteras desempeñan una labor importantísima en la atención continua de la mujer embarazada, ya que son el nexo entre los diferentes niveles de atención (ver Figura 2).

Pueden ser ellas tanto las personas a las que a nivel comunitario la PT les derive el caso, como las que registren la admisión de la mujer en el establecimiento de referencia.^{22,23}

Sigue siendo cierto que para que la atención de las parteras sea eficaz en disminuir la mortalidad materna es importante contar con una infraestructura que facilite la atención y la referencia de las mujeres que requieren de una atención de emergencia especializada.

PT entrenadas: involucrando a la comunidad en una maternidad libre de riesgos. En el mundo en desarrollo, las mujeres a menudo dan a luz en su casa y sin la asistencia de una persona capacitada para hacerlo.²⁴ En la última década, se han implementado programas para entrenar a las PT en estrategias y técnicas para disminuir la morbilidad y mortalidad maternas en todo el mundo. El nivel de entrenamiento, el papel que desempeñan y los servicios que prestan las PT varían ampliamente en las diferentes partes del mundo, como también los contenidos de los programas de capacitación.

En muchos países en desarrollo, una PT constituye un vínculo importante entre la comunidad y el sistema de salud formal.²⁵ Si bien, en general, una PT no está capacitada para manejar las complicaciones, sí puede contribuir a hacer de la maternidad un proceso libre de riesgos. Entrenar a las PT en prácticas higiénicas y seguras, en una atención adecuada del parto, en cómo reconocer tempranamente las complicaciones y en las estrategias de referencia puede salvar muchas vidas en aquellos lugares donde se

Atención Obstétrica Esencial

La prestación de la atención obstétrica esencial puede disminuir la cifra de muertes por causas obstétricas. Específicamente, esta atención implica poder acceder las 24 horas a:

- Cesáreas.
- Medicamentos necesarios (incluyendo anestesia, antibióticos y tratamientos por suero).
- Transfusiones de sangre.
- Extracción manual de la placenta.
- Aspiración por succión de un aborto incompleto.

Idealmente, los servicios obstétricos esenciales deberían incluir servicios de anticoncepción quirúrgica, y en aquellos lugares donde sea legal, servicios para interrumpir un embarazo.^{2,8}

Alianzas para Progresar hacia una Maternidad Segura

“... para reducir la mortalidad materna se requiere de un compromiso sostenido a largo plazo de todas las personas involucradas... En un esfuerzo de la comunidad por la comunidad, los gobiernos, los grupos de voluntariado y las autoridades locales se encuentran aunando fuerzas y recursos para desarrollar estrategias de salud que permitan la existencia de una maternidad libre de riesgos.”

- Hillary Rodham Clinton, Primera Dama, EE.UU.,
Día Mundial de la Salud, 1998.

Los esfuerzos del Programa para una Maternidad Segura se fortalecen cuando se crean alianzas para involucrar a las mujeres y sus familias, al personal de salud, a la comunidad, a los donantes, a los investigadores y a los encargados de tomar las decisiones programáticas. Estas alianzas implican compartir los conocimientos y los recursos, y comprometerse en pos de un objetivo común; requieren también de un respeto mutuo y de una actitud abierta a acoger todos los puntos de vista.

Alianzas con las mujeres. Las mujeres de zonas montañosas aisladas en Bolivia, con mínimo acceso a atención de salud, presentaron una tasa de mortalidad materna de 1.400 muertes por 100.000 nacidos vivos. Utilizando un método participativo para la solución de problemas, el proyecto de Salud Materna Warmi involucra a las mujeres en el proceso de identificar y jerarquizar los problemas de salud maternos, y luego en diseñar e implementar soluciones junto con las autoridades locales. Entre las soluciones propuestas se incorporaron el entrenamiento de PT, la educación y capacitación tanto de mujeres como de hombres en atención de partos en el hogar y en planificación familiar, la creación de nexos con un centro de referencia, la disminución del cobro por servicios obstétricos esenciales y la publicación de material informativo simple sobre salud reproductiva.

En 1993, al finalizar el proyecto de tres años, se observaron adelantos significativos en varios aspectos de la salud: tanto la prevalencia anticonceptiva como el uso de suministros en la atención de partos aumentó de un 0 a un 27 por ciento; la atención prenatal aumentó de 45 a 77 por ciento y la atención de PT aumentó de un 13 a un 57 por ciento. Si bien no se ha evaluado cuál sería el impacto que estas intervenciones tendrían si simultáneamente existiera un acceso expedito a la atención obstétrica esencial, sí han demostrado que contribuyen a disminuir las muertes maternas.²³

Alianzas con las comunidades y las PT. Es muy importante educar y motivar a las familias, a la comunidad y a las PT para lograr una maternidad sin riesgos. No tiene sentido entrenar sólo a los proveedores. Las Alianzas Comunitarias para una Maternidad Segura -ACMS, programadas para ser introducidas en India el año 1998, están enfocadas en las mujeres, sus familias y las PT en un esfuerzo por asegurar el acceso a primeros auxilios obstétricos. Las ACMS recurren a la capacitación para aumentar el acceso a primeros auxilios obstétricos seguros y eficaces, y para abordar las causas más frecuentes de muerte materna y las etapas más críticas en que éstas ocurren— durante el trabajo de parto/alumbramiento,

primera etapa pos parto y pos aborto.²⁶ Los aspectos más relevantes de las intervenciones de entrenamiento incluyen:

- Reforzar los sistemas de transporte de referencia/emergencia
- Reconocer las emergencias obstétricas.
- Entrenar a las PT en primeros auxilios obstétricos.
- Entrenar a las PT en mejorar su habilidad para enfrentar problemas, enfrentándolas a ejemplos o permitiéndoles que se ejerciten en la práctica clínica.

Alianzas con las Parteras. La Alianza con las Asociaciones de Parteras para la Sustentabilidad (AAMC), una iniciativa específica del proyecto SEATS II financiado por la AID e implementado por el Colegio Americano de Enfermeras - Parteras, opera principalmente a través de las asociaciones de parteras para respaldar la entrega de servicios de salud reproductiva. Las AAMC permite que las parteras tengan acceso a los programas de entrenamiento en salud reproductiva a través de su colegio profesional. El entrenamiento incluye atención obstétrica de emergencia (para capacitarlas en técnicas para salvar la vida), prevención de infecciones y entrega de servicios de planificación familiar.

La AAMC también provee una oportunidad única para desarrollar la capacidad institucional de las asociaciones locales de parteras. Este enfoque maximiza las políticas sostenidas y el apoyo técnico necesario para mantener una atención de salud materna de alta calidad. La AAMC se ha implementado en Uganda, Zimbabwe, Senegal y Zambia.

Alianzas con los Responsables de las Políticas. A fin de asegurar el éxito de La Iniciativa para una Maternidad Segura, es crucial que se establezcan alianzas entre las agencias de desarrollo, los donantes y los gobiernos nacionales. Tal como se declarara en 1993 en el Grupo Francófono de Recursos Africanos para una Maternidad Segura “ Es muy común que la ayuda de los donantes impulse el desarrollo de programas de un país, [pero] no refleja las prioridades de ese país. @²⁷

El proyecto realizado en la región de Tanjungsari en Indonesia es un ejemplo de una alianza establecida entre una agencia donante, un servicio de salud gubernamental, y los líderes comunitarios y habitantes de Tanjungsari. Un compromiso nacional con la salud materna de parte del Comité de Planificación y del Ministerio de Salud de Indonesia significó que un proyecto para modernizar los servicios de maternidad tuviera una buena acogida por parte del gobierno de ese país. Este se comprometió a entrenar a 55.000 enfermeras-parteras durante un período superior a ocho años y poner a disposición de cada aldea una de estas profesionales. Se crearon hogares comunitarios de maternidad, que cuentan con PT, enfermeras-parteras y voluntarios que prestan servicios prenatales y pos parto. Además, se implementaron actividades informativas, educativas y de comunicación para apoyar el proyecto, y se estableció una comunicación radiofónica con los centros de referencia para abordar las emergencias obstétricas.

Al estimular la colaboración entre los diferentes niveles del gobierno, incluyendo a los líderes comunitarios, el proyecto facilitó el proceso de toma de decisiones y la puesta en práctica de los programas. Una evaluación preliminar determinó que las consultas prenatales aumentaron de 4 a un 14 por ciento en el transcurso de 15 meses, y la atención del embarazo proporcionada por equipos de PT - parteras aumentó de un 58 a un 70 por ciento durante los primeros 9 meses.²³

disponga del cuidado obstétrico esencial. Es especialmente importante asegurar que las PT conozcan cuáles son los establecimientos de referencia (y que los proveedores de los centros de referencia comprendan la labor que las PT desempeñan).

Los servicios culturalmente apropiados que se puedan proporcionar en el hogar ayuda a que las PT puedan atender los partos en condiciones seguras. Por ejemplo, PATH ha trabajado con grupos en Bangladesh y Nepal para desarrollar un juego de materiales desechable y de bajo costo para la atención de partos, que las mujeres embarazadas pueden comprar localmente. Este juego incluye instrucciones gráficas y los siguientes materiales nuevos y limpios: una sabanilla de plástico, una hoja de rasurar, amarras para el cordón y una barra de jabón. Gracias a una extensa investigación cualitativa y a la realización de pruebas previas, actualmente estos juegos se están produciendo y comercializando a nivel local, lo que ha contribuido a la atención de partos más higiénicos y seguros.

Implicaciones para los Programas y las Políticas

Para que la maternidad sin riesgos pueda existir no sólo en la retórica sino también en la realidad, se requiere de un firme compromiso de parte de los encargados de las políticas, de los administradores de los programas y de la comunidad. Es la comunidad mundial la que otorga la importancia que reviste este compromiso, al reconocer que la maternidad sin riesgos constituye un derecho humano fundamental y, por lo tanto, la define como una vital inversión económica y social.

Una revisión de diversos estudios sobre maternidad sin riesgos y de declaraciones sobre políticas sugiere que es importante tomar las siguientes acciones:

- Reformar las leyes para ampliar el acceso de las mujeres a los servicios de salud necesarios, como por

ejemplo ampliar el papel de las parteras para que puedan proporcionar servicios obstétricos esenciales.

- Asignar los recursos en forma apropiada de modo de respaldar la maternidad sin riesgos, incluyendo el transporte para tener acceso a una atención obstétrica esencial.

En Uganda, por ejemplo, el gobierno introdujo un cambio en las políticas, de modo de respaldar una amplia gama de servicios de parte de las parteras. Se entrenó a todas las parteras diplomadas en técnicas para salvar la vida, en asesoramiento y comunicación interpersonal.²³

Las implicancias específicas del programa para una Maternidad sin Riesgos incluyen lo siguiente:

- Asegurarse de que haya una persona entrenada presente en cada parto.
- Ampliar el acceso a la atención por parte de parteras.
- Incrementar el acceso a la atención obstétrica esencial, incluyendo a servicios de emergencia.
- Proporcionar una atención integral en salud reproductiva, incluyendo servicios de planificación familiar y pos aborto.
- Asegurar una atención continua basada en la existencia de servicios de referencia eficaces y en la existencia

de suministros, equipos, medicamentos y transporte adecuados.

En Sri Lanka, por ejemplo, un fuerte compromiso de parte del gobierno, el mejoramiento de los servicios de salud y un buen programa de planificación familiar contribuyeron a hacer de la maternidad un proceso libre de riesgos. El nivel actual de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas es de un 62 por ciento (comparado con un 32 por ciento en 1975); 94 por ciento de los partos se producen en recintos de salud y más del 90 por ciento de las personas tiene acceso a atención primaria de salud. La cifra anual de muertes por embarazo y parto ha disminuido en forma significativa: de 520 en 1990 a 250 en 1997.²⁸

“La Maternidad sin Riesgo es un elemento fundamental de los derechos humanos: de los derechos del niño, de la familia y de las mujeres”
—James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, en el Día Nacional de la Salud, 1998.


Capacitación para las Parteras en Técnicas para Salvar Vidas® (TSV)

El programa de capacitación para parteras en TSV, desarrollado e implementado por el Colegio de Enfermeras Partaras de los E.E.U.U., es un programa que se basa en la competencia de las parteras para capacitarlas en cuanto a cómo proceder frente a cinco complicaciones que ponen en riesgo la vida y de las mujeres y que son causa de muerte materna: hemorragia obstétrica, parto obstruido, septicemia, trastornos hipertensivos del embarazo y complicaciones por un aborto en condiciones peligrosas.

A través de las TSV, las parteras y otros proveedores de atención de salud materna, reciben entrenamiento tanto teórico como práctico en áreas tales como el uso del partógrafo (un equipo para monitorear el progreso de un parto), la extracción manual de la placenta, la prevención y manejo de hemorragias, y cuidados pos aborto, incluyendo la aspiración manual por vacío.²⁹

Las TSV no constituyen sólo otro manual de entrenamiento. Lo que lo hace único es que contempla un proceso de varias etapas y de trabajo colaborativo, incluyendo la evaluación de los recursos y necesidades existentes. El entrenamiento se basa en los conocimientos y habilidades que requieren las parteras, los médicos generales y otros proveedores de salud materna. La demanda por este entrenamiento ha excedido ampliamente lo esperado; el manual de las TSV ha sido traducido al francés, el vietnamita y al bahasa, el idioma oficial de Indonesia. La experiencia en Gana, Uganda, Indonesia, Nigeria y Vietnam sugiere que este programa de entrenamiento es sustentable: el personal y aquellos que lo patrocinan han desarrollado estrategias para que una vez que los fondos se hayan acabado, poder continuar durante un largo período. Hasta 1997, se había estimado que más de 2.000 parteras, 100 monitores, 30 jefes de capacitación y 15 médicos obstetras habían sido entrenados en cinco países.

Figura 2. Estructura del Sistema de Salud y Patrones de Referencia



Fuente: MotherCare, 1997.²²

El compromiso a nivel de los gobiernos, la adecuada asignación de recursos y la entrega de una atención modelo en salud materna no garantizan una maternidad sin riesgos.

Los cambios de conducta a nivel de la comunidad son esenciales para el éxito. Las estrategias comunitarias que ayudarán a fomentar los objetivos de una maternidad sin riesgos incluyen:

- Involucrar a los miembros de la comunidad, particularmente a las mujeres y a los proveedores locales, en las iniciativas para mejorar la salud materna.
- Trabajar con las comunidades, las mujeres, las familias, y los curanderos tradicionales para propiciar un cambio en las actitudes que retardan el acceso a la atención médica.
- Entregar educación comunitaria para aumentar la consciencia sobre las complicaciones obstétricas y sobre cuándo y dónde solicitar ayuda.

Por ejemplo, la actual alianza comunitaria Warmi en Bolivia (ver página 5) ha involucrado a los miembros de la comunidad y a los encargados de elaborar las políticas en la planificación e implementación de alternativas adecuadas y eficaces destinadas a reducir la mortalidad materna.

Se requiere de un conjunto de intervenciones para lograr una disminución de la mortalidad materna, para que nazcan bebés más saludables y para mejorar la condición de las mujeres y de la comunidad en general: concientizar a la población acerca de la magnitud e impacto de las muertes maternas, cambiar las políticas restrictivas de salud, asegurar el acceso a la atención básica de salud (incluyendo la planificación familiar y el tratamiento de abortos en condiciones de riesgo), entrenar a las parteras, y ofrecer atención obstétrica de emergencia.

Este artículo se preparó en colaboración con Frances Ganges y Phyllis Long del Colegio de Enfermeras-Parteras de los Estados Unidos de Norteamérica (American College of Nurse-Midwives-ACNM).

1. Koblinsky M.A. et al. Mother and more: a broader perspective on women's health. In: Koblinsky M.A. et al., eds. *The Health of Women: A Global Perspective*. Boulder, CO: Westview Press, Inc. pp. 33-62 (1993).
2. Family Care International and Safe Motherhood Inter-Agency Group. Safe Motherhood Fact Sheets; 11 fact sheets prepared from the Safe Motherhood Technical Consultation in Sri Lanka, 18-23 October 1997. Family Care International (1998).[†]
3. WHO. *Revised 1990 Estimates of Maternal Mortality: A New Approach by WHO and UNICEF*. Geneva: World Health Organization (1997).
4. Li, X.F. et al. The postpartum period: the key to maternal mortality. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 54:1-10 (1996).
5. Tinker A. Safe motherhood as an economic and social investment. Presentation at Safe Motherhood Technical Consultation in Sri Lanka, 18-23 October 1997 (1997).
6. Graham, W.J. et al. Demonstrating programme impact on maternal mortality. *Health Policy and Planning* 11(1):16-20 (1996).
7. Campbell O. et al. Lessons learnt: a decade of measuring the impact of safe motherhood programmes. DFID Research Work, Programme on Population and Reproductive Health (August 1997).
8. Maine, D. *Safe Motherhood Programs: Options and Issues*. New York: Center for Population and Family Health, Columbia University School of Public Health (1991).
9. Fauveau, V. et al. The effect of maternal and child health and family planning services on mortality: is prevention enough? *British Medical Journal* 301:103-107 (July 14, 1990).
10. Fortney, J.A. The importance of family planning in reducing maternal mortality: *Studies in Family Planning* 18(2):109-114 (March-April 1987).
11. WHO. *Abortion: A Tabulation of Available Data on The Frequency and Mortality of Unsafe Abortion*. 2nd Edition. Geneva: WHO (1994).
12. Singh, S. and Sedgh, G. The relationship of abortion to trends in contraception and fertility in Brazil, Colombia and Mexico. *International Family Planning Perspectives* 23(1):4-14 (March 1997).
13. Salter, C. et al. Care for postabortion complications: saving women's lives. *Population Report Series L*, No.10(September 1997).
14. Billings, D.L. Training midwives to improve postabortion care. *A Summary Report of a Study Tour in Ghana, October 12-19, 1997*. IPAS (February 1998).
15. McDonagh, M. Is antenatal care effective in reducing maternal morbidity and mortality? *Health Policy and Planning* 11(1):1-15 (1996).
16. Greenwood, A. et al. A prospective survey of the outcome of pregnancy in a rural area of Gambia. *Bulletin of the World Health Organization* 65(5):635-643 (1987).
17. Moller, B. et al. A study of antenatal care at village level in rural Tanzania. *International Journal of Gynecologists and Obstetricians* 30:123-131 (1989).
18. Kasongo Project Team. Antenatal screening for fetopelvic dystocias. A cost-effectiveness approach to the choice of simple indicators for use by auxiliary personnel. *Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 87(4):173-183 (August 1984).
19. Maine, D. et al. Why did maternal mortality decline in Matlab? *Studies in Family Planning* 27(4):179-187 (1996).
20. Ronsmans, C. et al. Decline in maternal mortality in Matlab, Bangladesh: a cautionary tale. *The Lancet* 350:1810-1814 (December 1997).
21. Van Lerberghe, W. et al. Maternal mortality: an historical perspective. Presentation at Safe Motherhood Technical Consultation in Sri Lanka, 18-23 October 1997 (1997).
22. MotherCare, John Snow, Inc. Learning and action in the first decade—the MotherCare experience. *MotherCare Matters* 6(4):1-3 (October 1997).
23. Kwast, B.E. Building a community-based maternity program. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 48 (Suppl.):S67-S82 (1995).
24. WHO. A tabulation of available information. Division of Family Health: Coverage of Maternity Care. Geneva: WHO (1993).
25. Minden, M. and Levitt, M.J. The right to know: women and their traditional birth attendants. In: Murray, S.F. (ed.). *Midwives and Safer Motherhood*. London: Mosby, pp.103-113 (1996).
26. Sibley, L. and Armbruster, D. Obstetric first aid in the community—partners in safe motherhood. A strategy for reducing maternal mortality. *Journal of Nurse-Midwifery* 42(2):117-121 (March 1997).
27. Daly, P. et al. Safe motherhood in Francophone Africa: some improvement but not enough. Report of the Meeting of the Francophone African Resource Group for Safe Motherhood, Bujumbura, Burundi, April 14-17, 1993. The World Bank (1993).
28. Senanayake, P. Safe motherhood: a success story in Sri Lanka. *World Health 51st Year* No.1:28-29 (January-February 1998).
29. Buffington, S. and Marshall, M.A. *Life Saving Skills Manual for Midwives*. 3rd Edition. American College of Nurse-Midwives (1998).

[†] Estos excelentes artículos publicados por Safe Motherhood están disponibles en varios idiomas y los puede encontrar en el sitio Web de Internet www.safemotherhood.org.

Encuesta a los Lectores de *Outlook*

Quisiéramos hacer llegar nuestros agradecimientos a todas aquellas personas que respondieron la encuesta de *Outlook* realizada en 1997. En total, más de 550 lectores respondieron nuestras preguntas, siendo la mayoría de ellos administradores de programas y proveedores de salud. A continuación presentamos algunos de los puntos más relevantes que surgieron de esta encuesta:

- Más de un 95 por ciento de los lectores considera que *Outlook* es una publicación que entrega información útil y precisa.
- Ya que la mayoría de los 25.000 lectores que reciben *Outlook* comparten su ejemplar con otras personas, ello significa que actualmente el total de lectores de *Outlook* llegue a más de 100.000.
- Los lectores recurren a *Outlook* como una fuente para actualizar sus conocimientos acerca de la salud, como una pauta para la práctica en salud reproductiva y como material de apoyo para actividades de educación y entrenamiento.
- Los lectores de *Outlook* consideran que la mayoría de los tópicos de salud abordados les fueron útiles.
- Los lectores desearían que se ampliara el acceso a *Outlook* y que la información estuviera disponible a través del correo electrónico y de la red World Wide Web.

Hacemos llegar nuestras felicitaciones a Junia Walcott del Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago y a la Dra. Susana Asport Terán de Bolivia, quienes ganaron los premios otorgados a aquellas personas que respondieron la encuesta.

La encuesta de lectores nos proporcionó importante información. En respuesta a lo expresado por lo lectores, pudimos planificar qué artículos serían publicados durante este año y rediseñamos parcialmente el formato (ver cuadro esta página). Queremos alentarlos para que nos envíen sus sugerencias con respecto a qué temas les gustaría que

abordáramos en el futuro, y nos hicieran llegar sus preguntas y comentarios. Para comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de correo electrónico a outlook@path.org o visitar nuestra página web en <http://www.path.org/>.

Nueva Presentación de *Outlook*

Los lectores de *Outlook* notarán que este número viene con una nueva presentación. Rediseñamos el formato, a fin de incorporar más ilustraciones sin reducir la cantidad de texto. Creemos que este nuevo diseño no altera las características que distinguen a *Outlook* y sí ofrece un formato innovador y atractivo. Esperamos que éste sea de su agrado; sus comentarios serán bienvenidos ya sea por correo regular o electrónico (outlook@path.org).

La versión en inglés de este número de *Outlook* fue producido gracias a un subcontrato del proyecto UNC-CH PRIME financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (United States Agency for International Development) Contrato N1 CCP-3027-00-5005-00. Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no reflejan necesariamente las políticas u opiniones de la AID o de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Cualquier extracto de este documento puede ser reproducido o adaptado de acuerdo a las necesidades locales sin permiso previo, siempre que aparezca un reconocimiento a los autores, se agradezca el apoyo de PRIME y se distribuya en forma gratuita o a bajo costo. Cualquier uso comercial debe ser previamente autorizado.

El editor de este número fue Tuong Nguyen. Además de miembros seleccionados de la Junta Asesora de *Outlook*, las siguientes personas revisaron este número: C. Abou-Zahr, Dr. M. Koblinsky, la Sa. D. Maine, Dr. J. McDermott, la Sa. A. Starrs y Dr. A. Tinker. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.

Outlook es publicado por PATH en Inglés y Francés y está disponible en Español, Chino, Portugués y Ruso. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en Español de *Outlook*, con el patrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), División para Latinoamérica y el Caribe. Las personas de ICMER a cargo de la producción de *Outlook* en Español son Ana María Concha y Emilia Lepe. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquellas de sus patrocinadores, de individuos miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo. *Outlook* se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor envíe sus cheques a nombre de PATH.

Editor: Jacqueline Sherris, Ph.D.

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.

Teléfono: 206-285-3500

Fax: 206-285-6619

E-mail:outlook@path.org URL:www.path.org

JUNTA ASESORA

•Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de Salud de Italia •Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU. •Willard Cates, Jr. M.D., M.P.H., Presidente Family Health International, EE.UU. •Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU. •Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile •Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU. •John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido •Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia •Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU. •Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU. •Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido •Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU. •Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU. •Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU. •Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.