

OUTLOOK

Serie Especial sobre el VIH/SIDA

Esta es la primera parte de una serie de dos partes sobre prevención y tratamiento del VIH/SIDA en comunidades de escasos recursos.

Prevención del VIH/SIDA en Comunidades de Escasos Recursos

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el virus que causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), afecta a personas de todas las edades y nacionalidades—en especial a aquéllas entre 20 y 40 años de edad. Para las familias, el SIDA es una enfermedad devastadora: primero destruye los hogares estables tornándolos en familias monoparentales, y luego deja a niños huérfanos al cuidado de sus hermanos, abuelos o instituciones. La enfermedad ataca a los grupos más vulnerables y carentes de poder: a las mujeres con escasas posibilidades de protegerse a sí mismas, a los jóvenes que no comprenden el riesgo al que se exponen, y a los lactantes que contraen la infección durante el embarazo, el parto o la lactancia. Además de sufrir los efectos debilitantes de la enfermedad, muchas de las personas infectadas sufren el rechazo de parte de su familia, de sus amigos y de su comunidad.

Una serie de factores ambientales, culturales y sociales favorecen la propagación de la epidemia. En las comunidades más desprotegidas, los programas exitosos deben abordar problemas tales como la pobreza, las inequidades de género, las migraciones y la violencia, todo lo cual favorecer la expansión de la epidemia.


Hacia fines del año 2000, el número de personas infectadas por VIH en todo el mundo superaba los 36 millones, y el 95% de ellas vivían en países en desarrollo (ver Figura 1)¹ Se estima que en el año 1981—cuando se reconoció por primera vez el VIH/SIDA—había 227.000 adultos infectados; en 1990, este número había aumentado a 10 millones.² El SIDA ha matado a casi 22 millones de personas. Sólo durante el año 2000 se produjeron 3 millones de muertes a causa de este virus. Aproximadamente 1,4 millones de niños están contagiados con el virus, y casi 13 millones han perdido a sus padres a causa de este mal.¹ Se estima que alrededor del año 2015, en algunos países de África al Sur del Sahara, donde la cifra de adultos infectados es del 20% o más, el VIH/SIDA habrá producido un descenso de la esperanza de vida, lo que implicará un retroceso respecto de los avances recientes.^{1,3}

Si bien África al Sur del Sahara actualmente constituye la región más afectada por la pandemia, las tasas de infección están aumentando en muchas regiones del mundo, incluyendo algunas zonas de Asia (por ejemplo, India, China y Camboya). La prevalencia en América Central y el Caribe también es alta, y en la Federación Rusa se registraron más casos de infecciones nuevas por VIH durante el año 2000 que en todos los años anteriores.¹

La pandemia del VIH/SIDA tiene un impacto cada vez mayor entre las mujeres, que se infectan principalmente a través de relaciones heterosexuales. Durante el año 2000, las mujeres llegaron a conformar el 47% de la población adulta infectada, cifra que es muy superior al 25% que alcanzara en 1992.¹

Esta edición de *Outlook* es la primera de una serie de dos partes sobre la prevención y el tratamiento de VIH/SIDA en los países en desarrollo. En este número abordamos aspectos

Figura 1. Adultos y niños que viven con VIH/SIDA y tasa de prevalencia en adultos, 2000



específicos relacionados con la prevención del VIH/SIDA, incluidas estrategias nuevas para fortalecer la capacidad de las mujeres de protegerse a sí mismas y a sus hijos. No trataremos aquí la transmisión a través de la práctica de compartir agujas y jeringas entre usuarios de drogas intravenosas, que juega un papel fundamental en la transmisión del VIH en algunas partes del mundo (tanto para quienes han usado instrumentos infectados como para sus parejas sexuales).

Superando el Estigma y la Discriminación

El VIH se propaga en una atmósfera de silencio y secreto. El estigma asociado al VIH y el temor que engendra suelen ser un obstáculo para los programas de prevención. Si las personas no se sienten cómodas conversando con los proveedores de salud acerca del posible riesgo de infectarse, por temor a ser discriminadas o a que se viole la confidencialidad, es posible que se muestren reticentes a someterse a pruebas de detección o tratarse los síntomas. Es posible que quienes sospechan estar infectados decidan ocultar la enfermedad a su familia y amigos, por temor a ser rechazados.

Los líderes comunitarios y los profesionales de la salud pueden contribuir a disminuir el estigma asociado al SIDA, evitando las políticas y medidas discriminatorias, los mensajes atemorizantes y cualquier otra insinuación respecto de que el VIH/SIDA es una enfermedad que conlleva vergüenza. Las comunidades también deben fomentar la aceptación, compasión y comprensión hacia las personas infectadas. Los programas que incorporan en sus actividades a personas con VIH/SIDA, que desarrollan campañas en los medios de comunicación y que realizan tareas educativas en escuelas, en departamentos de policía y en los sitios de trabajo contribuyen a promover el conocimiento y el debate en torno al VIH/SIDA y de este modo ayudan de manera importante a debilitar el estigma. La movilización por parte de la comunidad y la participación de los grupos más afectados por el estigma (tales como los consumidores de drogas

inyectables, los trabajadores sexuales y las personas con VIH/SIDA) también pueden cumplir un papel importante.⁴

La Comunicación Para Lograr un Cambio de Conducta

Las actividades de comunicación orientadas a modificar las conductas han sido un componente fundamental de los esfuerzos por abordar una diversidad de problemas asociados a la salud, tales como la supervivencia infantil, la salud reproductiva y la planificación familiar, y el VIH/SIDA. En teoría, las actividades de comunicación orientadas a modificar las conductas caen dentro de un continuo que equilibra el número de clientes a los que se llega, con el impacto logrado por el programa. Los programas que combinan actividades de comunicación y de intervención, tanto a nivel de los individuos como de la comunidad, logran un impacto más positivo y sostenido sobre las actitudes, las normas sociales y los cambios de conducta.

Las actividades de comunicación interpersonal —tales como la educación entre pares, la consejería y las discusiones en pequeños grupos— si bien llegan a menos personas —tienden a tener un mayor impacto sobre el cambio de conductas. Intervenciones tales como representaciones de teatro callejero o los esfuerzos para movilizar a la comunidad llegan a públicos más amplios con mensajes que pueden ser adaptados para satisfacer las normas y necesidades de cada comunidad. Al evaluar un programa de teatro callejero en varias comunidades urbanas del estado de Tamil Nadu en India se encontró que la audiencia había logrado un conocimiento más amplio sobre el VIH y había desarrollado una actitud más tolerante hacia las personas infectadas con VIH/SIDA.⁵

Las intervenciones a nivel macro implican el uso de material impreso y de los medios de comunicación (programas de conversación en radio y televisión, dramas y música popular). Por ejemplo, miles de personas que viven en África, Asia, América Latina y el Caribe han oído o visto al personaje “Emma” promoviendo el uso del condón y una actitud

compasiva hacia las personas con VIH/SIDA. Con financiamiento de USAID, AIDSTECH desarrolló el proyecto “Emma Dice” para educar a las mujeres de África Occidental. Se trata de una historieta, cuyo personaje central es Emma, que llega a una gran cantidad de personas con información y mensajes referentes a la salud a través de revistas, obras de teatro, películas, videos y una fotonovela.⁶

Los programas de información, educación y comunicación (IEC) sobre VIH/SIDA son más efectivos cuando logran involucrar diversos segmentos de la comunidad y trabajar conjuntamente con líderes políticos, religiosos y comunitarios influyentes para abordar aspectos sensibles y promover un cambio de las normas comunitarias. En Jamaica, por ejemplo, la interacción con figuras destacadas de los medios de comunicación y de la música contribuyó a derribar las barreras culturales que dificultaban la discusión de temas de sexualidad en la radio.⁶ De manera similar, la labor con funcionarios de un *barangay* (aldea) en Filipinas contribuyó a modificar las actitudes y normas locales que dificultaban a las comunidades enfrentar los aspectos de salud asociados al sexo comercial y casual.⁷ Dado que un cambio en el comportamiento es un proceso gradual, los programas deben mantener un esfuerzo sostenido e involucrar a su público objetivo en el diseño de mensajes efectivos.

Consejería y Pruebas de Detección Voluntarias (CPV)

Si bien existe consenso en que las personas tienen derecho a conocer su condición respecto del VIH, las pruebas de detección pueden ser emocionalmente devastadoras para quienes deben enfrentar un resultado positivo sin haber recibido una adecuada consejería. Los programas que combinan la consejería y las pruebas de detección voluntarias han sido muy eficaces en contribuir a que las personas se protejan a sí mismas y a sus parejas, y en ayudar a que las personas puedan adaptarse al hecho de que están infectadas.⁸

En una de los estudios más completos sobre CPV, se asignaron al azar alrededor de 3.120 individuos y 586 parejas en Kenya, Tanzania y Trinidad para que participaran en uno de dos grupos: el de CPV o en un grupo de educación en salud básica con la opción de CPV durante el control de seguimiento al cabo de un año. En el grupo de CPV, las relaciones sexuales sin protección tanto con parejas estables como casuales disminuyeron en un 35% durante el año siguiente a las primeras pruebas de detección y actividades de consejería, en tanto que en el grupo que recibió información de salud básica la disminución fue del 13%. Los participantes del grupo de control que aceptaron recibir consejería y someterse a pruebas de detección en la primera visita de seguimiento reportaron al cabo de un año una baja en las tasas de relaciones sexuales sin protección a un nivel comparable al del primer grupo de CPV.⁹

El costo de la CPV hace que esta intervención sea una alternativa viable en la salud pública. Basándose en el estudio realizado en Kenya, Tanzania y Trinidad, se estimó que el costo hipotético de la CPV sería comparable al costo de los servicios de ITS y de vacunaciones infantiles. No obstante, los críticos de la CPV señalan que los programas de CPV son más costosos y que consumen más tiempo que los programas de educación en salud.

Los programas que consideran incorporar la CPV deben abordar cuidadosamente las actitudes de la comunidad a

que pertenecen sus clientes. Estos programas debería también contar con los recursos necesarios para ofrecer servicios médicos, psicológicos, y de apoyo social adecuados a las personas infectadas con VIH. El hecho de someterse a pruebas de detección del VIH y posteriormente conocer el resultado puede acarrear trastornos emocionales, estigmatización, discriminación, abandono y violencia, en especial a las mujeres. En muchos países africanos, las mujeres se han negado a someterse a pruebas de detección o no han regresado a retirar los resultados.¹⁰ En lugares donde no sea posible ofrecer servicios de CPV, sólo la consejería sobre los factores de riesgo y estrategias de prevención constituye un importante primer paso. (Para mayor información sobre consejería, vea *Outlook*, Volumen 13, Número 1.)

Los Programas de Salud Reproductiva Pueden Ser Muy Útiles

A medida que se reconoce más ampliamente la magnitud y las consecuencias del VIH/SIDA y de otras ITS, en especial entre las mujeres, se vuelve esencial integrar las estrategias de prevención en los centros de atención de salud reproductiva y atención primaria (incluidos los servicios de planificación familiar y de atención prenatal orientados a mujeres).

Planificación familiar: consejería y anticoncepción. Integrar los servicios de prevención de VIH/SIDA a los de planificación familiar es una opción que resulta muy atractiva, dado que los/las clientes de planificación familiar—por lo general mujeres—suelen necesitar servicios para prevenir el VIH/SIDA, y quienes solicitan métodos para prevenir el contagio o la transmisión del VIH también suelen necesitar servicios de planificación familiar.

En todo esfuerzo orientado a la prevención, las metas duales deben orientarse a impedir que las personas se

Pruebas del VIH: De Lentas a Rápidas

Las pruebas estándares de VIH requieren que el/ la cliente regrese a retirar los resultados varios días, semanas o incluso varios meses después de habersele tomado la muestra. El proceso comienza con la realización de un ensayo inmunoenzimático sobre fase sólida (enzyme-linked immunosorbent assay-ELISA) en una muestra de sangre. Si el resultado es positivo, se realiza una segunda prueba de ELISA. Si esta segunda prueba no entrega resultados concluyentes, se lleva a cabo un Western blot o un ensayo de inmunofluorescencia.

Pedirles a los clientes que regresen a la clínica a recoger los resultados de sus exámenes presenta varias desventajas. Para muchos clientes, el tiempo de desplazamiento, la distancia y los costos de movilización, así como la ambivalencia de conocer su estado respecto del VIH, puede influir en que no regresen. En el caso de quienes efectivamente regresan, a veces sus resultados se han perdido o retrasado.

Se dispone ahora de pruebas rápidas de VIH que ofrecen resultados confiables en menos de dos horas y que cuestan aproximadamente lo mismo que los exámenes de laboratorio. No se necesita un equipo especial, y se puede entrenar al personal clínico para que las realice. No obstante, han surgido inquietudes sobre el uso de estas pruebas rápidas, ya que podría aumentar la necesidad de una consejería adecuada, ya que en teoría los clientes habrán tenido menos tiempo para prepararse para un posible resultado VIH-positivo.¹¹

infecten con VIH y a evitar que quienes están infectados transmitan el virus a otras personas. Los programas de planificación familiar pueden ofrecer consejería sobre métodos anticonceptivos que previenen la transmisión del VIH y brindar información sobre aspectos pertinentes tales como la transmisión de VIH madre-hijo, así como tratar otras infecciones del tracto reproductivo. Algunos programas también pueden ofrecer pruebas de detección del VIH y consejería adecuada, lo que contribuiría a disminuir las conductas de alto riesgo. En aquellos lugares donde no se pueda brindar estos servicios, se deben implementar mecanismos de derivación adecuados.

Aparte de la abstinencia o las relaciones monógamas entre individuos no infectados, los condones masculinos y femeninos usados de manera correcta y consistente ofrecen una efectiva protección contra el embarazo y el VIH/ITS. Los diafragmas y capuchones cervicales son métodos de barrera que brindan una protección menor contra las infecciones bacterianas y algunas virales, tales como la gonorrea y la clamidia. Sin embargo, su efectividad contra el VIH es incierta.

El espermicida llamado nonoxynol-9 ofrece protección parcial contra algunas ITS bacterianas, pero sus efectos sobre el VIH son mucho menos prometedores de lo que se había anticipado. Un estudio clínico en el que participaron 1.000 trabajadores sexuales de cuatro países africanos reveló que el nonoxynol-9 no era efectivo para prevenir la infección del VIH. De hecho, entre más frecuente era el uso de nonoxynol-9 en las mujeres, mayor era el riesgo de contraer la infección.¹²

Los anticonceptivos orales, otros anticonceptivos hormonales y los dispositivos intrauterinos (DIU) no brindan ninguna protección contra el VIH u otras ITS. Se debe alentar a las mujeres que usan esos métodos a que recurran simultáneamente a los condones para protegerse contra el VIH y el ITS. Algunos estudios han indicado que es posible que



La consejería individual cara a cara acerca del riesgo de contraer el VIH puede ser clave en todo esfuerzo de comunicación. Un video realizado en Zambia llamado "Los desafíos de la Consejería sobre el VIH" muestra una sesión en la que participan un consejero en VIH y una mujer que vive en situación de riesgo. Foto: cortesía de la Universidad Johns Hopkins/CCP

exista un mayor riesgo de infección por VIH en mujeres que usan anticonceptivos orales, al igual que un mayor riesgo de transmisión a su pareja, pero aún no existe información concluyente al respecto. (ver *Outlook*, Volumen 17, Número 1).

Condomes masculinos. Los condones masculinos son altamente efectivos en la prevención del VIH si se usan de manera correcta y consistente. Con el fin de detener la expansión del VIH/SIDA se ha estimado que el uso del condón debería aumentar desde los 6.000-9.000 millones de condones que actualmente se usan por año a 24.000 millones.¹³ Aunque los programas han encontrado barreras para el uso del condón, métodos innovadores han ayudado a superar algunos de estos desafíos.

Por ejemplo, en las regiones donde el suministro de condones es insuficiente, la distribución es poco confiable, o el costo es muy elevado, los programas de mercadeo social han aumentado el acceso y la disponibilidad de los condones (ver tabla, página 6). El mercadeo social de los condones al público general (no sólo a grupos marginados como trabajadores sexuales) también puede ayudar a mejorar tanto la percepción de los condones por parte del público como el aprendizaje de un uso correcto.⁶

Para algunas mujeres, el uso del condón puede ser imposible, dado que requiere la cooperación de su pareja. Muchas mujeres corren el riesgo de ser víctimas de abuso emocional y/o físico si sugieren a sus parejas usar un condón, puesto que ello implicaría acusarlos de infidelidad.¹⁴ Tal como se describe más abajo, el condón femenino ha ayudado a algunas mujeres a superar este problema.

La promoción del condón en grupos de alto riesgo —trabajadores sexuales, camioneros, miembros de las fuerzas armadas, consumidores de drogas que intercambian jeringuillas, y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres— ha sido por mucho tiempo un importante componente de los programas de control de VIH/ITS. Los programas orientados a trabajadores sexuales han recibido tanto críticas como elogios por movilizar a los grupos más vulnerables y menos poderosos para que se protejan. En Tailandia, los condones han sido ampliamente adoptados por los trabajadores sexuales y sus clientes, luego de que a principios de los años 90 el gobierno implementara la política de exigir el uso 100 por ciento de condón en los burdeles. Esta política alivió en algo a los trabajadores sexuales de la responsabilidad de negociar el uso del condón, y fue complementada con subsidios para condones y una educación en salud intensiva entre los trabajadores sexuales de los burdeles. Las tasas reportadas sobre el uso de condones en burdeles aumentaron a casi un 90%, y las tasas reportadas para ITS entre los clientes disminuyó en más del 75%.¹⁵

Condomes femeninos. El condón femenino es una funda de poliuretano suave y transparente que la mujer puede insertar en su vagina antes de tener relaciones sexuales. La aceptabilidad y distribución del método ha aumentado en algunos países en desarrollo.^{16,17} Las mujeres de países tan diversos como Costa Rica, Indonesia, México y Senegal señalan que el condón femenino les permite tomar la delantera en lo que respecta a su protección y en demostrar a sus parejas la importancia del sexo seguro.¹³

Aún así, el condón femenino no goza de la misma aceptación que otros métodos anticonceptivos. En un estudio

comparativo realizado en Uganda, las mujeres evaluaron el condón femenino como menos aceptable que la esponja y las tabletas espumantes, pero más aceptable que los espermicidas en forma de espuma, gel, y crema.¹⁸ A las mujeres de Zambia no les gustó el condón femenino, pues lo encontraron demasiado grande, intimidante, costoso y ruidoso.¹⁹ Los investigadores están incorporando las opiniones e inquietudes de las mujeres en un esfuerzo por mejorar el diseño del condón femenino. Algunos estudios han revelado que la práctica sobre el uso del condón femenino puede ayudar a superar la renuencia inicial.¹⁶

Los informes sobre la capacidad de las mujeres de controlar el uso del condón femenino han sido diversos. En Zambia, a las mujeres les costó persuadir a sus esposos para que aceptaran su uso. En estudio realizados en Namibia y Sudáfrica, sin embargo, algunas mujeres señalaron que los hombres aceptaron el condón porque eran ellas las que lo manejaban. Los hombres en Namibia confirmaron esto, afirmando que aceptarían y usarían el condón femenino.¹⁷

Incluso a un valor subsidiado de US\$0,60 la unidad, los condones femeninos resultan demasiado costosos para muchas mujeres en los países en desarrollo.²⁰ Las organizaciones donantes, incluida UNAIDS, trabajan para aumentar el acceso al condón femenino y reducir su costo. Si bien el alto costo incentiva la reutilización de los condones femeninos, aún no se ha determinado la seguridad y viabilidad de esta práctica.²¹ Todavía se está investigando acerca de la posibilidad de limpiar y reutilizar los condones femeninos.

Reduciendo las ITS. La presencia de condiciones ulcerosas o inflamatorias causadas por las ITS aumenta la susceptibilidad de infectarse con el VIH y la probabilidad de transmitirlo. El tratamiento adecuado de las infecciones curables tiene el potencial de reducir la incidencia del VIH. Por ejemplo, un estudio a gran escala realizado en Mwanza, Tanzania sobre el impacto del tratamiento de la ITS en la transmisión del VIH, reveló que usar un protocolo de manejo sintomático para tratar las infecciones sintomáticas del tracto reproductivo contribuyó a reducir la incidencia del VIH en aproximadamente un 40% en una comunidad donde la epidemia del VIH se encontraba en sus primeras etapas (prevalencia de VIH de alrededor del 4%).²² Es importante notar que las ITS suelen ser asintomáticas en las mujeres, lo que complica los esfuerzos por controlar estas enfermedades.

Un segundo estudio realizado en Rakai, Uganda —una comunidad con una epidemia del VIH ya madura (prevalencia de VIH de 16%)— reveló que el tratamiento masivo periódico de las ITS con antibióticos no mostró impacto alguno sobre la reducción de la incidencia del VIH. Además de un aumento de la prevalencia basal del VIH, la alta prevalencia de herpes genital —cofactor conocido en la transmisión del VIH— puede ayudar a explicar los resultados aparentemente contradictorios de los dos estudios.²³

Llegando a los Más Inaccesibles

Algunas de las poblaciones más afectadas por la infección del VIH/SIDA también son las más difíciles de contactar a través de los programas convencionales de salud

Algunas de las poblaciones más susceptibles a contraer la infección por VIH/SIDA son también las más difíciles de contactar

primaria, tales como las clínicas de planificación familiar. Los adolescentes, los trabajadores sexuales, los refugiados y las mujeres solteras se encuentran entre los grupos con menos acceso o que no recurren a los servicios de los programas convencionales de salud reproductiva. Los proveedores de salud necesitan tomar medidas adicionales a fin de proveer de la información necesaria para prevenir el VIH/SIDA a estos grupos. Las campañas de información orientadas a estos grupos específicos, el mejoramiento de la interacción cliente-proveedor, la provisión de servicios más efectivos y los programas de extensión pueden ayudar a superar estos desafíos.

Hablando con los jóvenes sobre el VIH/SIDA. A menudo, los adolescentes no cuentan con información confiable sobre aspectos básicos de salud reproductiva, no han recibido las habilidades necesarias para negociar relaciones sexuales seguras y sanas, y no tienen acceso a servicios de salud reproductiva económicos y confidenciales (ver *Outlook*, Volumen 16, Número 3, sobre adolescentes). Los jóvenes representan la mitad de todas las nuevas infecciones por VIH del África al Sur del Sahara, y las mujeres presentan mayor riesgo que los hombres de contraer la infección durante cada contacto sexual. Los programas de VIH/SIDA para jóvenes han demostrado que:

- Los currículos escolares que incluyen educación entre pares, dramatizaciones y habilidades para la interacción social han disminuido la actividad sexual entre los jóvenes.^{24,25} En Perú, aquellos jóvenes que participaron en programas de educación entre pares orientados a promover una conducta sexual más responsable y sana mostraron una tendencia considerablemente menor a iniciar su vida sexual durante las actividades de intervención que aquellos que no participaron.²⁶
- Los programas orientados a jóvenes sexualmente activos pueden ofrecer importante información respecto de la sexualidad y entregarles las destrezas necesarias para protegerse del VIH, las ITS y los embarazos no deseados. Los programas que buscan ayudar a las mujeres jóvenes a protegerse deben ser sensibles al hecho de que, en algunos casos, las mujeres tienen sexo por obligación, por coerción o por necesidad de dinero u otra clase de incentivo.
- La educación en sexualidad, que incluye la promoción del uso del condón entre los jóvenes sexualmente activos, resulta esencial; los programas deben ser interactivos y centrarse en la comunicación, la negociación y la adquisición de habilidades. La mayoría de los estudios revelan que esta educación no promueve la actividad sexual, y que la educación en sexualidad puede cada vez más facilitar la comunicación entre jóvenes y adultos.^{27,28}
- Los jóvenes responden bien a los programas y actividades interactivas, a la educación de parte de sus padres, y a las actividades de extensión en los lugares de trabajo, de recreación y en la calle. Por ejemplo, el programa *Lentera*, que es parte de *la Asociación de Paternidad Planificada de Indonesia*, trata de llegar

a los jóvenes homosexuales en las áreas públicas donde se reúnen de noche. Los trabajadores comunitarios que trabajan en este programa proveen a los jóvenes de valiosa información, les entregan condones y los derivan a otros programas de salud o a otro tipo de programas según lo necesiten.²⁹

- Ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades y desarrollar talentos puede redundar en que se amplíen sus perspectivas económicas y que adquieran una visión más optimista del futuro, lo que a su vez puede traducirse en una disminución de las conductas de riesgo.

Involucrando a los hombres. En algunas regiones, los hombres tienen menos acceso a los servicios de salud que las mujeres. Los programas deben procurar que los hombres reciban información básica sobre el VIH/SIDA y sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus familias. También es importante entregar información sobre educación en sexualidad y aspectos de género.^{30,31} Programas tales como *Sociedad para Mujeres y SIDA* en África están llevando a cabo proyectos que involucran a los hombres en la salud reproductiva y los alientan a tener una sexualidad responsable y una comunicación abierta con sus parejas e hijos sobre cómo prevenir el VIH/SIDA.³²

Llegar a los hombres a través de programas en los lugares de trabajo y en instituciones como el ejército y la policía ofrece un importante potencial para promover el uso del condón y otras estrategias orientadas a reducir riesgos. El Ejército Nacional Tailandés, por ejemplo, movilizó a su estructura de mandos para instituir un programa de prevención basado en los principios de participación, influencia social y evaluación del riesgo de ciertas conductas sexuales. La intervención se centró en aumentar el uso del condón, reducir la ingestión de alcohol, disminuir la visita a burdeles, y mejorar la capacidad de negociación y las destrezas para usar el condón. Al cabo de un seguimiento de 18 meses, el diagnóstico de ITS fue mucho menos frecuente entre los hombres de los grupos intervenidos que en los grupos de control (tras ajustar para factores de riesgo basales).³³

Programas de Mercadeo Social

Los esfuerzos de mercadeo social pueden apoyar a los programas de prevención del VIH/SIDA. El mercadeo social suele valerse de avisos publicitarios y de los medios de comunicación para promover productos o conductas sanas. En el contexto de la prevención del VIH, los programas de mercadeo social a menudo promueven la venta y distribución de una marca específica de condones, comprados a un precio subsidiado y puestos a disposición del público. Se incorporan campañas en los medios masivos de comunicación para elevar el reconocimiento de marca, la aceptación general hacia los condones y la comunicación sobre la prevención del VIH. En Nepal, el Proyecto para la Prevención y Control del SIDA (AIDSCAP) creó una caricatura llamada Dhaaley Dai para promover la marca de condones Dhaal (que significa escudo). El personaje principal, dirigido a los camioneros que cruzan a frontera India-Nepal, fue presentado principalmente en carteles publicitarios, avisos, publicidad en las carreteras, y comerciales en la radio y la televisión. La campaña en los medios elevó el reconocimiento de la marca y dio origen a una manera fácil de iniciar una conversación sobre condones e ITS/VIH con los profesionales de extensión.⁶

Outlook, Volumen 14, Número 3, y el sitio web *Reproductive Health Outlook* (www.rho.org) ofrecen mayor información sobre la importancia de involucrar a los hombres en salud reproductiva.

Reduciendo la Transmisión Madre-Hijo

De las 14.500 personas que cada día contraen el VIH, el 11% son bebés que se infectan a través de sus madres. Desde el inicio de la epidemia, más de 3 millones de niños se han infectado por esta vía y el 90% de ellos viven en África.³⁴⁻³⁶ La transmisión madre-hijo del VIH (también llamada transmisión perinatal o vertical) puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia. Existen múltiples factores que influyen en esta transmisión, tales como la carga viral de la madre y el tipo de parto. El riesgo total de transmisión en los países en desarrollo varía aproximadamente entre un 25% a 45%.³⁵

Por el contrario, en los países desarrollados donde se dispone de una mayor variedad de intervenciones terapéuticas y de conductas, la transmisión general madre-hijo ha caído a un 4-6%.³⁷ El riesgo de la transmisión madre-hijo puede disminuirse aplicando una terapia antiretroviral a la madre y al bebé, y reduciendo la exposición del bebé al VIH durante el parto y la lactancia.

Idealmente, los programas orientados a prevenir la transmisión madre-hijo no deberían terminar con la terapia dirigida al bebé. Estos programas deberían formar parte de la atención que recibe la madre después del parto, que comprende el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al VIH, cuidados paliativos, asesoramiento nutricional y contactos con organizaciones que pueden facilitar los problemas sociales y psicológicos que enfrenta la madre infectada.³⁸

Terapia con drogas. Conforme a estudios realizados en países en desarrollo, la terapia con drogas ha reducido la transmisión madre-hijo en aproximadamente un 37% entre las mujeres que amamantan y en un 50% o más entre las mujeres que no están amamantando.^{10,36} Durante los últimos 10 a 15 años, se han usado varios regímenes antirretrovirales consistentes en zidovudina (conocida anteriormente como AZT) sola, y zidovudina más lamivudina.

Más recientemente, se ha demostrado que la nevirapina es más efectiva para reducir la transmisión madre-hijo. Además, los regímenes con nevirapina son más breves, simples y menos costosos que aquellos de zidovudina. En un estudio comparativo realizado en Uganda¹⁰, se reportaron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección por VIH en bebés de madres infectadas que tomaban zidovudina o nevirapina: el 21,3% y 11,9%, respectivamente, a las 6 a 8 semanas de edad, y el 25,1% y el 13,1% a las semanas 14 a 16. Todos los bebés recibieron lactancia materna inicialmente y el 96% seguía en lactancia materna al cabo de 14 a 16 semanas. El régimen de zidovudina consistió en que las embarazadas recibieran 600 mg de zidovudina por vía oral al empezar el trabajo de parto y 300 mg cada tres horas hasta el parto; sus hijos recibieron entonces 4 mg/kg por vía oral dos veces al día por siete días. Para el régimen de nevirapine, se administró a las mujeres una dosis única de 200 mg por vía oral al empezar el trabajo de parto, y sus hijos recibieron una dosis única de 2 mg/kg dentro de los tres primeros días desde el parto. El

régimen de nevirapina en dosis única tiene un costo aproximado de US\$4;¹⁰ el régimen de zidovudina suele tener un costo considerablemente mayor.

Algunos investigadores han propuesto que en las áreas donde la prevalencia del VIH sea alta y el acceso a los exámenes de VIH sea difícil, se administre —con anterioridad o al momento del parto— un tratamiento universal con nevirapina a todas las mujeres embarazadas. No obstante, aún son inciertos el costo y la aceptabilidad de este método. Además, esta estrategia debe equilibrar los aspectos éticos y de seguridad que implica sobretratar a las mujeres sanas y a sus hijos, por un lado, y esperar hasta que se puedan implementar servicios de CPV para los grupos afectados.

La atención durante el trabajo de parto y el parto.

Las intervenciones orientadas a prevenir la transmisión del VIH durante el trabajo de parto y el parto se han centrado en reducir la exposición de los bebés a la sangre y a las secreciones vaginales de la madre infectadas con VIH. Los proveedores de salud pueden reducir el riesgo de la transmisión durante el nacimiento evitando procedimientos invasivos como la amniotomía o la episiotomía. Antes se creía que el lavado vaginal para desinfectar la vagina antes del parto tenía algún potencial de prevenir la transmisión durante el parto. No obstante, la información de que se dispone actualmente no muestra reducción alguna en la transmisión de VIH.³⁹ Algunos informes de estudios observacionales realizados en los EE.UU. y Europa muestran una disminución de la transmisión del VIH en bebés nacidos luego de cesárea electiva. Además de los aspectos de seguridad, el costo y la disponibilidad de las cesáreas electivas hacen que ésta sea una intervención poco práctica en las comunidades de escasos recursos.^{39,40}

Lactancia. Si bien la lactancia puede significar la transmisión del VIH madre-hijo, en algunas comunidades la ausencia de lactancia también puede acarrear importantes riesgos para la salud de los bebés. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha redactado unas pautas para las mujeres embarazadas infectadas por el VIH, que enfatizan en ciertos aspectos. Estas incluyen

- usar fórmula si está al alcance de las mujeres comprarla y pueden prepararla en condiciones libres de riesgos (también se puede usar leche de origen animal preparada en condiciones seguras);
- amamantar exclusivamente durante los primeros tres a seis meses;
- extraer la leche materna y calentarla para matar el VIH, y alimentar al niño con un vaso en lugar de una botella o una tetina; y
- contratar los servicios de una nodriza que no esté infectada por el VIH.

La OMS recomienda que las mujeres que no saben si están infectadas, amamenten.^{34,41}

Los programas deben considerar éstos y otros aspectos involucrados antes de tomar una decisión adecuada. Las mujeres que no amamenten pierden el efecto anticonceptivo de la lactancia y necesitarán de consejería para escoger otro método.⁴² Los lactantes también pierden los efectos protectores de la lactancia y el valor nutritivo de la leche materna. Además, el estigma del VIH/SIDA contradice las recomendaciones de la OMS respecto de usar métodos de

alimentación alternativos: la mayoría de las mujeres en los países en desarrollo amamantan, y no amamantar suele ser interpretado como señal de VIH o abandono infantil.

¿La Circuncisión Masculina Reduce el Riesgo?

Desde 1989, los investigadores han tenido pruebas de que los hombres circuncidados se encuentran en menor riesgo de adquirir el VIH que aquéllos que no están circuncidados. Un meta-análisis realizado recientemente reveló que los hombres no circuncidados en África al Sur del Sahara tienen aproximadamente el doble de probabilidades de contraer el VIH en comparación con los que no están circuncidados.⁴³ Información adicional de una cohorte del estudio realizado en el distrito de Rakai sobre Control de ITS para la Prevención del SIDA sugiere que es menos probable que los hombres circuncidados VIH-positivos transmitan el virus a sus parejas mujeres, a pesar de que las cifras no fueron estadísticamente significativas.⁴⁴ Si bien se requiere de mayor investigación, se han sugerido diversos mecanismos fisiológicos que explicarían un posible efecto protector de la circuncisión, como por ejemplo la susceptibilidad del prepucio a las fisuras y las ITS ulcerativas.⁴⁵

Sin embargo, promover la circuncisión como método preventivo sigue generando controversia e involucra una serie de aspectos complejos, entre los que se incluyen aspectos éticos, de recursos, culturales y de seguridad. Algunos detractores argumentan que sería irresponsable fomentar que los hombres se circunciden, porque podrían considerarlo como un permiso para tener sexo sin protección. Promover un procedimiento quirúrgico que podría presentar complicaciones también genera inquietud, sobre todo si existen métodos de prevención no-invasivos^{46,47} y podría transmitir un mensaje confuso a las comunidades que tratan de poner fin a las tradiciones de mutilación genital femenina.

Desarrollando Medidas de Prevención Adicionales

A medida que la epidemia del VIH/SIDA se expande, los investigadores en todo el mundo trabajan para desarrollar mejores medidas para prevenir y tratar el VIH/SIDA. Además de un cambio de comportamiento, las herramientas de prevención más prometedoras son las vacunas contra el VIH y los microbicidas.

Vacunas. Las vacunas contra el VIH podrían ofrecer un importante impulso a los esfuerzos de prevención y son la esperanza más prometedora para erradicar el VIH/SIDA. La dificultad que entraña el desarrollo de una vacuna se refleja en los 12 años que han transcurrido entre la primera prueba de laboratorio de una vacuna contra el VIH y el primer estudio clínico importante. Entre los desafíos técnicos, se cuentan la existencia de numerosos subtipos de VIH, como también su amplia distribución geográfica. Una vacuna contra el subtipo B, por ejemplo, que es prevalente en los Estados Unidos y Europa Occidental, puede resultar menos efectiva en el sur de África y la India, donde predomina el subtipo C.⁴⁸ Es posible que las primeras vacunas tengan sólo un 40% de efectividad,⁴⁹ pero los modelos matemáticos sugieren que incluso las vacunas parcialmente efectivas podrían salvar millones de vidas en los países donde la prevalencia es alta.

Las organizaciones públicas y privadas están trabajando para superar los diversos aspectos técnicos, programáticos y

éticos impuestos por el desarrollo y prueba de las vacunas entre personas que no están infectadas. Una serie de organizaciones de la comunidad europea, los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU. (NIH) y la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (IAVI) están contribuyendo con importante financiamiento para el desarrollo de una vacuna contra el VIH. La IAVI está coordinando una iniciativa a nivel mundial para acelerar el progreso científico, movilizar el apoyo de la comunidad y fomentar la participación del sector industrial en el desarrollo de la vacuna contra el VIH/SIDA.⁴⁸

Microbicidas. Los microbicidas son productos que, al ser administrados intravaginalmente, pueden destruir el VIH y otros microorganismos que causan las ITS. Dado que los microbicidas requerirían poca o ninguna negociación con la pareja, podrían ofrecer a las mujeres una opción nueva y poderosa para prevenir el VIH. Formulados en variedades anticonceptivas y no anticonceptivas, los microbicidas también podrían llenar un vacío para las mujeres que requieren de una protección constante contra las ITS, pero no necesitan de un anticonceptivo.

A pesar de que ningún microbicida es ideal, varios candidatos para la primera generación de este producto están siendo sometidos a estudios clínicos. Falta mucho para tener un espermicida que mate o inactive el VIH y otros patógenos de ITS. Otros productos nuevos, la mayoría en forma de gel, evitan que los patógenos entren o se reproduzcan en las células cervicales, o fortalecen las defensas naturales de la vagina contra los patógenos.

Aún faltan unos cinco años o más para contar con un microbicida efectivo y de amplio uso. Se requiere de más investigación sobre su seguridad y eficacia, aceptabilidad, el efecto que tendrían sobre las pruebas de detección de ITS, su uso prolongado, su uso durante el embarazo y los efectos sobre el uso del condón.⁵⁰

Más Allá de la Prevención

La detección voluntaria y la consejería, la promoción del uso del condón masculino y femenino, la prevención de la transmisión madre-hijo y el manejo de las infecciones del tracto reproductivo son algunas de las principales medidas de prevención que se encuentran a disposición de los programas de salud reproductiva y de sus clientes. Sine embargo, a pesar del uso de estas medidas, los casos de VIH aumentan de manera exponencial, imponiendo una pesada carga a los sistemas de salud, las economías nacionales y las comunidades.

Este artículo continuará en el próximo número de *Outlook* (Volumen 19, Número 2). Allí se abordarán la disponibilidad y factibilidad del tratamiento de la infección por VIH y de las infecciones oportunistas y los cuidados paliativos in los países en desarrollo y en otras comunidades de escasos recursos.

Referencias

Dado la gran cantidad de publicaciones utilizadas para preparar este artículo, las referencias se han incluido en una página aparte.

Se recomienda a los lectores interesados en tener más información sobre ciertos enfoques específicos de investigación acerca de comunicación y cambios de comportamiento, consejería y pruebas de detección voluntarias, y otros temas sobre la prevención del VIH/SIDA que visiten el sitio web de AIDSQuest (www.popcouncil.org/horizons/AIDSQuest). AIDSQuest es un recurso para los investigadores y otras personas que desarrollen herramientas para la recolección de datos asociados al VIH/SIDA e incluye encuestas de diversas fuentes, así como también información sobre cómo se desarrolló y usó cada encuesta. En AIDSQuest se incluyen también consejos metodológicos para el diseño de preguntas relacionadas al SIDA.

El editor responsable de esta edición fue el Dr. Christopher J. Elias, Presidente de PATH. Contribuyeron a la redacción Wendy Castro, Robert Lande y Michele Burns. La asistente de producción fue Kristin Dahlquist.

Además de los miembros seleccionados de la Junta Asesora de *Outlook* y varios miembros del equipo de PATH, las siguientes personas revisaron esta edición: Sa J. Busza, Dr. M. Carael, Dr. G. Dallabetta, Dr. J. Pulerwitz y Dr. J. van Dam. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.

Outlook es publicado por PATH en inglés y francés y está disponible en español, chino, portugués y ruso. La versión en inglés cuenta con el financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce del inglés, publica y distribuye la edición en español de *Outlook*, con el patrocinio de PATH y de la Fundación Bill & Melinda Gates. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo. El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquéllas de sus patrocinadores, de individuos miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo. *Outlook* se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de EE.UU. \$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editora: Jacqueline Sherris, Ph.D.

Asistente de Edición: Michele Burns, M.A.

PATH

4 Nickerson Street

Seattle, Washington 98109-1699 EE.UU.

Teléfono: 206-285-3500

Fax: 206-285-6619

E-mail: outlook@path.org URL: www.path.org/outlook/

Las personas de ICMER a cargo de la traducción y producción de *Outlook* en español son Ana María Concha y Kane Sugiura.

JUNTA ASESORA

- Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de Salud de Italia
- Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU.
- Willard Cates, Jr. M.D., M.P.H., Presidente Family Health International, EE.UU.
- Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU.
- Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile
- Judith A. Fortney, Ph.D., Director Corporativo para Asuntos Científicos, Family Health International, EE.UU.
- John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido
- Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia.
- Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU.
- Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU.
- Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido
- Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU.
- Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU.
- Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU.
- Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.