

OUTLOOK

Cáncer de Mama: Incidencia en Aumento y Opciones Limitadas

El cáncer de mama es el más común de los cánceres y la principal causa de muerte por esta enfermedad entre las mujeres de todo el mundo.¹ En el año 2000, alrededor de 189.000 mujeres murieron a causa de este cáncer en los países desarrollados y 184.000 en los países en desarrollo, cifras que representan el 16% y 12%, respectivamente, de todas las muertes por cáncer entre mujeres.¹ Si bien la incidencia de cáncer de mama estandarizada por edad suele ser menor en los países en desarrollo que en los desarrollados (23,1 en comparación con 63,2 por cada 100.000 mujeres), las tasas de incidencia varían enormemente entre los distintos países y dentro de cada uno de ellos (ver Figura 1).¹ Por ejemplo, en las áreas templadas de Sudamérica, la incidencia de cáncer de mama es casi tan alta como en Norteamérica y Europa Oriental.²

Durante las últimas décadas, el riesgo de presentar cáncer de mama en los países desarrollados ha aumentado en un 1% a 2% al año.³ Si bien hay pocos datos acerca de los países en desarrollo, los registros de cáncer sugieren que las tasas de incidencia estandarizadas por edad están aumentando más rápidamente en aquellas regiones donde la incidencia es baja, tales como África y Asia.⁴ Los investigadores creen que factores socioeconómicos, características del estilo de vida (por ejemplo, primer embarazo tardío y dieta rica en grasas) y cambios en los patrones menstruales favorecen el aumento del riesgo en los países en desarrollo.^{3,5} Además, una expectativa de vida mayor tendrá como consecuencia que la incidencia de cáncer de mama aumente en forma significativa durante los próximos años en los países en desarrollo, dado que las mujeres mayores corren muchísimo más riesgo de presentar la enfermedad que las más jóvenes.³ Como resultado de estas tendencias, el cáncer de mama es ahora más común que el cáncer cervical en varios países en desarrollo.¹ (Para mayor información acerca del cáncer cervical, consulte *Outlook*, volumen 18, número 1.)


Estos factores, junto con los ampliamente difundidos avances para detectar y tratar el cáncer de mama, han contribuido a que esta enfermedad despierte más interés, incluso en aquellas regiones donde su incidencia aún es baja. Sin embargo, tal como muestra este artículo, los responsables de las políticas de salud deben sopesar cuidadosamente los costos y beneficios de combatir el cáncer de mama frente a otras necesidades de salud que compiten por los mismos recursos. Además, antes de iniciar un programa de detección precoz, las autoridades deben implementar servicios de diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos (que demandan una gran cantidad de recursos tecnológicos y financieros).

Factores de riesgo

Si bien aún no están claras las causas y la historia natural del cáncer de mama, la investigación epidemiológica ha revelado factores de riesgo genéticos, biológicos, ambientales y de estilo de vida para esta enfermedad. Aunque la mayor parte de dichas investigaciones se ha realizado en Europa y Norteamérica, los estudios hechos en otros países generalmente confirman estos patrones.

La edad es, sin duda, el principal factor de riesgo del cáncer de mama. Al comparar las mujeres entre 20 y 30 años con aquellas mayores de treinta años, éstas últimas tienen una probabilidad 10 veces mayor de desarrollar cáncer de mama; en las mujeres de cuarenta a cincuenta años,

Figura 1. Tasa de incidencia de cáncer de mama estandarizada por edad estimada por 100.000 habitantes (2000)



Fuentes: Ferlay, 2001;¹
Schwartzmann, 2001.²

la probabilidad aumenta 40 veces; en las mujeres entre cincuenta y sesenta años, la probabilidad es 60 veces mayor, y en las mayores de 60 años, esta probabilidad aumenta 90 veces.³

Las hormonas, especialmente los estrógenos, juegan un papel crucial en el desarrollo y crecimiento del cáncer de mama y pueden ser el factor común tras las muchas variables reproductivas asociadas a este cáncer.⁴ En teoría, entre más años la mujer esté expuesta a hormonas, mayor será su riesgo de presentar cáncer de mama. Por ejemplo, las mujeres en las que la menopausia ocurre después de los 54 años tienen una probabilidad dos veces mayor de desarrollar cáncer de mama; esta probabilidad aumenta al triple si la mujer tiene su primer hijo después de los 40 años.^{6,7} Del mismo modo, el riesgo de presentar la enfermedad disminuye con cada año de retraso de la menarquía. Los estudios también sugieren que entre más años haya amamantado una mujer (6 o más años durante el ciclo de vida), menor es el riesgo de presentar cáncer de mama, al menos entre las mujeres premenopáusicas.⁸

Algunos estudios de caso-control han generado inquietud respecto de que los cambios hormonales abruptos que se producen luego de un aborto inducido podrían aumentar el riesgo de desarrollar más tarde cáncer de mama. Con todo, estos estudios presentan un serio sesgo: debido a que el aborto es un tema tan controvertido, es muy probable que las mujeres sanas de los grupos de control, al contrario de las mujeres que padecen la enfermedad, omitan información acerca de este tema. Los estudios de cohorte más grandes y rigurosos que no presentan estos sesgos no detectaron ninguna relación entre los abortos inducidos y el riesgo de cáncer de mama.⁹

Un número importante de investigaciones ha analizado la relación entre el cáncer de mama y dos suplementos hormonales comunes: los anticonceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo. Los anticonceptivos orales están asociados a un leve aumento del riesgo de cáncer de mama que se prolonga hasta 10 años después de que la mujer ha dejado de tomarlos, pero es probable que los cánceres diagnosticados entre las mujeres que utilizaron estos anticonceptivos hayan sido me-

nos avanzados que los de las mujeres que no los usaron.^{4,6} La terapia hormonal de reemplazo guarda relación con un leve aumento del riesgo por cada año de uso, el que se mantiene cuatro años después del término de la terapia.^{6,7}

Los antecedentes de salud de la mujer y su familia también son fundamentales. La mujer tiene el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama si su madre o alguna de sus hermanas ha padecido este cáncer antes de los 50 años, y su riesgo se duplica nuevamente si dos familiares directos lo han tenido.⁶ Si bien este riesgo podría reflejar un componente genético de la enfermedad, las mutaciones genéticas parecen corresponder sólo al 5% de todos los casos de cáncer de mama.^{6, 10} Asimismo, las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de desarrollar cáncer de mama si tienen antecedentes de ciertos tipos de enfermedades mamarias benignas.⁶

La exposición a ciertos elementos ambientales, sobre todo a la radiación, podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las mujeres japonesas expuestas durante su adolescencia a la explosión de la bomba atómica presentaron una probabilidad dos veces mayor de desarrollar más tarde esta enfermedad, en comparación con las mujeres que no estuvieron expuestas a dicha radiación.⁶ Los tratamientos de radiación para ciertas enfermedades, especialmente si se administran a una edad muy temprana, también aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama.^{10,11}

Los investigadores también han estudiado la asociación entre el cáncer de mama y el estilo de vida, y han identificado ciertas relaciones; sin embargo, éstas son menores. Por ejemplo, es probable que el consumo de alcohol aumente el riesgo de cáncer de mama.^{4,6,11} La práctica de ejercicio durante la adolescencia y la edad adulta puede disminuir el riesgo.¹² El consumo de frutas y vegetales puede disminuir el riesgo, mientras que la ingesta de grasas parece aumentarlo, incluso entre poblaciones orientales cuyas dietas son bajas en contenido graso.¹⁰ La obesidad durante la vida adulta está asociada a un menor riesgo de cáncer de mama antes de la menopausia, pero a un riesgo mayor después de dicha etapa.^{6,7,13}

Claves para Reducir la Mortalidad

Es muy poco lo que se puede hacer para prevenir el cáncer de mama. Si bien la dieta, el ejercicio, la obesidad y el consumo de alcohol parecen guardar cierta relación con el riesgo de presentar esta enfermedad, la investigación no indica que las mujeres puedan prevenir la enfermedad si cambian su estilo de vida.¹⁰ Una de las estrategias de prevención se basa en intervenciones enfocadas en las mujeres de alto riesgo (utilizando los antecedentes médicos y la historia reproductiva de la mujer para calcular su riesgo de desarrollar este tipo de cáncer).¹⁴ Un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos con el tamoxifeno, un compuesto que actúa como el estrógeno y que se usa en el tratamiento del cáncer de mama, descubrió que, al ser usada por cinco años, esta droga disminuye a la mitad el riesgo de cáncer de mama invasor entre mujeres de alto riesgo. Otros estudios más pequeños realizados en Gran Bretaña e Italia no confirmaron estos resultados.¹⁰ Actualmente se están llevando a cabo más investigaciones con el tamoxifeno y con un compuesto similar: el raloxifeno. Algunas mujeres con importantes antecedentes familiares de cáncer de mama han optado por someterse a mastectomías profilácticas. Existen pocos datos sobre la efectividad de esta medida; desde luego, los costos financieros y psicológicos son enormes.¹⁰

Ante la falta de enfoques eficaces para prevenir el cáncer de mama, los sistemas de salud han optado por combinar la detección precoz y el tratamiento mejorado para aumentar la supervivencia de las mujeres que desarrollan esta enfermedad. En Estados Unidos, estas estrategias aumentaron las tasas de supervivencia de cinco años entre mujeres blancas de un 65% en 1973 a un 84% en 1991;¹⁵ en Singapur, las tasas aumentaron de un 46% a un 71% durante el mismo período.¹⁶ Sin embargo, las tasas de supervivencia siguen siendo bajas en la mayoría de los países que aún no han implementado estas estrategias en forma sistemática.

Detección precoz. El tratamiento del cáncer de mama resulta más simple y efectivo cuando la enfermedad se trata en sus primeras etapas. Las tasas de supervivencia disminuyen en forma dramática cuando las mujeres presentan casos avanzados, independiente del lugar donde vivan. A modo de ejemplo, las tasas de supervivencia de cinco años en Bombay son de un 80% para los casos de cáncer circunscritos sólo a la mama, 46% para los casos de cáncer que se han diseminado a los ganglios linfáticos y de un 10% para los casos que han hecho metástasis en otras partes del cuerpo, cifras que en el caso de mujeres blancas de Estados Unidos corresponden a un 97%, 76% y 20%, respectivamente.¹⁵ Por consiguiente, una estrategia clave para reducir la mortalidad por cáncer de mama es aumentar la proporción de casos que se detecten en forma precoz. Esta metodología se conoce como "downstaging".^{2,17,18} Lamentablemente, es común que las mujeres de los países de escasos recursos acudan a pedir tratamiento cuando la enfermedad ya se encuentra más avanzada de lo que estaría en las mujeres de otros países (ver Figura 2).¹⁵

Un factor que contribuye a que este cáncer sea detectado en sus etapas tardías es la tardanza con que las mujeres acuden para el examen mamario. Es posible que algunas mujeres no se den cuenta de la gravedad de su condición o que no sepan de la existencia de tratamientos contra el cáncer, mientras que otras pueden pensar que es posible tratar sus síntomas con remedios locales.¹⁸⁻²⁰ En muchos países, el estigma social que conlleva el cáncer de mama y la potencial desfiguración que supone la mastectomía también se han transformado


en obstáculos que es necesario superar. Es muy importante educar a las mujeres respecto del cáncer de mama y estimularlas a que busquen atención médica en forma inmediata (ver cuadro de la página 4).

La falta de programas masivos de detección en muchos países también contribuye a agravar el problema. Someter regularmente a todas las mujeres sobre cierta edad a exámenes de detección podría aumentar rápidamente la proporción de casos de cáncer de mama diagnosticados en sus primeras etapas.³ Por ejemplo, en Singapur, un amplio estudio aleatorizado de mamografías encontró que el 64% de los cánceres pesquisados con pruebas de detección eran cánceres *in situ* o en su Etapa I, en comparación con sólo un 26% de los cánceres de un grupo de control, en que la enfermedad fue diagnosticada después que las mujeres o sus médicos advirtieran los síntomas.²¹

Enfoques acerca de las pruebas de detección. Existen tres enfoques sobre la detección del cáncer de mama. Dos de dichos enfoques —el examen clínico de las mamas (ECM) y el autoexamen mamario— se basan en una palpación manual de las mamas. El ECM es realizado por personal de salud capacitado en palpación e inspección de las mamas en busca de abultamientos y otros síntomas del cáncer. En los programas masivos de detección, todas las mujeres mayores de 35 ó 40 años son sometidas a un ECM anual. Se estima que la técnica tiene una sensibilidad del 54% y una especificidad del 94%.²² El ECM permite pesquisar ciertos abultamientos que no aparecen en las mamografías, especialmente en mujeres jóvenes cuyos tejidos mamarios densos pueden ser causa de confusión de los rayos X. Los cánceres detectados con el ECM suelen tener un diagnóstico menos alentador que los cánceres detectados con mamografía, debido a que los primeros ya tienen un tamaño tal que les permite ser identificados al tacto.²³

Con todo, todavía no se ha determinado con exactitud cuán eficiente es el ECM para disminuir la mortalidad; hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio que haya comparado las tasas de mortalidad en mujeres que regularmente se someten a este examen con aquéllas que no lo hacen. Algunos estudios sugieren que este enfoque podría brindar algunos beneficios. Por ejemplo, un estudio a gran escala sobre mamografías

Figura 2.
Distribución de los casos de cáncer de mama por etapa



Fuentes: Vorobiof, 2001;¹⁸ Chopra, 2001;²⁷ Schwartzmann, 2001;² Korean Breast Cancer Society, 2000;⁵ Forbes, 1997.³

realizado en Canadá concluyó que el ECM por sí solo fue tan exitoso en disminuir la mortalidad como hacerlo junto con una mamografía.²⁴ En Japón, la detección masiva con un ECM anual también se ha asociado con una menor mortalidad por cáncer de mama.²⁵ Sin embargo, aún es necesario realizar más investigaciones que permitan determinar cuáles podrían ser los beneficios de la detección masiva con ECM.²⁶

Dado que la efectividad del ECM depende completamente de la habilidad del proveedor de salud para realizar el examen, es importante usar estrategias de capacitación comprobadas y técnicas estandarizadas.^{22,24} La capacitación produce mejores resultados si se utilizan modelos de mamas de silicona para practicar la palpación. En vista de que la técnica que utilice el trabajador de la salud puede variar en el tiempo, es necesario realizar controles periódicos para garantizar que dichas técnicas se ajusten estrictamente a los protocolos.²⁸ Investigaciones indican que las enfermeras capacitadas pueden realizar el ECM tan bien como los médicos²⁸ y que es posible capacitar a trabajadores de salud comunitarios para que realicen estos exámenes.²⁹

Una Mayor Conciencia

En la mayoría de los países donde la incidencia de cáncer de mama es tan alta que lo transforma en un problema de salud pública, el gobierno, los profesionales médicos y el público no se dan cuenta de su real importancia. La sensibilización dirigida a los personeros de gobierno y a los encargados de las políticas puede ayudar a que el cáncer de mama ocupe un lugar importante en la agenda nacional, a fomentar el desarrollo de políticas de salud y protocolos de servicios sistemáticos, y a aumentar el acceso de las mujeres a los servicios de detección y tratamiento.³² Sin embargo, antes de poner en práctica dichas políticas, los sistemas de atención de salud deben aumentar la conciencia de los proveedores de atención primaria y enseñarles las habilidades que les permitan reconocer los síntomas del cáncer de mama y decidir oportunamente la derivación de la paciente.¹⁷

Otro punto de similar importancia es informar al público general que el cáncer de mama puede curarse si es detectado en forma precoz. Incluso en países donde este cáncer es relativamente inusual, las mujeres deberían entender la necesidad de buscar atención médica rápidamente si detectan un abultamiento en sus pechos u otros síntomas. Los hombres también son un público importante, dado que frecuentemente son ellos quienes detectan abultamientos en los pechos de sus parejas y pueden influir en que la mujer acuda al sistema de salud.

Al hablar abiertamente acerca del cáncer de mama en foros públicos, las campañas de sensibilización tienen un beneficio adicional: reducen el estigma asociado al cáncer de mama. Las mujeres que han sobrevivido a la enfermedad son interlocutoras especialmente creíbles. Los testimonios de primera mano pueden mitigar el estigma y concertar el apoyo público para iniciativas que guarden relación con el combate de esta enfermedad. En todo el mundo, las campañas multimediales han logrado difundir el tema del cáncer de mama a través de la radio y la televisión, en carteles y folletos y durante competencias deportivas y maratones populares.¹⁹ En países como Brasil, organizaciones no gubernamentales capacitan a voluntarios de la comunidad para aumentar la conciencia de la enfermedad entre las mujeres locales, enseñar técnicas de autoexamen mamario y ayudar a las mujeres a acceder a servicios de detección, diagnóstico y tratamiento.² En Nigeria, las escuelas han incorporado el tema del cáncer de mama a su currículum de salud.¹⁹

El otro método de detección manual, el autoexamen mamario, ha sido respaldado y ampliamente promovido en todo el mundo por las organizaciones que luchan contra el cáncer, y las investigaciones tendientes a confirmar su efectividad continúan desarrollándose.³⁰ Sin embargo, aún no existe evidencia suficiente que demuestre que el autoexamen mamario reduzca las tasas de mortalidad por cáncer de mama.^{26,31} A modo de ejemplo: un gran estudio aleatorizado realizado en Shanghai no encontró un impacto positivo sobre la tasa o el estadio en que fue diagnosticado ni en las tasas de mortalidad de cinco años, pese a que las mujeres recibieron educación permanente sobre la técnica.³³

El tercer método de detección, la mamografía, utiliza los rayos X para detectar tumores y anomalías en las mamas. La mamografía puede pesquisar cánceres y anomalías mamarias benignas cuyo tamaño es tan pequeño que no es posible detectarlas por palpación, por lo que su sensibilidad (de entre un 83% y un 95%) es muchísimo mayor que la del ECM, especialmente en las mujeres postmenopáusicas que tienen menos tejidos mamaros densos.³⁴ No obstante, aún no está claro cuántas de estas pequeñas lesiones se desarrollarán en el tiempo hasta convertirse en cánceres invasores.²⁴ Además, las mamografías no detectan todos los tumores; de hecho, no detectan un 10% de todos los cánceres en mujeres de más de 50 años e, incluso, en mujeres más jóvenes.^{35,36} Debido a que la mamografía es menos sensible en mujeres más jóvenes y a que las tasas de cáncer de mama son menores en este grupo, los expertos discrepan en cuanto a si esta técnica es costo-efectiva en mujeres menores de 50. Sin embargo, concuerdan en que no se justifica realizar pruebas de detección a mujeres menores de 40 años. La frecuencia con que se deben realizar pruebas de detección también está en debate: en varios países, los programas repiten las mamografías a intervalos de uno, dos y tres años.

En vista de que la mamografía es el único método de detección cuya eficacia ha sido establecida (ver cuadro de la página 5), la mayoría de los países en desarrollo ha optado por esta técnica. Los costos de este método de detección son altos, aunque guardan relación con sus beneficios. La mamografía exige equipos complejos, suministros continuos de película y químicos, técnicos especializados que realicen los exámenes, radiólogos expertos que los analicen y un control de calidad constante para alcanzar niveles razonables de exactitud.³⁴

Creación de un programa de detección. Antes de poner en práctica algún tipo de programa de detección de cáncer de mama, los encargados de las políticas de salud en países con pocos recursos deberían evaluar cuidadosamente sus costos y potenciales beneficios. En aquellos países donde la incidencia de cáncer de mama es baja, establecer un programa de detección podría restar recursos a problemas de salud más apremiantes, sin que con ello se reduzca en forma importante la mortalidad. Además, los programas de detección no tendrán éxito si no se mantiene un control de la calidad o si no se ofrecen estudios de diagnóstico ni servicios de tratamiento a todas las mujeres que presenten síntomas sospechosos.¹⁷ La cobertura es otro punto que debe tomarse en cuenta: es necesario que participe al menos un 70% de las mujeres para que se produzca una disminución importante en los índices de mortalidad. El miedo, la vergüenza, la incomodidad, el costo y las actitudes fatalistas pueden ser razones para que las mujeres no participen.²¹

En aquellos lugares donde las tasas de incidencia son lo suficientemente altas como para que sea necesario adoptar alguna medida (por ejemplo, en ciertas regiones de Sudamérica), el primer paso es garantizar que las mujeres que presenten síntomas tengan acceso a pruebas de diagnóstico y a tratamiento a precios razonables. La disponibilidad de recursos puede influir en que las autoridades encargadas de la toma de decisiones opten por un programa de detección basado en el ECM en lugar de la mamografía. Pese a que no se ha demostrado fehacientemente la efectividad del ECM para disminuir la mortalidad, puede utilizarse el examen para pesquisar la mayoría de los tumores que aparecen en las mamografías, con menos falsos-positivos y menos tumores no invasores de importancia incierta.^{17,23} El ECM es más barato, no requiere de equipos y puede ser practicado por enfermeras y otros trabajadores de salud del sector primario.^{17,37} Sin embargo, la falta de datos acerca de su eficacia para reducir la mortalidad hace necesario que los países que decidan adoptarlo como su principal método de detección evalúen minuciosamente su efecto sobre la mortalidad a lo largo del tiempo.

En Ucrania, país cuyas tasas de incidencia de cáncer de mama son moderadas, un análisis detectó que la mamografía costaría entre cuatro y seis veces más por cada caso de cáncer detectado de lo que costaría el ECM, incluidos sólo los costos constantes de mano de obra e insumos.³⁷ La disparidad sería aún mayor si se incluyeran los costos iniciales de capacitación y equipo. Por lo tanto, se recomendó establecer un programa de detección basado en el ECM a partir de los 35 años. En Japón también se utiliza desde el año 1987 un programa de detección similar basado en el ECM.²⁵

Tratamiento mejorado. El tratamiento mejorado de las mujeres con cáncer de mama también es fundamental para reducir la mortalidad a causa de esta enfermedad. Junto con la

detección a través de la mamografía, los avances en el tratamiento han sido la clave de una fuerte disminución de la mortalidad a causa de la enfermedad durante los últimos 15 años en Estados Unidos y Reino Unido.^{38,39}

Independientemente de si una anomalía es detectada por la propia mujer, a través de un ECM o de una mamografía, es necesario realizar mayores estudios en forma urgente. Si bien la mamografía y el ultrasonido (técnica que en ocasiones se utiliza para determinar con mayor precisión la ubicación de una protuberancia y guiar una biopsia) pueden resultar útiles, finalmente un patólogo necesitará de una biopsia (por punción o quirúrgica) para examinar el tejido sospechoso y diagnosticar la enfermedad.⁴⁰

El enfoque sobre el tratamiento puede ser definido de acuerdo al estadio de la enfermedad (ver cuadro de la página 6), al grado histológico del tumor (es decir, cuánto se asemeja a las células normales bajo el microscopio), al estado del receptor de hormonas, a la capacidad proliferativa (o tasa de crecimiento) y/o a la presencia de genes que favorezcan el crecimiento y la recurrencia.

El tratamiento del cáncer de mama ya no se restringe más a la cirugía; cada día existen más terapias coadyuvantes. Estos cambios terapéuticos se ven influidos por un debate en curso sobre si el cáncer de mama comienza como una enfermedad localizada que puede ser curada extirpando quirúrgicamente el tumor primario o si se trata de una enfermedad sistémica que exige terapias adicionales incluso en sus primeras etapas.⁴¹ Hoy en día, los médicos suelen recurrir a una combinación de tratamientos locales que eliminan o destruyen el cáncer de la mama (como la cirugía y la radiación) y de tratamientos sistémicos que destruyen o controlan las células del cáncer en todo el cuerpo (como la quimioterapia y la terapia hormonal).

¿Reduce la Mamografía la Mortalidad por Cáncer de Mama?

Desde los años 60 hasta los 80, se realizaron ocho estudios clínicos aleatorizados en los que participaron unas 500.000 mujeres de Canadá, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El objetivo de estos estudios fue evaluar el impacto de la detección con mamografías en la mortalidad por cáncer de mama.⁴² Estos estudios encontraron una disminución de entre un 20% y un 30% en la mortalidad por cáncer de mama asociada con la detección rutinaria a través de mamografías entre mujeres de 50 a 69 años. No obstante, una revisión crítica reciente de estos estudios cuestiona estas conclusiones e indica que existieron sesgos y fallas metodológicas que podrían haber distorsionado los datos y su análisis.^{43,44} Entre los posibles problemas se cita una distribución aleatoria inadecuada de los grupos de control y de estudio, evaluaciones poco confiables acerca de las causas de muerte, un sesgo en los tiempos de supervivencia debido a la detección precoz, y la detección y tratamiento de cánceres de crecimiento lento y anomalías benignas con buen pronóstico. Tras haber descartado a la mayoría de los estudios originales debido a sus fallas metodológicas y considerando la mortalidad general en lugar de la mortalidad por cáncer de mama, estos revisores de los estudios concluyeron que la detección a través de mamografías no reporta beneficios.^{43,44}

El debate que se generó luego de la revisión ha llevado a los investigadores a examinar nuevamente la evidencia de la detección a través de la mamografía. Una vez revisados exhaustivamente los estudios clínicos originales, dos grupos de expertos (International Agency for Research on Cancer Working Group y Preventive Services Task Force) han concluido que la mayor parte de las críticas no tenía fundamentos y que la evidencia sigue apoyando una disminución significativa de las muertes por cáncer de mama asociadas a una detección a través de mamografías entre mujeres de 50 años o más.^{42,45} Luego de concluir que la metodología era esencialmente válida, los investigadores también han extendido el seguimiento de los estudios suecos a casi 16 años. Los resultados indican que la detección con mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama entre las mujeres en 50 y 69 años en un 21% y la mortalidad total en un 2%. Además, indican que el beneficio de estos exámenes se mantuvo a largo plazo.⁴⁶ Pese a esto, la acalorada discusión sobre los beneficios de la mamografía continúa, mientras los científicos analizan todos los datos disponibles.

Hay quienes señalan el potencial daño de la mamografía. Del casi 5% de los mamogramas que arrojan resultados sospechosos, más de un 80% corresponde a casos falsos-positivos que provocan ansiedad en las mujeres y hacen necesario realizar procedimientos de seguimiento complejos, incómodos y costosos.³⁶ Más aún, tal como ocurre en todos los programas de detección del cáncer, la mamografía puede pesquisar cánceres que tienen pocas posibilidades de poner en riesgo la vida. La tecnología médica actual no puede distinguir entre tumores dañinos y tumores inofensivos en sus primeras etapas. El tratamiento de estos tumores no invasores o de crecimiento lento consume recursos y afecta a las mujeres sin que ello disminuya la mortalidad.^{29,43} Por último, existe evidencia de que la exposición a la radiación de la mamografía aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama, pese a que la mayoría de los expertos sostiene que este pequeño riesgo se ve ampliamente compensado por los beneficios de la detección con este método.³⁵

En los últimos años, los médicos han comenzado a realizar cirugías más conservadoras que no implican remover la mama y que, junto con la radioterapia, han demostrado ser tan efectivas como los procedimientos más radicales, pero tienen menos efectos debilitantes para la mujer.⁴⁰ En lugar de la mastectomía, que implica sacar todo el seno (y en ocasiones también los músculos del pecho), los cirujanos pueden optar por realizar tumorectomías o mastectomías parciales para extirpar sólo el cáncer y parte del tejido circundante. Sin embargo, en lugares donde no se dispone de radioterapia, no deberían practicarse cirugías que conserven las mamas. Las disecciones de nódulos linfáticos axilares, que extirpan todos los nódulos linfáticos que se encuentran bajo el brazo, siguen constituyendo la práctica estándar. Estas disecciones también están siendo desafiadas por un nuevo procedimiento más conservador llamado biopsia del ganglio centinela, en la que sólo se extirpa un nódulo linfático, el que es analizado para determinar si el cáncer se ha expandido. Sin embargo, este procedimiento aún no ha sido aceptado como medida de cuidado estándar.⁴⁷

Las terapias coadyuvantes se utilizan para evitar la recurrencia de los cánceres de mama y, más recientemente, para reducir el tamaño de tumores grandes antes de realizar una cirugía.⁴⁷ La radioterapia utiliza rayos de alta energía para destruir las células cancerígenas que quedan luego de la cirugía. Si bien la radioterapia convencional depende de una máquina externa para generar la radiación, existen técnicas nuevas que consisten en implantar materiales radioactivos en el seno. La quimioterapia implica administrar una combinación de drogas varias veces durante meses, con pausas entre los tratamientos. Por su parte, la terapia hormonal, efectiva cuando los tumores tienen receptores de progesterona o estrógenos, bloquea el acceso de las células cancerosas a las hormonas que favorecen su crecimiento. Este tipo de terapia puede basarse en medicamentos, como el tamoxifeno y el raloxifeno, o en la extracción quirúrgica de los ovarios.

Después del tratamiento, las pacientes de cáncer de mama deben someterse a seguimientos regulares para controlar los efectos colaterales de la terapia y los resultados del tratamiento mismo, y para detectar posibles reapariciones del cáncer. Los ejercicios y los medicamentos pueden aliviar parte de los efectos de la cirugía. El asesoramiento y el apoyo emocional pueden ayudar a las pacientes a enfrentar los efectos colaterales comunes de la radioterapia (fatiga y problemas de la piel), la quimioterapia (fatiga, náuseas, caída del cabello, úlceras bucales e infecciones) y de la terapia hormonal (bochornos, flujo vaginal y períodos irregulares). Es importante realizar

mamografías anuales y exámenes físicos para controlar la reaparición del cáncer, lo que es probable especialmente durante los dos o tres primeros años.

En general, en los países de escasos recursos hay un acceso limitado a los procesos de diagnóstico y tratamiento aquí descritos. Fuera de las principales ciudades, la dotación de oncólogos, radiólogos, patólogos, técnicos capacitados, equipamiento y medicamentos suele ser escasa.^{15,18} Esto deja la mayoría de los casos en manos de cirujanos generales que no tienen la suficiente capacitación en el tratamiento del cáncer de mama y utilizan las mastectomías sin terapia coadyuvante.⁵ Asimismo, es posible que los trabajadores de la salud no tengan ni siquiera las habilidades y conocimientos básicos. A modo de ejemplo: en muchos lugares, es posible que las enfermeras a cargo de las pacientes con cáncer de mama no sepan que deberían evitar procedimientos como la toma de la presión arterial o la extracción de sangre del brazo afectado por linfedema (acumulación de líquido) luego de la cirugía. Asimismo, es posible que tampoco sepan enseñar ejercicios para prevenir el linfedema, manejar el dolor del paciente o mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia.²⁰

A fin de mejorar la calidad de la atención y las tasas de supervivencia de las pacientes de cáncer de mama, los sistemas de salud que cuentan con pocos recursos deben formular planes y protocolos de diagnóstico y tratamiento basados en la evidencia que den cuenta de los recursos financieros y técnicos disponibles.^{15,32} Por lo general, deben tomar opciones difíciles, pero prácticas. Por ejemplo, la quimioterapia y el tamoxifeno pueden constituir la base de la terapia coadyuvante debido a que ambos son más fáciles de ofrecer que la radioterapia. Por su parte, la quimioterapia puede limitarse a unas cuantas combinaciones de medicamentos que resulten efectivas en función de los costos. Los estudios basados en la comunidad y la investigación operativa en países con menores recursos pueden ayudar a identificar cuáles serían las intervenciones de tratamiento y diagnóstico más costo-efectivas y evaluar las mejores formas de llevarlas a la práctica.¹⁵

Claves para Mejorar la Calidad de Vida

El apoyo psicológico a un precio razonable y los cuidados paliativos pueden mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama y sus familias. Desde el momento que las mujeres reciben el diagnóstico de cáncer, experimentan ansiedad, sensación de soledad y depresión.⁴⁸ Las mujeres se preocupan del estigma de la enfermedad, se preguntan si podrán seguir cuidando de sus familias y si los cambios en su apariencia influirán negativamente en sus relaciones íntimas. Estas

Clasificación del Cáncer de Mama

Los médicos utilizan el sistema de clasificación TNM (tumor primario, nódulos linfáticos regionales, metástasis distante) para evaluar el pronóstico del cáncer de mama de una paciente y ayudar a decidir el tratamiento. Cada día más publicaciones sugieren que es probable que el desarrollo del cáncer no sea lineal. Sin embargo, aún se encuentran en curso investigaciones acerca del origen y el desarrollo de la enfermedad.

Etapa 0: Carcinoma *in situ* (cáncer no invasor).

Etapa I: El tumor es pequeño (2 cm o menos) y el cáncer no se ha diseminado a los ganglios linfáticos.

Etapa II: El tumor es pequeño, pero el cáncer llegó a los ganglios linfáticos; o el tumor es de un tamaño moderado (entre 2 y 5 cm), con o sin compromiso de los ganglios linfáticos; o el tumor es grande (más de 5 cm), pero el cáncer no se ha diseminado a los ganglios linfáticos.

Etapa III: El tumor es grande y el cáncer llegó a los nódulos linfáticos; o el tumor es de cualquier tamaño, pero los ganglios linfáticos están considerablemente comprometidos; o el tumor es de cualquier tamaño, pero el cáncer llegó a la pared torácica o a la piel.

Etapa IV: El cáncer ha producido metástasis más allá de los ganglios linfáticos axilares hasta alcanzar otras partes del cuerpo.

mujeres pueden encontrar apoyo en sesiones individuales, en charlas informativas, en grupos de apoyo con pares o en actividades espirituales. Participar en dichas actividades puede ayudarlas a afrontar la experiencia, disminuir la ansiedad y los sentimientos de soledad, aumentar su sentido de control, brindarles modelos positivos a seguir e infundirles un sentido de esperanza en sus vidas. Asimismo, la participación en estas actividades puede dar a las mujeres acceso a información acerca de su enfermedad que a menudo no obtienen de los médicos, incluida información acerca de tratamientos, pronóstico y autocuidado.⁴⁹ Con este tipo de apoyo, las mujeres pueden tomar decisiones informadas acerca de su propio tratamiento y pueden organizarse para exigir una mejor atención y cambios en las actitudes públicas.¹⁹

Por ejemplo, desde 1988, la Penang Breast Care Society de Malasia ha capacitado a voluntarias, por lo general sobrevivientes de cáncer de mama, que ofrecen apoyo emocional y consejos prácticos a las mujeres que han sido notificadas recientemente de su enfermedad.⁵⁰ Esta organización también ha equipado una sala del hospital local donde ofrecen folletos y libros acerca del cáncer de mama, cintas de vídeo sobre la rehabilitación, muestras de prótesis y pelucas. Una organización similar en Costa Rica, la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (FUNDESO), organiza visitas a hospitales luego que las mujeres han tenido cirugía, patrocina grupos de apoyo, mantiene un albergue para mujeres que deben realizarse quimioterapia y radioterapia y que viven lejos de la ciudad y, además, importa prótesis y sostenes especiales.⁵¹

Si bien los cuidados paliativos deberían integrarse con los tratamientos curativos durante todo el transcurso de la enfermedad, dicho enfoque resulta fundamental cuando el cáncer ya ha pasado a una etapa para la que no hay cura. Un elemento fundamental de los cuidados paliativos es el alivio de los síntomas; las mujeres que padecen cáncer de mama deberían tener acceso garantizado a medicamentos contra el dolor. Allí donde se disponga de quimioterapia, ésta puede ayudar a controlar las metástasis y mejorar la calidad de vida.⁴⁷ A medida que el cáncer avanza, las mujeres necesitarán cuidados de enfermería que, por lo general, les brindan sus propias familias. Los cuidados paliativos deberían considerar ofrecer a los miembros de estas familias consejo práctico y apoyo emocional.

Conclusiones

Pese a que la incidencia del cáncer de mama ha aumentado y con ello también ha aumentado la conciencia sobre la enfermedad, hay pocas opciones de detección y tratamiento en las regiones que disponen de pocos recursos. En aquellos lugares donde la incidencia del cáncer de mama sigue siendo relativamente baja, los responsables de la toma de decisiones deben sopesar cuidadosamente cuáles son los beneficios para la salud pública de invertir los limitados recursos en programas de detección y tratamiento frente a los costos y beneficios de abordar otros problemas de salud apremiantes. En aquellas regiones donde la incidencia del cáncer de mama es alta, las pruebas de diagnóstico y los tratamientos deben estar al alcance de las mujeres que presentan síntomas, a un costo razonable. Igualmente importante es la entrega de apoyo psicológico

y cuidados paliativos a las mujeres que padecen esta enfermedad y de sus familias.

Sólo después de que existan servicios de diagnóstico, tratamiento y de cuidados paliativos, los responsables de la planificación de la atención de salud deberían considerar introducir programas de detección precoz. Las campañas masivas a través de los medios de comunicación y las actividades educativas constituyen una manera simple de aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama y de estimular a las mujeres sintomáticas para que busquen atención médica lo más prontamente posible. Por el contrario, el uso de mamografías resulta costoso y complejo desde el punto de vista técnico

y sus beneficios son relativamente pocos. La detección a través del examen clínico mamario es más factible en lugares que poseen pocos recursos, pero sus beneficios aún no han sido comprobados. Por lo tanto, hay países que se enfrentan a opciones difíciles al momento de determinar si combatirán la enfermedad y en qué forma lo harán, especialmente en regiones donde la incidencia aumenta, pero los recursos siguen siendo escasos.

Los responsables de la toma de decisiones deben sopesar cuidadosamente los costos y beneficios de combatir el cáncer de mama frente a otras necesidades de salud apremiantes.

1. Ferlay, J. et al. GLOBOCAN 2000: *Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence Worldwide*. Versión 1.0. IARC CancerBase No. 5. Lyon: IARC Press (2001). Versión limitada disponible en línea en www-dep.iarc.fr/globocan/globocan.html.
2. Schwartzmann, G. Breast cancer in South America: challenges to improve early detection and medical management of a public health problem. *Journal of Clinical Oncology* 19(18s):118s-124s (2001).
3. Forbes, J.F. The incidence of breast cancer: the global burden, public health considerations. *Seminars in Oncology* 24(1, suppl 1):S1-20-S1-35 (1997).
4. Sasco, A.J. Epidemiology of breast cancer: an environmental disease? *APMIS* 109:321-332 (2001).
5. Korean Breast Cancer Society. Clinical characteristics of Korean breast cancer patients in 1998. *Journal of Korean Medical Science* 15:569-579 (2000).
6. McPherson, K. et al. ABC of breast diseases. Breast cancer—epidemiology, risk factors, genetics. *British Medical Journal* 321:624-628 (2000).
7. Alberg, A.J. Epidemiology, prevention, and early detection of breast cancer. *Current Opinion in Oncology* 11:435-441 (1999).
8. Lipworth, L. et al. History of breast-feeding in relation to breast cancer risk: a review of the epidemiologic literature. *Journal of the National Cancer Institute* 92(4):302-312 (2000).
9. Davidson, T. Abortion and breast cancer: a hard decision made harder. *Lancet Oncology* 2:756-758 (2001).
10. Physician Data Query (PDQ). Prevention of Breast Cancer (PDQ®): Prevention—Health Professionals. Bethesda, Maryland: National Cancer Institute (febrero, 2002). Disponible en línea en www.cancer.gov/cancer_information/doc_pdq.aspx?version=1&summaryid=208_04730.
11. Laden, F. and Hunter, D.J. Environmental risk factors and female breast cancer. *Annual Review of Public Health* 19:101-123 (1998).
12. Matthews, C.E. et al. Lifetime physical activity and breast cancer risk in the Shanghai Breast Cancer Study. *British Journal of Cancer* 84(7):994-1001 (2001).
13. Pathak, D.R. and Whittemore, A.S. Combined effects of body size, parity, and menstrual events on breast cancer incidence in seven countries. *American Journal of Epidemiology* 135(2):153-168 (1992).
14. Klausner, R. et al. *Breast Cancer Risk Assessment Tool*. Bethesda, Maryland: National Cancer Institute (2000). Disponible en línea en <http://bcra.nci.nih.gov/brc>.
15. Sankaranarayanan, R. et al. An overview of cancer survival in developing countries. En: *Cancer Survival in Developing Countries*. IARC Scientific Publication No. 145, pp. 135-157. Lyon, Francia: IARC (1999).
16. Chia, K.S. et al. Population-based cancer survival in Singapore, 1968 to 1992: an overview. *International Journal of Cancer* 93:142-147 (2001).
17. Miller, A.B. Screening in developing countries: problems and opportunities. *Cancer Treatment and Research* 86:183-189 (1996).
18. Vorobiof, D.A. et al. Breast cancer incidence in South Africa. *Journal of Clinical Oncology* 19(18s):125s-127s (2001).
19. National Breast Cancer Coalition. Report on the Second World Conference on Breast Cancer Advocacy—Influencing Change. Brussels, 11-14 de marzo, 1999. Disponible en línea en www.stopbreastcancer.org/bin/index.htm.

20. Braun, C.M. Cancer care in Nepal. Factors that affect diagnosis, treatment and prognosis: a case study. *Cancer Nursing* 24(2):137-142 (2001).
21. Ng, E.H. et al. Results of intermediate measures from a population-based, randomized trial of mammographic screening, prevalence and detection of breast carcinoma among Asian women: the Singapore Breast Screening Project. *Cancer* 82(8):1521-1528 (1998).
22. Barton, M.B. et al. Does this patient have breast cancer? The screening clinical breast examination: should it be done? How? *JAMA* 282(13):1270-1280 (1999).
23. Mittra, I. et al. Is clinical breast examination an acceptable alternative to mammographic screening? *British Medical Journal* 321:1071-1073 (2000).
24. Miller, A.B. et al. Canadian national breast screening study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50-59 years. *Journal of the National Cancer Institute* 92(18):1490-1499 (2000).
25. Kurioshi, T. et al. Effectiveness of mass screening for breast cancer in Japan. *Breast Cancer* 7(1):1-8 (2000).
26. Robles, S. and Galanis, E. *Breast Cancer in Latin America and the Caribbean: Raising Awareness of the Options* Washington, D. C: Pan American Health Organization (2001).
27. Chopra, R. The Indian scene. *Journal of Clinical Oncology* 19(18s):106s-111s (2001).
28. Baines, C.J. Physical examination: its role as a single screening modality in the Canadian National Breast Screening Study. *Cancer* 63:1816-1822 (1989).
29. Mittra, I. Breast cancer screening. Resumen de "Cancer Strategies for the New Millennium." Londres, octubre 19-20, 1998. Disponible en línea en www.who.int/ncd/cancer/publications/abstracts/abs9810_08.html.
30. Miller, A.B. et al. Breast self-examination. *Canadian Medical Association Journal* 166(2):163 (2002).
31. Baxter, N. Preventive health care, 2001 update: should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast cancer? *Canadian Medical Association Journal* 164(13):1837-1846 (2001).
32. Ngoma, T. Organization of cancer services in low resource environments—the Tanzania experience. Resumen de "Cancer Strategies for the New Millennium." Londres, 19-20 de octubre, 1998. Disponible en línea en www.who.int/ncd/cancer/publications/abstracts/abs9810_18.html.
33. Thomas, D.B. et al. Randomized trial of breast self-examination in Shanghai: methodology and preliminary results. *Journal of the National Cancer Institute* 89(5):355-365 (1997).
34. Mushlin, A.I. et al. Estimating the accuracy of screening mammography: a meta-analysis. *American Journal of Preventive Medicine* 14:143-153 (1998).
35. Primić-Zakelj, M. Screening mammography for early detection of breast cancer. *Annals of Oncology* 10(Suppl 6):S121-S127 (1999).
36. Wright, C.J. and Mueller, B. Screening mammography and public health policy: the need for perspective. *The Lancet* 346(8966):29-32 (July 1, 1995).
37. PATH. Proposed Breast Cancer Early Detection Strategy for Ukraine (2000-2005). PATH Discussion Paper. Seattle, Washington: PATH (agosto, 2000).
38. Peto, R. et al. UK and USA breast cancer deaths down 25% in year 2000 at ages 20-69 years. *The Lancet* 355(9217):1822 (mayo 20, 2000).
39. Chu, K.C. et al. Recent trends in U.S. breast cancer incidence, survival, and mortality rates. *Journal of the National Cancer Institute* 88(21):1571-1579 (1996).
40. Smith, B.L. The breast. *Current Problems in Obstetrics, Gynecology and Fertility* 19(1):5-35 (1996).
41. Jatoi, I. The natural history of breast cancer. *Surgical Clinics of North America* 79(5):949-960 (1999).
42. U.S. Preventive Services Task Force. *Screening for Breast Cancer: Recommendations and Rationale*. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality (febrero, 2002). Disponible en línea en www.ahrq.gov/clinic/3rduspstf/breastcancer/brcanrr.htm.
43. Olsen, O. and Gøtzsche, P. Cochrane review on screening for breast cancer with mammography. *The Lancet* 358(9290):1340-1342 (20 de octubre, 2001).
44. Olsen, O. and Gøtzsche, P.C. Screening for breast cancer with mammography (Cochrane review). En: *The Cochrane Library, Issue 1, 2001*. Oxford: Update Software (2002).
45. International Agency for Research on Cancer (IARC) Working Group. Mammography screening can reduce deaths from breast cancer. IARC Press Release No. 139 (18 de marzo, 2002).
46. Nyström, L. et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomized trials. *The Lancet* 359(9310):909-919 (16 de marzo, 2002).
47. Physician Data Query (PDQ). *Breast Cancer (PDQ®): Treatment—Health Professionals*. Bethesda, Maryland: National Cancer Institute (abril, 2002). Disponible en línea en www.cancer.gov/cancer_information/treatment/.
48. Dow, K.H. Rehabilitation and follow-up. *Psycho-Social Impact of Breast Cancer, First Series of Updates for Health Professionals*. Update 3. International Union against Cancer (UICC), Cancer Organisations, Public Education and Patient Services (COPES) (2000). Disponible en línea en <http://cope.uicc.org/Updates/rehab.shtml>.
49. Bishop, A. et al. Lives renewed: the emergence of a breast cancer survivor movement in Ukraine. *Reproductive Health Matters* 9(18):126-134 (2001).
50. Penang Breast Care Society. Malaysia: Penang Breast Care Society. *SHARE: The Newsletter of Reach to Recovery International* (otoño, 2001). Disponible en línea en <http://cope.uicc.org/share/pages/groups/fall01.htm>.
51. Meoño de López, M.E. Fundación nacional de solidaridad contra el cáncer de mama (FUNDESOS). Costa Rica. *SHARE: The Newsletter of Reach to Recovery International* (primavera, 2000). Disponible en línea en <http://cope.uicc.org/share/pages/groups/spring00.htm>.

La editora invitada para este número fue Amie Bishop; la escritora fue Adrienne Kols. Michele Burns proporcionó ayuda editorial. Kristin Dahlquist colaboró en la producción. Además de los miembros seleccionados del Directorio de *Outlook*, las siguientes personas revisaron este número: Dr. A. Miller, Dr. I. Mittra, Dr. M. Parkin, Dr. S. Robles y Dr. R. Sankaranarayanan. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.

Outlook es publicado por PATH en inglés y francés y esta disponible en español, chino, indonesio, portugués y ruso. *Outlook* presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre la regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo.

El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) traduce, publica y distribuye la edición en español de *Outlook*. Las personas de ICMER a cargo de la traducción y producción de *Outlook* en español son Ana María Concha, Kane Sugiura y Ximena Toro.

Este número de *Outlook* en español cuenta con el patrocinio de PATH y de la Fundación Bill & Melinda Gates.

El contenido y las opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquellas de sus patrocinadores, de los miembros de la Junta Asesora de *Outlook*, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo. *Outlook* se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de US\$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editora: Jacqueline Sherris, Ph.D.
 PATH
 1455 N.W. Leary Way
 Seattle, Washington 98107 - 5136
 Fono: 206 - 285 - 3500
 Fax: 206 - 285 - 6619
 E-mail: outlook@path.org
 URL: http://www.path.org/resources/pub_Outlook.htm

JUNTA ASESORA

- Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de Salud de Italia
- Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU.
- Willard Cates, Jr. M.D., M.P.H., Presidente de Family Health International, EE.UU.
- Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU.
- Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile
- Judith A. Fortney, Ph.D., Científica Principal, Family Health International, EE.UU.
- John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido
- Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia
- Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU.
- Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU.
- Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido
- Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU.
- Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU.
- Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU.
- Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.