

OUTLOOK

Violencia contra las Mujeres: Efectos sobre la Salud Reproductiva

Millones de niñas y mujeres son víctimas de violencia y sufren las consecuencias del maltrato debido a la discriminación de género y a su condición de desigualdad en la sociedad. La violencia contra las mujeres (a menudo llamada violencia basada en el género) es una seria violación de los derechos humanos. No obstante lo anterior, no se ha otorgado la suficiente atención a las graves consecuencias que el abuso tiene para la salud ni a las necesidades de salud de las mujeres y niñas abusadas. Las mujeres que han experimentado violencia física, sexual o psicológica padecen una serie de problemas de salud, y a menudo lo hacen en silencio. Su salud física y mental se ve deteriorada, sufren más lesiones y hacen mayor uso de los recursos médicos que las mujeres que no han sido abusadas.

Mujeres de todas las edades son víctimas de violencia, en parte debido a su limitado poder social y económico en comparación con los hombres. Si bien los hombres también son víctimas de la violencia, la violencia contra las mujeres se caracteriza por su alta prevalencia al interior de la familia, su aceptación por la sociedad, y su grave impacto en el largo plazo sobre la salud y el bienestar de las mujeres. Las Naciones Unidas han definido la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basada en el género que tenga, o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.¹


Los profesionales de la salud tienen la oportunidad y la obligación de identificar, tratar y educar a las mujeres que sufren abusos. A su vez, las instituciones de salud pueden hacer importantes contribuciones a la manera cómo se enfrenta la violencia contra las mujeres, brindando apoyo tanto al personal clínico como a las clientes. El desarrollo y la institucionalización de políticas nacionales del sector de la salud, protocolos y normas sobre violencia contribuyen a llamar la atención respecto del problema de la violencia basada en el género, y ayudan a garantizar la atención de calidad para las sobrevivientes del abuso.

Este número de *Outlook* se centra en las consecuencias para la salud reproductiva de la violencia contra las mujeres. Presenta ejemplos de investigaciones y programas exitosos y explora cómo el sector de salud puede tomar un papel activo para prevenir y tratar la violencia contra las mujeres.

¿Cuán Común es la Violencia contra las Mujeres?

En todo el mundo, al menos una de cada tres mujeres ha experimentado durante su vida alguna forma de abuso por razones de género.² La violencia contra las niñas y mujeres puede comenzar antes de su nacimiento y continuar a lo largo de sus vidas hasta llegar a la edad avanzada (ver Figura 1). Las mujeres se resisten a hablar sobre el maltrato y pueden llegar a aceptarlo

Figura 1. El Ciclo de Vida de la Violencia Contra las Mujeres y sus Efectos sobre la Salud*



como parte de su rol. Incluso suponiendo que los datos actuales subestimen la prevalencia de la violencia contra las mujeres, millones de niñas y mujeres en todo el mundo sufren a causa de la violencia y de sus consecuencias.

Las formas más comunes de violencia contra las mujeres son el abuso físico, sexual y emocional por parte del esposo o la pareja íntima. Encuestas realizadas indican que entre el 10 y el 58 por ciento de las mujeres han experimentado abuso físico por parte de una pareja íntima en sus vidas (ver Figura 2).² Los resultados preliminares de un Estudio Multipaís de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Doméstica indican que, en algunas partes del mundo, la mitad de las mujeres han experimentado violencia doméstica.⁵

A continuación se describen diversas formas de violencia ejercida contra las mujeres y su prevalencia:

- Entre el 12 y el 25 por ciento de las mujeres han sido obligadas por su pareja íntima o ex-pareja a tener relaciones sexuales alguna vez en sus vidas.⁶
- La violación en los tiempos de guerra se usa actualmente como arma para intimidar a las comunidades y perpetuar la limpieza étnica. Asimismo, la violencia sexual contra las mujeres en los campos de refugiados y centros para mujeres desplazadas está siendo reconocida como un problema grave.
- La iniciación sexual forzada y el abuso sexual de niñas son comunes en todo el mundo. Estudios transversales revelan que el 40 por ciento de las mujeres en Sudáfrica, el 28 por ciento en Tanzania y el 7 por ciento en Nueva Zelanda señalaron que su primer encuentro sexual fue forzado.³

- Una revisión de estudios realizados en 20 países reveló que la prevalencia del abuso sexual en niñas variaba entre el 7 y el 36 por ciento.⁷ La mayoría de los abusadores eran hombres conocidos por la víctima.³
- El matrimonio precoz de niñas es más común en el África subsahariana y en el sur de Asia. Los datos oficiales sobre matrimonios muy precoces (bajo los 15 años de edad) son limitados, pero existen estudios que indican que en zonas de África Oriental y Occidental, por ejemplo, el matrimonio a los 7 u 8 años no es poco común; en zonas del norte de Nigeria, la edad promedio para contraer matrimonio es de 11 años.⁸ El matrimonio precoz restringe las oportunidades de educación y de otro tipo para las niñas, y a menudo conduce a un embarazo precoz y conlleva a mayores riesgos para la salud.
- Los abortos selectivos por sexo, el infanticidio femenino y el sistemático descuido de las necesidades nutricionales y de salud de bebés niñas contribuyen en conjunto a una mayor mortalidad entre las niñas. Estos factores se han traducido en la “desaparición” de 60 a 100 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.³
- En algunas regiones, las mujeres sufren los daños de prácticas tradicionales tales como las muertes relacionadas con la dote, lanzamiento de ácido y asesinatos por “honor”.
- Los profesionales de la salud participan en formas de abuso culturalmente aceptadas, tales como exámenes para confirmar la virginidad, partos forzados por cesárea y mutilación genital femenina (ver cuadro, página 4).^{9,10}
- El tráfico de mujeres y niñas para realizar trabajos

forzados y para su explotación sexual es otro tipo de abuso basado en el género que daña a mujeres y niñas (ver cuadro, página 6).

Factores que Contribuyen a la Violencia Contra las Mujeres

La violencia contra las mujeres ocurre en todos los países, en todos los grupos sociales, culturales, económicos y religiosos. A nivel de sociedad, la violencia contra las mujeres es más común en culturas donde los roles de género estén muy definidos y se hacen respetar estrictamente; donde la masculinidad esté asociada íntimamente a una actitud agresiva, al honor masculino o a la dominancia; donde se acepta que se castigue a mujeres y niños; y donde la violencia es una manera estándar de resolver conflictos.^{2,11} Si bien el abuso ocurre en todos los entornos socioeconómicos, la pobreza y el estrés asociado a la pobreza contribuyen a la violencia por parte de la pareja íntima.¹¹

Al interior de las relaciones, tanto el control por parte del hombre de los bienes y de la toma de decisiones, como la inestabilidad de las relaciones se asocian poderosamente al abuso.² Antes se pensaba que las mujeres con muchos hijos presentaban un mayor riesgo de abuso. No obstante, investigaciones actuales indican que el abuso doméstico aumenta el riesgo de la mujer de tener muchos hijos, ya que restringe su capacidad de tener control en cuanto al momento en que desea tener relaciones sexuales y al uso de métodos anticonceptivos.¹²

Violencia contra las Mujeres y Salud Pública

Las mujeres que sufren abusos tienen una peor salud mental y física, más lesiones y una mayor necesidad de recursos médicos que las mujeres no abusadas.⁴ Conforme al Estudio Multi-País sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Doméstica, las mujeres abusadas en Brasil, Japón y Perú presentaron una probabilidad dos veces mayor que las no abusadas de señalar que su estado de salud actual es malo o muy malo.⁵

El impacto del abuso basado en el género sobre la salud física puede ser inmediato y en el largo plazo. No obstante, las mujeres que sufren de abusos rara vez buscan atención médica por trauma agudo. Menos de la mitad de las mujeres en los Estados Unidos que han sido abusadas buscan tratamiento para las lesiones resultantes.⁴ Incluso cuando lo hacen, es posible que sus problemas de salud nunca sean atribuidos a abusos. Las sobrevivientes de abuso suelen exhibir conductas de salud negativas, incluyendo el consumo de alcohol y drogas. Los problemas crónicos de salud a causa del abuso incluyen dolor crónico (dolores de cabeza, de espalda); problemas y síntomas neurológicos, incluidos desvanecimientos y convulsiones; trastornos gastrointestinales; y problemas cardíacos.⁴

Las mujeres abusadas suelen vivir con temor y sufrir de depresión, ansiedad e incluso estrés post-traumático.⁴ Un estudio realizado en Norteamérica reveló que las mujeres abusadas presentaban una probabilidad tres veces mayor de sufrir estrés post-traumático que las mujeres no abusadas.⁴ El Estudio Multi-País de la OMS reveló que las mujeres en Perú, Brasil, Tailandia y Japón que habían sido abusadas física y sexualmente por sus parejas presentaban una probabilidad dos veces mayor de haber considerado suicidarse que aquellas que no habían sido sometidas a abusos.⁵

Según investigaciones realizadas en Nicaragua, los hijos de madres abusadas también podrían presentar mayores niveles de mortalidad infantil y de la niñez.¹³ Incluso si no son víctimas directas del abuso, los niños que han presenciado abusos presentan una mayor probabilidad de sufrir problemas de aprendizaje, emocionales y de conducta.¹² Además, estos niños se encuentran en mayor riesgo de convertirse más tarde en víctimas de abuso o en abusadores.²

Efectos sobre la Salud Reproductiva


La salud sexual y reproductiva de las mujeres se ve claramente afectada por la violencia de género. Un estudio realizado en EE.UU. reveló que las mujeres que habían experimentado abuso por parte de su pareja íntima presentaban una probabilidad tres veces mayor de tener un problema ginecológico que las mujeres no abusadas.⁴ Entre estos problemas se incluían el dolor pélvico, sangrado o flujo vaginal, infección vaginal, menstruación dolorosa, disfunciones sexuales, fibromas, enfermedad inflamatoria de la pelvis, dolor al tener relaciones sexuales, infección del tracto urinario e infertilidad.

El abuso sexual, en especial las relaciones sexuales forzadas, puede provocar traumas físicos y mentales. Además del daño producido a la uretra, vagina y ano, el abuso puede provocar infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA. Las mujeres que revelan estar infectadas con VIH también pueden ser sometidas a violencia.⁴

La maternidad precoz, a menudo como resultado de matrimonios precoces y forzados, puede traducirse en una serie de problemas de salud, incluidos los efectos de un aborto realizado en condiciones de riesgo. Las niñas menores de 15 años presentan una probabilidad cinco veces mayor de morir durante el parto que las mujeres entre veinte y treinta años.¹⁴ También presentan un mayor riesgo de fistula obstétrica, la que puede ser consecuencia de un trabajo de parto prolongado y obstruido.¹⁵

El abuso limita la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Al comparar las mujeres abusadas sexualmente con aquellas que no lo han sido, es mucho más probable que aquellas

Figura 2. Violencia por Parte de la Pareja Íntima en Países Seleccionados*



*Porcentaje de mujeres adultas que han sido agredidas físicamente por una pareja íntima según encuestas realizadas a nivel nacional. Debido a diferencias en la población y métodos del estudio, los resultados no necesariamente son comparables.

Fuentes: Heise et al., 1999;² Serbanescu et al., 1999;¹⁶ INEI, 2001.¹⁷

que han sufrido abuso usen métodos de planificación familiar de manera clandestina, que sus parejas les impidan seguir usando algún método o se nieguen a usar condón para prevenir enfermedades.⁵ Las sobrevivientes de abuso presentan una mayor probabilidad de practicar conductas sexuales de alto riesgo, de experimentar embarazos no planificados, y de presentar disfunciones sexuales que las mujeres no abusadas.²

Estudios realizados revelan que aproximadamente en el 4 al 15 por ciento de los embarazos ocurridos en los Estados Unidos, Canadá, Suecia, el Reino Unido, Sudáfrica y Nicaragua ha habido abuso físico.^{4,12,20,21} El abuso ejercido por parejas íntimas durante el embarazo puede ser un factor de riesgo más relevante para las complicaciones del embarazo que otras

afecciones que rutinariamente se procura pesquisar entre las embarazadas, tales como la hipertensión y la diabetes.²² El abuso durante el embarazo ha sido asociado a retrasos en la obtención de atención prenatal, mayor consumo de tabaco y drogas/alcohol durante el embarazo, insuficiente aumento de peso materno y depresión.² El abuso de mujeres embarazadas se ve asociado a abortos en condiciones de riesgo, abortos espontáneos, partos de feto muerto, bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. Si bien es difícil determinar una relación causal entre el abuso y estos resultados adversos, un meta-análisis reciente de 14 estudios indica que existe una relación importante entre el bajo peso al nacer y el abuso durante el embarazo.²³ Un estudio realizado en Nicaragua reveló que los casos de bajo peso al nacer eran cuatro veces mayores en bebés cuyas madres habían sido abusadas físicamente durante el embarazo.²⁴ El abuso puede influir directamente en el peso del recién nacido, por ejemplo a causa de golpes en el abdomen que precipitan un parto prematuro. De manera indirecta, el abuso se ve asociado a factores que también contribuyen al bajo peso al nacer, como por ejemplo el consumo de tabaco, el abuso de alcohol y de drogas, y las ITS.

Mutilación Genital Femenina

La mutilación genital femenina (MGF) —también conocida como “circuncisión femenina”— es una forma de violencia de género avalada culturalmente y que se practica en más de 20 países de África, Asia y el Medio Oriente. El término MGF describe una serie de procedimientos que involucran la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos y/o la lesión de los órganos genitales femeninos por razones culturales, tradicionales u otras razones no terapéuticas.¹⁸ Más de 130 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a este procedimiento y se calcula que dos millones de niñas se encuentran en riesgo de MGF cada año.¹⁸

La MGF se asocia a una serie de problemas de salud graves, incluida la infección, dolor crónico, disfunción sexual y complicaciones obstétricas. Menos se sabe sobre las consecuencias psicológicas y emocionales, pero el estrés, la ansiedad y la depresión estarían asociadas al procedimiento.

Los esfuerzos por eliminar la MGF comprenden desde acciones gubernamentales de alto nivel hasta la educación comunitaria; las lecciones aprendidas a partir de estos proyectos se aplican a la prevención de todo tipo de violencia de género. Reformar las leyes, educar y capacitar son factores clave, aunque estos esfuerzos por sí solos no bastan para lograr cambios en las conductas. Por ejemplo, algunos esfuerzos por educar a las personas sobre los efectos nocivos para la salud de los procedimientos tradicionales de la MGF se han traducido en la “medicalización” de la MGF; las personas creen que el procedimiento es seguro cuando se realiza en un entorno médico. El personal de salud necesita capacitación especial para reconocer las complicaciones asociadas a la MGF y para manejar la atención del embarazo, parto y postparto de las mujeres que han sido sometidas a dicho procedimiento.

Si bien la MGF es considerado un importante rito de paso a la vida adulta, los esfuerzos por eliminarla deben tomar en cuenta los aspectos positivos de los rituales que rodean la MGF, y permitir a las comunidades preservarlos a través de ritos alternativos.¹⁹ Los programas para eliminar la MGF pueden servir de modelos para la creación de intervenciones más extensas orientadas a cambiar las prácticas tradicionales que causan daño a las mujeres. Para obtener mayor información sobre la MGF, ver *Outlook*, Volumen 16, Número 4, y el sitio web Reproductive Health Outlook (RHO), www.rho.org/html/hthps.htm.

Cómo Abordar la Violencia a través de Programas de Salud Reproductiva

Los efectos de la violencia sobre la salud de mujeres son graves, de largo alcance y se entrelazan entre sí. Los proveedores de salud tienen la oportunidad y la obligación de identificar los casos de abuso. Para muchas mujeres de los países en desarrollo, una visita a un centro de salud para acceder a servicios de salud reproductiva o infantil puede ser el único contacto que tengan con el sistema. El sector salud puede aprovechar esta oportunidad otorgando un ambiente seguro y acogedor para las clientas, ayudando a los proveedores a preguntar acerca del abuso y procurando que las mujeres reciban la atención que necesitan. Los distintos pasos para integrar la violencia de género a los programas de salud han sido esbozados en una guía elaborada por FNUAP.²⁵

Preguntar acerca del abuso. Capacitar a los proveedores de salud acerca de cómo abordar en forma directa el tema del abuso con las mujeres que los consultan puede ser una manera eficaz de identificar a las sobrevivientes de abuso.^{26,27} No obstante, pocos profesionales de salud conversan sobre este tema como parte de su rutina profesional, incluso en los países con mayores recursos.²⁷ En algunos programas, puede resultar poco práctico realizar una detección del abuso en todas las mujeres, e incluso poco ético si no se hace de manera adecuada y confidencial. Hacerlo en grupos específicos, tal como en las mujeres que buscan atención prenatal u otros servicios de salud reproductiva, puede resultar más factible.

Identificar las barreras. Los programas para detectar la violencia necesitan superar ciertas barreras a nivel de los proveedores y del sistema de salud.² Los proveedores perciben que la falta de capacitación, el escaso tiempo con que cuentan y la falta de intervenciones eficaces son las principales barreras para detectar el problema.²⁸

Los proveedores también pueden mostrarse reticentes a realizar tareas de detección debido a que:

- se sienten incómodos de preguntar acerca del tema,
- temen la respuesta de la mujer,
- enfrentan diferencias culturales y de lenguaje con las clientas,


- temen ofender a las clientas, y
- se sienten frustrados por percibir que las clientas no responden a sus recomendaciones.^{26,27}

Muchas de estas barreras se relacionan con las actitudes y sesgos de los proveedores. Dado que los proveedores suelen compartir el mismo ambiente social y cultural que sus clientas, también podrían experimentar o ejercer la violencia. Por ejemplo, un estudio cualitativo de 38 enfermeras de salud primaria en la zona rural de Sudáfrica reveló que habían sufrido niveles de violencia similares o mayores al de sus clientas.²⁹ Otros estudios revelaron que en muchos países es alta la proporción de proveedores de salud que ha experimentado violencia por parte de su pareja.²⁶ Un aspecto especialmente preocupante es que las enfermeras y otros proveedores de salud a veces son abusivos hacia las pacientes a su cuidado,³⁰ e incluso puedan ellas mismas ser objeto de abuso dentro del sector de salud.³¹

Muchas mujeres se muestran agradecidas de tener la oportunidad de discutir sus experiencias.^{2,32} Es por ello que preguntar acerca de la violencia y darles una oportunidad para que hablen puede resultar terapéutico. Algunas clientas, no obstante, temen que la detección de rutina y la denuncia obligatoria del abuso a las autoridades tenga consecuencias negativas para ellas.³³ En el Estudio Multi-país de la OMS, muchas mujeres informaron que varios factores habían influido en que no hubieran buscado ayuda después de experimentar abuso: vergüenza, temor a las consecuencias o simplemente la aceptación de una situación de violencia por parte de su pareja íntima.⁵

Ofrecer capacitación. Se necesita capacitar a los proveedores para que puedan superar sus propias creencias y sentimientos respecto del abuso, así como también para ayudarlos a desarrollar las habilidades necesarias que les permita atender a las mujeres abusadas. Capacitarlos puede contribuir a dar una nueva orientación al papel que cumplen los proveedores, de modo que puedan apoyar a las mujeres abusadas y ayudarlas a hacer cambios que disminuyan el riesgo de abuso. En la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM) en Caracas, Venezuela, se realizaron campañas de sensibilización con el personal respecto del tema del abuso y se lo capacitó para que pudieran abordar el problema en sus clínicas de salud reproductiva.³⁴ Se dio al personal la posibilidad de realizar dramatizaciones durante la capacitación, tanto en el papel de proveedores de salud como de clientas. Al actuar como “clientas,” el equipo vivió la experiencia de cuán útil puede ser que alguien los escuche con empatía y hable con ellos acerca de sus experiencias.

En un proyecto sobre violencia doméstica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevado a cabo en diez países andinos y centroamericanos, se ha usado una serie de estrategias de capacitación. Algunos países han optado por realizar actividades de sensibilización para todo su personal clínico, mientras que otros capacitan al personal de ciertas áreas, como por ejemplo de salud mental.³⁵ Algunos también incluyen capacitación especializada en procedimientos médicos forenses y en la detección del abuso sexual infantil. La capacitación basada en la experiencia, así como también estadias de intercambio y de práctica profesional, son eficaces estrategias de capacitación. Incluir la violencia y el abuso en los currículos de educación médica podría ayudar a sensibilizar a profesionales de salud y prepararlos mejor para abordar



Los esfuerzos tales como la creación de este afiche por el Fondo para el Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas (UNIFEM) pueden contribuir a reducir el estigma asociado a la violencia basada en el género. Foto cortesía de UNIFEM, Media/Materials Clearinghouse, JHU/CCP.

estos aspectos. Los proveedores también necesitan oportunidades de capacitación continua, en especial debido a la alta rotación del personal. Si bien es cierto que una mayor capacitación redundará en una probabilidad más alta de que se les pregunte a las clientas acerca de si experimentan abuso, es muy necesario que los administradores de programas refuercen la importancia de dicha capacitación y que se responsabilice a los proveedores de identificar situaciones de abuso.

Facilitar la detección. Contar con ciertas herramientas de detección puede ayudar a los proveedores a abordar el tema del abuso sin emitir juicios y de manera consistente. Guiándose por una breve lista de preguntas, los proveedores pueden consultar a las clientas sobre experiencias presentes y pasadas con abuso físico, emocional y sexual. En PLAFAM, el uso de una herramienta de detección sistemática contribuyó a que la detección de violencia en clientas aumentara desde un 7 por ciento hasta más del 30 por ciento. Los proveedores consideraron que el cuestionario era fácil de usar y una herramienta más eficiente que otras usadas previamente. Un timbre en la ficha de las clientas ayudó a documentar el abuso y permitió llevar un registro con fines de evaluación.³⁶

Los proveedores deben asegurar un ambiente seguro y confidencial, y establecer una relación de confianza y respeto con sus clientas antes de preguntarles acerca del abuso. En las salas de espera, se puede difundir material educativo, incluyendo afiches en las paredes y folletos informativos, para que las clientas sepan que en el centro se puede hablar acerca del abuso de manera segura. Los proveedores deben tener cuidado de no exponer a las clientas a un riesgo mayor al violar su confidencialidad. El papel del proveedor es empatizar con la

cliente y validar sus experiencias, y apoyar su autonomía para decidir qué hacer frente a las situaciones a que se enfrente.

Ofrecer servicios apropiados. Saber que una mujer ha experimentado abuso permite a un proveedor de salud otorgarle una mejor atención. Las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja íntima suelen tener necesidades de salud específicas, incluyendo pruebas para detectar y tratar ITS, y la preocupación especial de mantener en secreto el uso de anticonceptivos. Las mujeres que han sido violadas necesitan consejería, y podrían necesitar anticoncepción de emergencia, antibióticos profilácticos y/o terapia antirretroviral. También debería ofrecérseseles apoyo y derivación para un seguimiento psicológico, médico y legal. En muchos países, la policía exige que las mujeres se realicen un examen médico y reciban un certificado médico antes de presentar una denuncia oficial por violencia doméstica.³⁷ El nivel de atención que se entregue a las mujeres abusadas dependerá de los recursos disponibles en el centro de atención y al interior de la comunidad.

Empoderar a proveedores y clientas. Los proveedores necesitan saber que se valoran sus esfuerzos por identificar el abuso y deben ser empoderados para ayudar a sus clientas si detectan algún caso.³⁸ Se necesitan nuevas maneras de evaluar la eficacia de las intervenciones realizadas por proveedores. Además de su labor enfocada a prevenir muertes y discapacidades, puede ser igualmente importante el que contribuyan a mejorar la autoestima y reducir la ansiedad y tensión entre las clientas que han sido abusadas.

Algunos programas han descubierto que es útil poder derivar a una cliente dentro del mismo centro para que reciba consejería en mayor profundidad.^{32,35} El consejero designado (no necesariamente un profesional de salud mental) puede ayudar a las clientas a determinar sus necesidades y plan de

acción. Esto requiere un buen conocimiento y coordinación entre los servicios de atención y servicios legales, sociales y comunitarios apropiados. PLAFAM investigó y desarrolló un directorio de organizaciones locales que ofrecen servicios psicológicos, sociales y legales a los que se puede derivar a las mujeres abusadas.³² Mantener este directorio actualizado asegura una continua colaboración y coordinación entre agencias.

Las instituciones pueden crear grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso, así como para los mismos proveedores, quienes podrían necesitar hablar de sus experiencias y sentimientos. Al ofrecer ayuda a muchas mujeres al mismo tiempo, los grupos de apoyo resultan costo-efectivos; asimismo, relacionarse con otras personas que han experimentado el abuso e intercambiar consejos puede servir para empoderar a las participantes.³⁵

Tal como lo demostró un reciente análisis del proyecto sobre violencia doméstica de la OPS, las instituciones también pueden cumplir un papel fundamental para establecer normas y protocolos nacionales que permitan identificar el abuso.³⁵ Una difusión amplia de las políticas y procedimientos asociados al abuso puede mejorar la calidad de la atención dentro del sector de la salud. Documentar y desarrollar sistemas de información para identificar y pesquisar los casos de abuso ayudará a definir el impacto y la carga del abuso sobre la salud, y contribuirá a incrementar su visibilidad.

Actividades de Extensión. A fin de abordar el tema de la violencia contra las mujeres, es importante que las actividades se realicen también fuera de los centros de salud (ver cuadro, página 7). Mejorar la comunicación y la coordinación entre las redes de derivación ayudará a las mujeres abusadas a abrirse camino a través de la compleja red de servicios e instituciones que les permita recibir la ayuda que necesitan. En Nicaragua, más de 100 organizaciones que conforman la Red

“Las mujeres están esperando que alguien les pregunte [acerca de la violencia basada en el género]... Creo que cuando les preguntamos, las mujeres piensan: ‘Por fin alguien me ofrece la oportunidad de hablar acerca de este sufrimiento’.”

—Personal de PLAFAM, Venezuela³²

Tráfico de Mujeres

Entre 700.000 y 2.000.000 de personas, la mayoría de ellas mujeres y niñas/os, son traficadas cada año a través de límites internacionales para realizar trabajos forzados, incluido el trabajo sexual.³⁹ La mayoría de estas víctimas son originarias de Asia, pero un número considerable proviene de países de la ex Unión Soviética (100.000), Europa Oriental (75.000), América Latina y el Caribe (100.000) y África (50.000).³⁹

Se calcula que el tráfico de personas es la tercera fuente de ganancias por crimen organizado, reportando miles de millones de dólares cada año.³⁹ Los conflictos étnicos también contribuyen al tráfico, especialmente de mujeres y niñas.⁴⁰ Muchas víctimas de tráfico son secuestradas o engañadas, mientras que otras recurren a las redes de tráfico buscando ayuda para entrar clandestinamente. Es posible que muchas familias de bajos recursos no vean otra alternativa que vender a sus hijas para el comercio sexual.

Las mujeres y niñas que se ven forzadas a entrar al comercio sexual y quienes son sexualmente abusadas sufren una serie de problemas de salud. Más aún, las mujeres traficadas rara vez buscan atención médica porque temen ser deportadas, no cuentan con el dinero necesario o se les impide buscar atención.⁴¹ Tienen un alto riesgo de complicaciones e infertilidad debido a ITS no diagnosticadas ni tratadas, incluido el VIH/SIDA, y de complicaciones graves asociadas al embarazo y a los abortos realizados en condiciones de riesgo.⁴²

En regiones donde el tráfico es común, los proveedores de salud deben estar informados de la situación y ofrecer atención cuando sea posible. En general, los esfuerzos por detener el tráfico dependen de la cooperación internacional y nacional desde los más altos niveles de gobierno a los organismos comunitarios de servicio social, y entre las autoridades del área social, judicial, policial y de migración. Para mayor información sobre el tráfico, visite Stop-Traffic en www.stop-traffic.org.

¡Jijenge!: Mobilizando a las Comunidades en Tanzania

¡Jijenge! inició un proyecto piloto para desarrollar la conciencia de la comunidad sobre la violencia contra las mujeres en Igogo, una comunidad de bajos ingresos, semi-urbana de 4.000 familias en Mwanza, Tanzania.⁴³ Tras ganarse el apoyo de los líderes de la comunidad, el proyecto capacitó a los miembros de la comunidad a través de distintos medios, incluyendo discusiones en público, obras de teatro y programas radiales, y de material impreso. ¡Jijenge! reclutó y capacitó también a un “grupo de vigilancia” —conformado por hombres y mujeres de la comunidad— para intervenir cuando presenciaran violencia.

El proyecto operó en una clínica de salud reproductiva que ofrecía servicios y consejería para ayudar a las mujeres a identificar las causas de sus problemas de salud reproductiva. Este enfoque fue revolucionario en Mwanza, y las mujeres viajaban largas distancias para atenderse en la clínica. Mujeres y hombres comenzaron a buscar consejería con el personal, y los consejeros analizaron los derechos de las mujeres y ofrecieron derivaciones a estaciones de policía, organismos de bienestar social, hospitales y tribunales de justicia.

El programa ¡Jijenge! ha demostrado que:

- Las personas están dispuestas a discutir sobre la violencia contra las mujeres, e incluso a intervenir contra ella.
- Los mensajes anti-violencia funcionan mejor cuando son recibidos de diversas fuentes a lo largo del tiempo.
- Discutir la violencia en términos de promover la “armonía familiar” es más eficaz que el enfoque basado en los derechos.
- Para tratar el problema con los hombres, éstos deben ser abordados tanto en forma separada como en grupos mixtos.
- La promoción por parte de miembros influyentes de la comunidad resulta fundamental.
- Se debe sensibilizar a los proveedores de servicios sobre la violencia doméstica y entregarles herramientas para emprender acciones contra ella.
- El personal del proyecto y los voluntarios de la comunidad necesitan apoyo continuo y oportunidades para seguir adquiriendo habilidades.
- Todo cambio de conductas significativo toma tiempo.

Nacional de Mujeres Contra la Violencia, junto con la Fuerza Nacional de Policía, han sido los principales responsables de mejorar la coordinación institucional.³⁵

Como líderes comunitarios influyentes, los profesionales de salud —mujeres y hombres— tienen un importante papel que cumplir en la prevención de la violencia en la comunidad. Pueden ganar el apoyo de otros líderes de la comunidad (tales como líderes religiosos y políticos) y promover la “tolerancia cero” a la violencia en las relaciones. Conversar acerca de la prevalencia y sobre las consecuencias del abuso sobre la salud, y educar a la comunidad sobre sus derechos legales, sociales y humanos puede contribuir a cambiar actitudes, conductas y normas culturales. Tanto las personas que trabajan en salud como las organizaciones del área también pueden trabajar para modificar las políticas nacionales y locales que restringen los derechos de las mujeres, como por ejemplo eliminar las normas según las cuales se requiere el consentimiento del cónyuge para el uso de anticonceptivos. Resulta fundamental involucrar a los hombres en este esfuerzo.

Conclusión

El sector salud puede tener un importante impacto en hacer más visible el problema de la violencia contra las mujeres, en abordarlo y en disminuir los problemas de salud reproductiva asociados al abuso. Con capacitación y apoyo de los administradores de programas, los proveedores de salud pueden aprender a identificar y atender a las mujeres que han experimentado violencia. Para que las tareas de detección tengan frutos, los proveedores deben estar bien capacitados en cómo preguntar acerca del abuso y reaccionar ante éste, y estar preparados para ayudar a las sobrevivientes mediante tratamiento y derivación. También deben aprender a trabajar con organizaciones de otros sectores. Los esfuerzos coordinados y la creación de redes de derivación eficaces y sistemas de información pueden maximizar los recursos limitados.

Para modificar las conductas y actitudes de las personas respecto de la violencia se requiere de un compromiso a largo

plazo. El personal de salud de la comunidad y otros proveedores de salud influyentes pueden tomar la iniciativa de introducir una mayor conciencia y cambios en las conductas dentro de la comunidad. Pueden crear una respuesta comunitaria frente a la violencia, fomentando el debate, educando a los miembros de la comunidad acerca de los costos y consecuencias del abuso y realizando campañas de sensibilización sobre relaciones de pareja libres de violencia. Exponer abiertamente el problema y permitir el acceso de las personas vulnerables y marginadas a los servicios necesarios ayudará a romper el círculo vital de la violencia y a promover los derechos de las mujeres y niñas.

1. UN General Assembly. Declaration of the elimination of violence against women. Proceedings of the 85th Plenary Meeting. Geneva: UN (December 20, 1993).
2. Heise, L., et al. Ending violence against women. *Population Reports*, Series L, No. 11. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health, Population Information Program (December 1999).
3. Watts, C. and Zimmerman, C. Violence against women: global scope and magnitude. *The Lancet* 359(9313):1232–1237 (April 6, 2002).
4. Campbell, J. et al. Health consequences of intimate partner violence. *The Lancet* 359(9314):1331–1336 (April 13, 2002).
5. García-Moreno, C. et al. “Preliminary Results From the WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence.” Presentation at the World Conference on Injury, Montreal, Canada (May 2002).
6. WHO. Violence and Injury Prevention. www.who.int/health_topics/violence/en/. (Accessed September 19, 2002).
7. Finkelhor, C. The international epidemiology of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect* 18(5):409–417 (May 1994).
8. UNICEF and Innocenti Research Center. Early marriage child spouses. *Innocenti Digest* 7 (March 2001).
9. Frank, M. et al. Virginity examinations in Turkey. *Journal of the American Medical Association* 282(5):485–490 (August 4, 1999).
10. Diniz, S.G. and d’Oliveira, A.F. Gender violence and reproductive health. *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 63(Supplement 1):S33–S42 (1998).
11. Jewkes, R. Intimate partner violence: causes and prevention. *The Lancet* 359(9315):1423–1429 (April 20, 2002).
12. Ellsberg, M. et al. Candies in hell: women’s experiences of violence in Nicaragua. *Social Science & Medicine* 51:1595–1610 (2000).
13. Åsling-Monemi, K. et al. Violence against women increases the risk of infant and child mortality: a case-referent study in Nicaragua. *Bulletin of the World Health Organization* 78(1):105–112 (2000).

- Health Organization (forthcoming).
14. UN Department of International Economics and Social Affairs. *The World's Women: Trends and Statistics 1970-1990*. New York: UN (1991).
 15. UNFPA. Addressing obstetric fistula [fact sheet]. New York: UNFPA (April 2002).
 16. Serbanescu, F., Morris, L., and Marin, M. *Reproductive Health Survey Romania, 1999*. Atlanta, Georgia: Romanian Association of Public Health and Health Management (ARSPMS) and the Division of Reproductive Health, Centers for Disease Control and Prevention (September 2001).
 17. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000*. Lima: INEI (2001).
 18. WHO. *Female Genital Mutilation. Programmes to Date: What Works and What Doesn't*. WHO/CHS/WMH/99.5. Geneva: WHO (1999).
 19. Mohamud, A. et al. "Protecting and Empowering Girls: Confronting the Roots of Female Genital Cutting in Kenya." In: Haberland, N. and Measham, D., eds. *Responding to Cairo: Case Studies of Changing Practice in Reproductive Health and Family Planning*. New York: Population Council (2002).
 20. Jewkes, R. et al. Prevalence of emotional, physical and sexual abuse of women in three South African provinces. *South African Medical Journal* 91(5):421-428 (May 2001).
 21. Muhajarine, N. and D'Arcy, C. Physical abuse during pregnancy: prevalence and risk factors. *Canadian Medical Association Journal* 160(7):1007-1011 (April 6, 1999).
 22. Gazmararian, J.A. et al. Prevalence of violence against pregnant women. *Journal of the American Medical Association* 275(24):1915-1920 (June 26, 1996).
 23. Murphy, C. et al. Abuse: a risk factor for low birth weight? A systemic review and meta-analysis. *Canadian Medical Association Journal* 164(11):1567-1572 (May 29, 2001).
 24. Valladares, E. et al. Physical partner abuse during pregnancy is a risk factor for low birth weight: a case-referent study in Nicaragua. *Obstetrics and Gynecology* (forthcoming).
 25. Stevens, L. *A Practical Approach to Gender-Based Violence: A Programme Guide for Health Care Providers and Managers*. New York: UNFPA (2001).
 26. García-Moreno, C. Dilemmas and opportunities for an appropriate health-service response to violence against women. *The Lancet* 359(9316):1509-1514 (April 27, 2002).
 27. D'Avolio, D. et al. Screening for abuse: barriers and opportunities. *Health Care for Women International* 22:349-362 (2001).
 28. Waalen, J. et al. Screening for intimate partner violence by health care providers. *American Journal of Preventive Medicine* 19(4):230-237 (2000).
 29. Kim, J. and Motsei, M. "Women enjoy punishment": attitudes and experiences of gender-based violence among PHC nurses in rural South Africa. *Social Science & Medicine* 54:1243-1254 (2002).
 30. d'Oliveira, A. et al. Violence against women in health-care institutions: an emerging problem. *The Lancet* 359(9318):1681-1685 (May 11, 2002).
 31. Vlassoff, C. and García-Moreno, C. Placing gender in the center of health programming: challenges and limitations. *Social Science & Medicine* 54:1713-1723 (2002).
 32. Guedes, A. et al. "Addressing Gender Violence in a Reproductive and Sexual Health Program in Venezuela." In: Haberland, N. and Measham, D., eds. *Responding to Cairo: Case Studies of Changing Practice in Reproductive Health and Family Planning*. New York: Population Council (2002).
 33. Gielen, A.C. et al. Women's opinions about domestic violence screening and mandatory reporting. *American Journal of Preventive Medicine* 19(4):279-285 (2000).
 34. International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere (IPPF/WHR). *¡Basta!* New York: IPPF/WHR (Winter 2001). Available online at www.ippfwhr.org/whatwedo/bastawinter2001.pdf.
 35. Ellsberg, M. and Arcas, C. *Final Report: Review of PAHO's Project: Towards an Integrated Model of Care for Family Violence in Central America*. Washington, D.C.: PAHO (December 2001).
 36. IPPF/WHR. *¡Basta!* New York: IPPF/WHR (Summer 2000). Available online at www.ippfwhr.org/whatwedo/bastasummer2000.pdf.
 37. Creel, L. *Domestic Violence: An Ongoing Threat to Women in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: Population Reference Bureau (October 2001).
 38. Salber, R.R. and McCaw, B. Barriers to screening for intimate partner violence: time to reframe the question. *American Journal of Preventive Medicine* 19(4):276-278 (2000).
 39. Orhant, M. *Trafficking in Persons: Myths, Methods, and Human Rights*. Washington, D.C.: Population Reference Bureau (December 2001). Available online at www.prb.org.
 40. Beyrer, C. Shan women and girls and the sex industry in Southeast Asia; political causes and human rights implications. *Social Science & Medicine* 53:543-550 (2001).
 41. Orhant, M. and Murphy, E. "Trafficking in Persons." In: *Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly Reached*. Murphy, E. and Ringheim, K., eds. Washington, D.C.: PATH (2002).
 42. PAHO. Trafficking of women and children for sexual exploitation in the Americas [fact sheet]. Washington, D.C.: PAHO (July 2001).
 43. Michau, L. et al. "Mobilizing Communities to End Violence Against Women in Tanzania." In: Haberland, N. and Measham, D., eds. *Responding to Cairo: Case Studies of Changing Practice in Reproductive Health and Family Planning*. New York: Population Council (2002).

La redacción de este número estuvo a cargo de Barbara Shane y Mary Ellsberg. Como asistente de producción colaboró Kristin Dahlquist.

Además de los miembros seleccionados de la Junta Asesora de Outlook, las siguientes personas revisaron esta edición: Dr. C. García-Moreno, Dr. W. Im-em, Sra. N. Otoo-Oyortey, y Dra. L. Schraiber. Outlook agradece sus comentarios y sugerencias.

Outlook es publicado por PATH en inglés y francés y esta disponible en español, chino, indonesio, portugués y ruso. Outlook presenta noticias sobre productos para la salud reproductiva y decisiones sobre la regulación de drogas, de interés para los países en desarrollo.

El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva traduce, publica y distribuye la edición en español de Outlook. Las personas de ICMER a cargo de la traducción y producción de Outlook en español son Ana María Concha, Kane Sugiura y Ximena Toro.

Este número de Outlook cuenta con el financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates.

El contenido y las opiniones expresadas en Outlook no son necesariamente aquellas de sus patrocinadores, de los miembros de la Junta Asesora de Outlook, de PATH o del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

PATH es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud, especialmente la salud de las mujeres y los niños de los países en desarrollo.

Outlook se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un precio de US\$ 40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH.

Editora: Jacqueline Sherris, Ph.D.

PATH

1455 N.W. Leary Way
Seattle, Washington 98107 - 5136

Fono: 206 - 285 - 3500

Fax: 206- 285 - 6619

E-mail: outlook@path.org

URL: http://www.path.org/resources/pub_Outlook.htm

JUNTA ASESORA

- Giuseppe Benagiano, M.D., Director General, Instituto Nacional de Salud de Italia
- Gabriel Bialy, Ph.D., Asesor Especial, Contraceptive Development, National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU.
- Willard Cates, Jr. M.D., M.P.H., Presidente de Family Health International, EE.UU.
- Lawrence Corey, M.D., Prof. de Laboratorio Clínico, Medicina y Microbiología y Jefe Div. de Virología, Universidad de Washington, EE.UU.
- Horacio Croxatto, M.D., Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile
- Judith A. Fortney, Ph.D., Científica Principal, Family Health International, EE.UU.
- John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Dir. Med., Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido
- Atiqur Rahman Khan, M.D., Comité Asesor Nacional, UNFPA, Tailandia
- Louis Lasagna, M.D., Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University, EE.UU.
- Roberto Rivera, M.D., Director Corporativo para Asuntos Médicos Internacionales, Family Health International, EE.UU.
- Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Secretario General Adjunto, IPPF, Reino Unido
- Melvin R. Sikov, Ph.D., Científico Principal, Toxicología Experimental, Battelle Pacific Northwest Labs., EE.UU.
- Irving Sivin, M.A., Científico Principal, The Population Council, EE.UU.
- Richard Soderstrom, M.D., Prof. OB/GIN, Universidad de Washington, EE.UU.
- Martin P. Vessey, M.D., FRCP, FFCM, FRCGP, Prof., Dept. Salud Pública y Atención Primaria, Universidad de Oxford, Reino Unido.