

# Outlook

## Análisis sobre Métodos Anticonceptivos: DIU, Implantes y Anticonceptivos Orales

De los mil millones de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) en todo el mundo, más de la mitad usa alguna forma de anticoncepción (ver Figura 1, página 2). Sin embargo, en los países en desarrollo, más de 100 millones de mujeres tienen una “necesidad insatisfecha” de planificación familiar —comúnmente definida como el deseo expreso de prevenir o retrasar el embarazo— no obstante, debido a diversos obstáculos, no utilizan ninguna forma de anticoncepción. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) estima que entre los años 2000 y 2015, la demanda por anticoncepción aumentará aproximadamente en un 40 por ciento debido a una combinación de dos factores: el crecimiento de la población y el aumento de la proporción de parejas que usan métodos anticonceptivos. FNUAP pronostica que hacia el año 2050 la tasa total de fecundidad en los 49 países menos desarrollados disminuirá a 2,5 hijos por mujer.<sup>1</sup>

En los países en desarrollo, la proporción de parejas que usan métodos

anticonceptivos ha aumentado de un 10 por ciento en la década de los 60 a aproximadamente un 60 por ciento en la actualidad. No todos/as los/as usuarios/as de métodos anticonceptivos son iguales y no existe un único método anticonceptivo que sea adecuado para todos/as. Para aumentar la prevalencia anticonceptiva es fundamental que los programas de planificación familiar garanticen el acceso a una amplia gama de métodos. Esto permite a hombres y mujeres escoger los métodos que mejor satisfagan su necesidad de espaciar el nacimiento de sus hijos o de limitar la cantidad de embarazos durante su edad reproductiva.

Aun cuando el suministro de anticonceptivos sea adecuado en cuanto a cantidad y variedad, persisten los obstáculos frente a su uso. Entre éstos se incluyen la calidad de la atención y los servicios, los costos, el acceso (especialmente para los grupos marginados), y las inquietudes y temores que se asocian al uso de algunos métodos anticonceptivos. A menudo influidos por información no actualizada o rumores, proveedores y clientes pueden desconfiar innecesariamente de un anticonceptivo en particular y, por lo tanto, descartar la posibilidad de usarlo. Los proveedores y los consejeros deben disponer de la información más actualizada a fin de abordar las inquietudes de sus clientes de la mejor manera posible (ver cuadro de texto sobre Georgia, página 2).

Este número de *Outlook* aborda las tendencias, los avances y las mejoras de varios métodos anticonceptivos reversibles clave —DIU, implantes hormonales y píldoras anticonceptivas— y examina dos nuevas opciones: el parche anticonceptivo hormonal y el anillo vaginal. Además, sirve de complemento al *Outlook*, Vol 20, N° 2 (Junio, 2003) en el que se presentó un análisis de los métodos de barrera femeninos en la anticoncepción y la prevención del VIH. El condón femenino y masculino, componentes clave en la intersección de los programas de planificación familiar y prevención del VIH, constituyen un tema que se abordará en un próximo número de *Outlook*, lo mismo que la esterilización voluntaria.


### Tendencias en el uso de anticonceptivos: la gama de métodos disponibles es clave

El método anticonceptivo más usado a nivel mundial es la esterilización femenina. Los métodos que le siguen en cuanto a popularidad en las regiones en desarrollo son: el dispositivo intrauterino (DIU) y los

## En este número

- Tendencias
- Los DIU: métodos subutilizados
- Implantes: más opciones
- Anticonceptivos orales
- Nuevas opciones: el parche y el anillo

Figura 1. Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que actualmente usan anticonceptivos, 2003.



anticonceptivos orales (ver Figura 2, página 3). No obstante, la disponibilidad y el uso de anticonceptivos varían ampliamente según región y país. Por ejemplo, es más probable que las mujeres de África subsahariana confíen en los anticonceptivos orales o en los métodos tradicionales que las mujeres de América Latina y Asia. En Asia, el DIU se usa en mayor proporción que en América Latina; la esterilización se usa comúnmente en ambas regiones.<sup>2</sup>

Una apropiada gama de métodos anticonceptivos económicamente accesi-

bles, seguros y eficaces es aquella que incluye métodos de corto y largo plazo, que satisfacen las necesidades de mujeres y hombres a lo largo de sus años reproductivos. Aumentar la opción de métodos anticonceptivos constituye un componente fundamental de un programa de planificación familiar de buena calidad. La disponibilidad y la oferta de una amplia gama de anticonceptivos están estrechamente relacionadas con el uso, con tasas de continuación más altas, y con la prevalencia anticonceptiva total.<sup>4</sup> Cada método que se incorpora a la gama de métodos

anticonceptivos atrae a un segmento de la población, incluidas las parejas que no están usando los métodos que ya se encuentran disponibles.

### Los DIU: subutilizados en muchos países

La investigación presenta evidencia clara de que el DIU es una opción anticonceptiva altamente segura y eficaz para ser usada en el mediano y largo plazo. Sin embargo, su aceptación por parte de clientes y proveedores varía considerablemente entre un país y otro. Difundir ampliamente las pruebas existentes sobre su seguridad y eficacia puede ayudar a mitigar las inquietudes de proveedores y clientes respecto del DIU y aumentar el acceso a este método subutilizado.

Existen diferentes tipos de DIU disponibles en todo el mundo, incluidos los dispositivos inertes, el DIU de cobre y los sistemas liberadores de progestágeno (ver sección sobre Mirena, página 3). Los expertos en el área ya no recomiendan el uso de DIU inertes; no obstante, sugieren que si las usuarias actuales están satisfechas con el método no hay necesidad de extraerles el dispositivo.<sup>5</sup> También aconsejan que no se deben usar los antiguos DIU de cobre como la T200 y el dispositivo 7 con cobre. Existe una amplia gama de DIU de cobre disponibles a nivel internacional; el DIU de cobre T380A (también conocido como TCu380A o la T de cobre) es el más eficaz y el más ampliamente utilizado en todo el mundo.<sup>5</sup> En un estudio aleatorizado

### Care for Each Other: campaña para mejorar los servicios de salud reproductiva en Georgia

Los programas que buscan disminuir las necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción deben enfocarse tanto en los proveedores como en los clientes, de modo de mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva. El Centro para Programas de Comunicación de la Universidad de Johns Hopkins (JHU/CCP) inició uno de estos esfuerzos en Georgia en el año 2000: la campaña *Care for Each Other* (Cuidarse unos a otros).<sup>8</sup>

Como ocurrió en muchos países de Europa del Este y Eurasia luego de la disolución de la Unión Soviética, Georgia tuvo una baja tasa de nacimientos, una baja tasa de uso de anticonceptivos y una alta tasa de abortos. La falta de información, la deficiente calidad de los productos y la disponibilidad inestable mantuvieron baja la demanda por métodos anticonceptivos modernos. El sesgo de los proveedores y los temores generalizados de los/as clientes/as respecto de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales aumentaron la preferencia por el aborto en lugar de los anticonceptivos de uso regular.

Los objetivos de la campaña *Care for Each Other* incluyeron: el aumento del uso de centros de atención en salud reproductiva como centros de planificación familiar, y elevar la demanda por métodos anticonceptivos modernos. Especialistas ofrecieron a los proveedores capacitación en provisión de servicios y consejería en planificación familiar, así como actualizaciones sobre tecnología anticonceptiva. La campaña produjo material informativo para clientes y proveedores acerca de la salud de la mujer, la planificación familiar y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Junto con la promoción en los medios de comunicación, la campaña utilizó su logo en afiches, en las clínicas y en prendedores que permitían identificar a los proveedores y los lugares que ofrecen los servicios mejorados. Finalmente, el programa puso en funcionamiento una línea de información telefónica para que todas las mujeres de Georgia, incluidas las que no podían acudir a un proveedor de servicios, contaran con la información necesaria que les permitiera tomar decisiones sobre anticonceptivos.

Una encuesta de evaluación reveló los avances de la campaña de tres años llevada a cabo en Georgia. El uso de anticonceptivos modernos entre mujeres casadas en Tbilisi aumentó del 25 por ciento en el año 2000 al 37 por ciento en el 2002.

Al mismo tiempo, la tasa de abortos en el mismo grupo disminuyó del 45 por ciento al 28 por ciento. Además, la asistencia a la clínica aumentó en seis veces, lo que indica un mayor conocimiento de los servicios de salud reproductiva por parte de las clientas y confianza en las habilidades del proveedor.

de largo plazo, la TCu380A tuvo una tasa acumulativa de embarazo de 2,2 por cada 100 mujeres después de 12 años de uso. En el primer año de uso las tasas de fallo se encuentran generalmente bajo el 1 por ciento.<sup>5</sup> Las tasas de embarazo observadas con la TCu380A son al menos tan bajas como las tasas observadas entre las mujeres esterilizadas en los Estados Unidos,<sup>6,7</sup> lo que convierte al DIU en una opción reversible muy eficaz de largo plazo.

### La mayoría de las mujeres puede usar DIU

Los Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que el DIU de cobre es una opción segura para muchas mujeres en diversas condiciones.<sup>9</sup> Aquellas mujeres para quienes no es recomendable el uso de métodos hormonales —mujeres que fuman, que tienen la presión alta o diabetes, o que están amamantando— pueden usar de manera segura el DIU de cobre. La inserción del dispositivo puede realizarse de manera segura en el período postparto, postaborto o en mujeres que estén amamantando. Además, los DIU pueden ser usados por mujeres nulíparas y mujeres menores de 20 años sin que se vea afectada su fertilidad futura,<sup>10-12</sup> aunque el riesgo de expulsión es mayor entre estas mujeres. Finalmente, la práctica relativamente común de aplazar la inserción del DIU hasta que la mujer presente su menstruación no es necesaria, siempre y cuando se sepa que no está embarazada. Algunas herramientas, como la lista de verificación para proveedores de Family Health International, pueden ayudar a los proveedores a evaluar el riesgo de embarazo de las clientas.<sup>13</sup>

### Obstáculos frente al uso del DIU


¿Por qué en muchos países el uso del DIU se ubica por debajo del uso de otros métodos anticonceptivos? Los obstáculos frente al uso del DIU incluyen el sesgo por parte de clientes y proveedores respecto de la seguridad del método; el limitado número de proveedores debidamente capacitados y que se sienten seguros respecto de sus habilidades para insertar el dispositivo; el acceso restringido a técnicas asépticas; las inquietudes respecto de la asociación entre el DIU y las ITS/VIH; y el costo, especialmente en términos de tiempo y esfuerzo para los proveedores, de insertar un DIU. En algunas comunidades, los costos asociados pueden representar un gran obstáculo para los programas y los/as clientes/as.<sup>14</sup> Por ejemplo, en Kenya, una

mujer que vive en una zona urbana puede pagar hasta 100 - 200 chelines (US\$ 1,28-2,56) por la inserción de un DIU, en comparación con los 10-50 chelines que paga por un paquete de píldoras anticonceptivas o una inyección de Depo-Provera. No obstante, aproximadamente un año después de la visita inicial, el costo acumulativo anual de las píldoras y las inyecciones excede ampliamente el costo único de la inserción del DIU, lo que hace de este método uno de los más costo-efectivos entre los que se encuentran disponibles.<sup>15</sup>

**Temores.** A pesar de que durante aproximadamente 15 años se ha comprobado la seguridad del DIU, aún persisten el sesgo por parte de los proveedores, las inquietudes relacionadas con la seguridad y los temores de las clientas. Algunas inquietudes respecto de los potenciales efectos secundarios, como el aumento del sangrado y los calambres menstruales, se basan en información precisa. Otras no; tal es el caso del temor a que el DIU pueda salirse del útero, pueda provocar cáncer, infertilidad o incluso la muerte; y en caso de embarazo, que se incruste en el cuerpo del bebé.<sup>16-18</sup> Otra idea errónea consiste en creer que el DIU actúa previniendo la implantación de un óvulo fecundado; la mayoría de las investigaciones sugiere que, de hecho, el principal mecanismo de acción del DIU es la prevención de la fecundación. La consejería puede aliviar o contextualizar estas inquietudes, ofreciendo información precisa que permita a las clientas hacer una nueva evaluación de los riesgos.

**Efectos secundarios.** La principal desventaja de los DIU de cobre es el aumento en la incidencia del sangrado menstrual prolongado o abundante, de los calambres y del goteo intermenstrual. Estos efectos secundarios generalmente disminuyen después de los primeros meses de uso. Otra consideración es la posibilidad de expulsión accidental del DIU, que por lo general es mayor entre las mujeres jóvenes o nulíparas durante los primeros meses de uso del dispositivo. Se están evaluando nuevos modelos de DIU más pequeños diseñados específicamente para las mujeres nulíparas.<sup>19</sup> Finalmente, aún existen inquietudes en lo que respecta a la relación

Figura 2. Uso de anticonceptivos en mujeres casadas en países en desarrollo, finales de los años 90



del DIU con la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), a pesar de que la evidencia sugiere que no hay riesgos adicionales (ver recuadro, página 4).

Anteriormente, el uso de DIU no se recomendaba a las mujeres infectadas con el VIH.<sup>9</sup> No obstante, la información de un estudio realizado en Kenya sugiere que las mujeres infectadas con el VIH podrían usar el DIU de manera segura sin que aumente la frecuencia de las complicaciones o su gravedad.<sup>21</sup> Del mismo modo, las pautas de la OMS recientemente revisadas establecen que las mujeres infectadas con VIH por lo general pueden usar un DIU si la infección no ha evolucionado a SIDA. Las mujeres que padecen SIDA y que actualmente están usando un DIU por lo general pueden continuar haciéndolo, a pesar de que no se recomienda la inserción de un DIU en aquellas mujeres con SIDA que no estén recibiendo tratamiento (a menos que no existan otros métodos disponibles o apropiados).<sup>9</sup> Es necesario realizar más investigación para confirmar la seguridad del DIU a largo plazo cuando es usado por mujeres infectadas con VIH.<sup>11</sup>

### DIU liberador de levonorgestrel (Mirena)

El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNg), conocido comúnmente por el nombre comercial de Mirena, es incluso más eficaz que la TCu 380A, ya que proporciona un nivel de eficacia igual o mayor que los implantes Norplant y la esterilización. Con el uso de Mirena se ha informado una tasa de

embarazo de 0,1 por 100 años/mujer en un año con una tasa acumulativa de 0,7 por 100 años/mujer luego de 5 años de uso. Mirena ha sido aprobado para 5 años de uso, pero algunos estudios sugieren que podría ser eficaz hasta por 7 años.<sup>22</sup> Actualmente se encuentra disponible en más de 50 países.

Las tasas de reacciones adversas asociadas a Mirena, como la EPI y la expulsión, son bajas y comparables a —si es que no menores— a las tasas informadas por las usuarias de TCu380A. Muchas mujeres experimentan goteo o sangrado intermenstrual durante el primer mes luego de la inserción del DIU; este efecto secundario tiende a desaparecer con el tiempo.<sup>23</sup> En términos generales, la liberación continua de progestina reduce notablemente el sangrado y el dolor menstrual en comparación con la TCu380A.

En un estudio en el que 160 mujeres usaron Mirena, 89 experimentaron amenorrea (sangrado escaso o falta de menstruación) en algún momento durante los 36 meses de uso; 75 de estas mujeres experimentaron el cese completo de la menstruación a partir del momento de la inserción del dispositivo.<sup>23</sup> La amenorrea puede hacer que las mujeres se preocupen y piensen que el método ha fallado y que podrían estar embarazadas. Una consejería apropiada sobre las irregularidades

menstruales y la amenorrea asociadas al uso de Mirena podría aumentar la aceptación, la continuación y la satisfacción con el método por parte de las usuarias, así como calmar sus inquietudes respecto de la falla del método.<sup>24</sup>

### Implantes anticonceptivos: más opciones

Han transcurrido aproximadamente 15 años desde que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los EE.UU. aprobó por primera vez el implante anticonceptivo Norplant. Hoy en día existen al menos cinco implantes anticonceptivos disponibles o en desarrollo (ver Tabla 1, página 5). Todos actúan mediante un mecanismo similar: liberan una dosis continua de progestágeno sintético a través de una o más cápsulas pequeñas que son insertadas bajo la piel del brazo de la mujer. Los implantes están hechos de silicona o de plástico. Su eficacia puede durar hasta siete años, dependiendo de su configuración. Debido a que los implantes contienen progestágeno solo, los criterios médicos de elegibilidad para su uso son más amplios que para los anticonceptivos hormonales combinados de estrógeno/progestágeno. Existen muy pocas restricciones para el uso de anticonceptivos sólo de progestágeno, como por ejemplo los implantes, los

inyectables Depo Provera y Net-En, y las píldoras sólo de progestágeno.

Norplant, un implante compuesto por seis cápsulas y aprobado para ser usado por cinco años, es extremadamente eficaz en la prevención del embarazo (0,1 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso). Algunos estudios revelaron que su eficacia era comparable a la de la esterilización y a la del DIU de cobre; asimismo, indicaron un bajo riesgo de problemas graves para la salud.<sup>29</sup> A pesar de que la introducción del Norplant se llevó a cabo con mucho cuidado, el método recibió tempranamente muchas críticas programáticas relacionadas con su introducción, inserción y extracción. La capacitación de los proveedores, la prevención de infecciones y la consejería sobre efectos secundarios son elementos que mejoran la calidad de la provisión de los servicios de implantes anticonceptivos. El sucesor de Norplant, Jadelle, es un sistema de dos varillas diseñado para proporcionar la misma eficacia anticonceptiva (hasta por cinco años), pero su inserción y extracción resultan más rápidas y sencillas. Un tercer modelo de implante, Implanon, consiste en un dispositivo de una sola varilla aprobado para ser usado por tres años. La evidencia disponible sugiere que es tan seguro y eficaz como los otros implantes que se encuentran en el mercado. La delgada varilla de Implanon se inserta con un aplicador especial. Esta técnica es diferente a la de Norplant y Jadelle, por lo tanto, los programas de planificación familiar que cambian de un sistema a otro requerirán de capacitación adicional para sus proveedores a fin de garantizar calidad en la provisión del servicio.

Nestorone, que es un implante de una sola varilla que libera la hormona sintética nestorona; está siendo desarrollado por Population Council. La FDA de los EE.UU. aún no ha aprobado la nestorona. No obstante, hay estudios que indican que es segura y eficaz para ser usada como anticonceptivo hasta por 2 años.<sup>30</sup> Evidencia preliminar revela que el progestágeno nestorona es un esteroide inactivo cuando es administrado por vía oral. Es por ello que se está evaluando su idoneidad como anticonceptivo para mujeres que están amamantando. Norplant, Jadelle e Implanon contienen esteroides que permanecen activos si son ingeridos por el lactante y podrían tener efectos negativos en su crecimiento y desarrollo.<sup>31</sup>

Elcometrina es un implante de una sola cápsula que contiene nestorona y que en 1998 fue registrado para ser usado en Brasil por el Programa de Cooperación Sur-Sur

## El DIU y la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)

Con el paso de los años, datos de estudios observacionales han revelado una relación entre la inserción del DIU y la EPI. No obstante, análisis adicionales revelan que estos estudios presentaban típicamente grupos de comparación y estándares de diagnóstico inapropiados, además de otros factores de confusión que han dado origen a estimaciones incorrectas acerca del riesgo de EPI asociado al uso del DIU.<sup>12</sup> Por otro lado, datos de estudios aleatorizados controlados que compararon varios tipos de DIU revelaron resultados tranquilizadores. Un análisis de 12 estudios aleatorizados que compararon varios DIU recopiló datos de 22.908 inserciones de DIU y de 51.399 años mujer de seguimiento, y reveló que la tasa de EPI entre todas las usuarias de DIU fue de 1,6 casos por cada 1.000 años mujer de uso. Es más, el riesgo de padecer EPI es más alto en los primeros 20 días después de la inserción, y luego disminuye y permanece sistemáticamente bajo —a un nivel comparable al de la población general— hasta por 8 años.<sup>25</sup>

Toda mujer que tenga gonorrea o clamidia presenta un mayor riesgo de desarrollar EPI. Los investigadores se han cuestionado si la inserción de un DIU en presencia de una infección cervical podría aumentar el riesgo de EPI al introducir la infección dentro del útero.<sup>26</sup> De hecho, el riesgo de EPI atribuible a la inserción de un DIU es del 0,15 por ciento.<sup>27</sup> Un cambio reciente en las pautas de elegibilidad médica de la OMS sugiere que incluso en comunidades donde la prevalencia de ITS es alta, por lo general se puede recomendar el uso de DIU a la mayoría de las mujeres, excepto a quienes presentan un “muy alto riesgo individual de exposición” a la gonorrea y la clamidia.<sup>9</sup>

Finalmente, los investigadores también han analizado el uso de antibióticos profilácticos al momento de la inserción del DIU con el objetivo de reducir el riesgo de EPI. En general, el uso de antibióticos profilácticos en usuarias de DIU no ha demostrado ser una práctica costo-efectiva. El riesgo de EPI es tan bajo que el uso de profilácticos o antibióticos no es necesario ni se justifica.<sup>28</sup>

de Salud Reproductiva. Como en el caso de Nestorone, se están llevando a cabo estudios para determinar su potencial como método anticonceptivo seguro para madres que están amamantando.<sup>32</sup>

### Obstáculos frente al uso de implantes

Además del costo del producto y la provisión del servicio —que también pueden representar un importante obstáculo— muchas potenciales usuarias tienen inquietudes respecto de las consecuencias de usar implantes. Algunas de estas inquietudes son producto de rumores e ideas erróneas; otras se basan en efectos secundarios reales. Al evaluar las necesidades particulares de las clientas, los proveedores deben describir de manera precisa la seguridad y la eficacia de un método anticonceptivo, incluidos sus efectos secundarios y posibles complicaciones.

A las mujeres que están evaluando el uso de un implante podrían preocuparles las dificultades asociadas a la extracción, a la recuperación tardía de la fertilidad, y a la anomalía de los períodos menstruales.<sup>33,34</sup> En primera instancia, la dificultad en la extracción del Norplant a menudo está relacionada con una inserción inapropiada o con la falta de capacitación adecuada por parte del proveedor. Los

modelos más nuevos, que utilizan menos varillas o cápsulas, hacen que la inserción y la extracción sean más sencillas. A pesar de que la extracción de un implante resulta un poco más difícil que su inserción, un proveedor entrenado es capaz de extraerlo en cualquier momento que la clienta lo desee. Garantizar el acceso a proveedores capacitados en la extracción de implantes según lo requieran las mujeres es fundamental para la aceptación del método.

Se puede tranquilizar a las clientas que se sientan preocupadas respecto de cuán pronto pueden embarazarse después de usar un implante, diciéndoles que en la mayoría de las mujeres la fertilidad se recupera inmediatamente. La menstruación normal se presentará aproximadamente en un mes; algunas veces puede adelantarse o retrasarse. Para las mujeres que desean prevenir el embarazo, es necesario el uso de un método anticonceptivo alternativo inmediatamente después de extraer el implante.<sup>35</sup>

El tercer aspecto—que representa el principal motivo de preocupación para algunas clientas—es el sangrado irregular que muchas usuarias experimentan (común entre las usuarias de todos los métodos anticonceptivos sólo de progestina). Las mujeres que usan Norplant y Jadelle frecuentemente manifiestan tener sangrados menstruales abundantes, prolongados,

o irregulares durante el primer año de uso. Estos problemas tienden a disminuir con el uso, y hay estudios que sugieren que la pérdida mensual total de sangre por lo general no es mayor a la cantidad de sangre que se pierde en una menstruación normal. No obstante, en un estudio post-introducción que duró cinco años 13,7 por ciento de las mujeres que discontinuaron el uso de Norplant mencionaron problemas relacionados con el sangrado.<sup>29</sup>

Por otro lado, Implanon está mucho más asociado a la amenorrea o al sangrado poco frecuente.<sup>35</sup> Las investigaciones sugieren que hasta el 50 por ciento de las usuarias de Implanon experimentan menstruaciones poco frecuentes o amenorrea durante los primeros tres meses de uso.<sup>36</sup> Los sangrados menstruales irregulares o prolongados pueden perturbar la vida de las mujeres, especialmente en aquellas culturas que prohíben a la mujer participar en actos sociales o religiosos cuando está menstruando y donde no se cuenta con los recursos para mantener una adecuada higiene durante la menstruación. Por esta razón, la amenorrea tiende a ser mejor tolerada que el sangrado irregular o prolongado.<sup>37</sup> La consejería durante la visita inicial es fundamental para que la clienta pueda tomar una decisión informada sobre un método anticonceptivo.

Tabla 1. Implantes anticonceptivos

Dispositivo (Institución que lo desarrolló)	Diseño	Hormona	Duración de la Eficacia	Disponibilidad	Comentarios
Norplant (Population Council)	6 cápsulas	Levonorgestrel	Aprobado por la FDA de los EE.UU. para ser usado por 5 años	Más de 60 países	Usado actualmente por más de seis millones de mujeres. La investigación indica una eficacia hasta por 7 años.
Jadelle (Population Council)	2 varillas	Levonorgestrel	Aprobado en 11 países para ser usado por 5 años; aprobado en Indonesia y Tailandia para ser usado por 3 años <sup>38</sup>	13 países; proceso de inscripción en 30 más	La inserción y extracción son más sencillas que en el caso del Norplant (2 varillas en lugar de 6 cápsulas).
Implanon (Organon)	1 varilla	Etonogestrel	Aprobado por la FDA de los EE.UU. para ser usado por 3 años	Más de 40 países	Se inserta mediante un aplicador especial (es necesario entregar capacitación adicional al proveedor).
Nestorone (Population Council)	1 varilla	Nestorona	La investigación indica que 2 años <sup>29</sup>	En desarrollo	Se están realizando investigaciones para determinar si Nestorone puede ser usado por mujeres que están amamantando).
Elcometrina (Programa de Cooperación Sur-Sur de Salud Reproductiva)	1 cápsula	Nestorona	La investigación indica que 6 meses <sup>32</sup>	Brasil	También se investiga su uso en mujeres que están amamantando (ver más arriba).

Nota: En China se fabrica y comercializa variaciones de Norplant y Jadelle con el nombre de Sino-implant Domestic N° 1 y Sino-implant Domestic N° 2, respectivamente.<sup>32</sup>

Fuente: Adaptado de la OMS 2003.<sup>39</sup>

## Anticonceptivos orales combinados

Las píldoras anticonceptivas orales combinadas (AOC) han estado en el mercado a nivel internacional por casi 40 años. Los AOC que actualmente se distribuyen en la mayoría de los países contienen menores dosis de hormonas que las primeras píldoras de dosis alta. Sin embargo, son igualmente eficaces y presentan menos contraindicaciones y efectos secundarios. Si son tomados de manera correcta y sistemática (todos los días a la misma hora), su tasa de fallos es menor al 1 por ciento en el primer año de uso. Con el uso típico, la tasa de fallos aumenta a 6 – 8 por ciento en el primer año. Los embarazos debido al uso incorrecto o no sistemático de la píldora continúan siendo un problema. Las mujeres que optan por los AOC deben recibir consejería sobre cómo usarlos de manera correcta.

El riesgo de apoplejía o de infarto cardíaco disminuye considerablemente con los AOC de dosis baja (en comparación con las primeras píldoras de dosis alta). No obstante, su uso está contraindicado para mujeres fumadoras mayores de 35 años, con presión alta o diabetes, que presenten antecedentes de trombosis venosa idiopática (coágulos de sangre) o que estén amamantando.

Las mujeres para las cuales el uso de AOC es apropiado pueden escoger también anticonceptivos inyectables combinados como Cyclofem y Mesigyna (los que, al igual que los AOC, contienen estrógeno y progestina). Tienen contraindicaciones similares a las de los AOC, pero pueden tener menos efectos secundarios.<sup>9</sup> Los inyectables combinados se administran una vez al mes, lo que disminuye el riesgo de incumplimiento asociado a tener que tomar una píldora todos los días.

### Temores, efectos secundarios, riesgos y beneficios

A pesar del mejoramiento de los anticonceptivos orales, aún abundan mitos y temores relacionados con su uso. Es posible que a las mujeres les preocupe que los AOC puedan causar defectos de nacimiento, cáncer de mama u otros tipos de cáncer. Los proveedores deben tranquilizar a las clientas diciéndoles que los AOC de dosis baja no provocan defectos de nacimiento ni aumentan el riesgo a largo

plazo de padecer cáncer de mama. Al parecer en el caso de las mujeres con infecciones persistentes por virus del papiloma humano (VPH), el uso prolongado de AOC contribuye a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer cervical (aunque se cree que el número de casos de cáncer cervical que se presentan como resultado del uso prolongado de AOC a largo plazo es muy pequeña).<sup>40</sup>

Otras inquietudes comunes incluyen la creencia de que los AOC pueden provocar infertilidad, que las hormonas se acumulan en el cuerpo de la mujer o que la mujer debe “descansar” de las píldoras anticonceptivas periódicamente. La investigación demuestra que ninguna de estas inquietudes constituye un riesgo real. La fertilidad se recupera rápidamente después de discontinuar el uso de los AOC; la ovulación se reanuda dentro de una o dos semanas. Las hormonas presentes en los AOC no se acumulan en una mujer sana que no padece enfermedad renal o

hepática. “Descansar de las píldoras” era una práctica recomendada en los años 60, cuando los métodos hormonales recién estaban siendo introducidos. No obstante, el dejarlos no trae beneficios para la salud o la fertilidad y el

Ninguno de los métodos anticonceptivos analizados en este artículo protege de las ITS o del VIH.

riesgo de que ocurra un embarazo no planificado aumenta considerablemente.<sup>41-43</sup>

Las clientas deben recibir consejería sobre los efectos secundarios reales de los AOC: sangrados irregulares esporádicos entre los períodos y, rara vez, náuseas (también durante los primeros meses de uso). Los proveedores también deben informar a las mujeres sobre los riesgos. Incluso con las píldoras de formulación estándar de dosis baja, las usuarias enfrentan un riesgo tres veces mayor de formar coágulos en comparación con las mujeres que no son usuarias. No obstante, la frecuencia de coágulos es poco común, por lo tanto el riesgo absoluto es mínimo. Al tomar decisiones respecto de un método anticonceptivo, las clientas deben estar conscientes de los beneficios no anticonceptivos del uso de AOC. Entre éstos se incluye la menor incidencia de quistes mamarios no cancerígenos, menos trastornos menstruales, y protección contra los embarazos ectópicos, el cáncer ovárico

y endometrial, y la anemia por deficiencia de hierro.

### Anticonceptivos orales de ciclo prolongado

En septiembre de 2003, la FDA de los EE.UU. aprobó Seasonale, un régimen prolongado de píldoras anticonceptivas orales. Fue desarrollado para aquellas mujeres que prefieren menstruar con menor frecuencia (por conveniencia o para reducir el dolor y las incomodidades). Las hormonas que contiene Seasonale (levonorgestrel y etinil estradiol) no son nuevas, pero este nuevo régimen permite a las mujeres tomar las píldoras por 84 días consecutivos, seguidos por 7 días en que toman píldoras inactivas. Así las mujeres reducen la cantidad de ciclos menstruales de uno al mes a uno cada tres meses. Datos de un estudio clínico indican que durante el ciclo inicial de 84 días, las usuarias de Seasonale experimentan más sangrados irregulares que las mujeres cuyo ciclo dura 28 días. Este sangrado irregular disminuyó con cada ciclo, hasta que alcanzó niveles comparables a los del régimen estándar de AOC.<sup>44</sup>

### Nuevas opciones en anticoncepción hormonal

Los investigadores continúan trabajando en nuevas formulaciones de anticonceptivos hormonales y sistemas liberadores de hormonas con el objetivo de hacer su uso más sencillo para las mujeres. A continuación se describen dos métodos altamente eficaces. Tienen las mismas contraindicaciones que otros métodos hormonales combinados.

### Anillo anticonceptivo vaginal

En octubre del año 2001, Organon International recibió de la FDA la aprobación para su producto NuvaRing—un anillo anticonceptivo vaginal que libera continuamente una combinación de estrógeno y progestina en dosis baja. El anillo, delgado y flexible, se inserta en la vagina por un período de tres semanas seguidas y luego es desechado. Una semana después se inserta un nuevo anillo. El sangrado menstrual regular se presenta típicamente durante la semana en que no hay anillo. A pesar de que no se han llevado a cabo estudios clínicos aleatorizados, un estudio multicéntrico del anillo anticonceptivo reveló que su seguridad y eficacia eran comparables a las de los AOC. Introducido primeramente en Europa, NuvaRing actualmente se encuentra disponible en 11 países y tiene un valor de US\$30 – 35.

La ventaja del anillo recae en lo sencillo que es usarlo. No es necesario que la inserción y la extracción sean realizadas por un proveedor y, una vez insertado, el

anillo no requiere atención diaria. Las reacciones adversas más comunes informadas durante el primer año por las mujeres que usaron el anillo fueron dolor de cabeza (5,8%), vaginitis (5,6%), flujo vaginal (4,8%) y problemas

relacionados con el producto, como la expulsión del anillo o sentirlo durante la relación sexual (4,4%). En total, el 15,1 por ciento de las mujeres discontinuaron el uso debido a estos y a otros efectos secundarios.<sup>45</sup>

### Parche transdérmico

Una nueva forma de anticonceptivo hormonal ofrece a las mujeres una modalidad conveniente que consiste en la aplicación semanal de un parche transdérmico. Según los expertos del área de la salud, este novedoso anticonceptivo disminuirá los errores que cometen las clientas, como olvidarse de tomar los AOC todos los días. El parche anticonceptivo fabricado con el nombre de OrthoEvra (Ortho-McNeil Pharmaceuticals) es un pequeño y delgado plástico adhesivo de forma cuadrada que la mujer coloca una vez a la semana en su brazo, hombro, torso, abdomen o en una nalga. Durante siete días libera de manera continua dosis bajas de estrógeno y progesterina a través de la piel hacia el torrente sanguíneo, luego de los cuales la mujer retira el parche y lo reemplaza por uno nuevo. Se aplica un parche a la semana por tres semanas consecutivas durante el ciclo. En la cuarta semana, la semana sin parche, se presenta la menstruación.

Estudios aleatorizados que compararon el parche con los AOC revelaron que ambos métodos tienen tasas de eficacia similares.<sup>46</sup> Las usuarias del parche manifestaron un mayor cumplimiento del tratamiento que las usuarias de AOC, probablemente debido a lo sencillo de su uso.<sup>46,47</sup> En los primeros ciclos en que usaron el parche, las mujeres presentaron

más sangrados intermenstruales y goteo que las usuarias de AOC, aunque esta diferencia desapareció en el tercer ciclo. También experimentaron más dolores de cabeza, hipersensibilidad en las mamas y dismenorrea que el grupo AOC. El 20 por ciento de las mujeres presentó irritación en la zona de la piel alrededor del parche, pero sólo el 2,6 por ciento de las que discontinuaron el uso manifestaron que la causa fue la irritación de la piel.<sup>46</sup> El costo del parche (aproximadamente US\$36) aún no está subsidiado por el sector público, lo que lo ubica, al igual que el anillo vaginal, fuera del alcance de muchas mujeres en los países en desarrollo.

### Conclusión

Los mecanismos anticonceptivos básicos disponibles han cambiado muy poco en las últimas décadas. Los investigadores se han centrado en reducir los efectos secundarios y mejorar los sistemas de provisión de servicios, a fin de que los nuevos métodos anticonceptivos sean más convenientes y aceptables tanto para clientes como para proveedores. La investigación sobre métodos anticonceptivos reversibles y de largo plazo—como los DIU de cobre, los que liberan levonorgestrel y los implantes de nueva generación—ha producido métodos que ofrecen a las clientas una protección altamente eficaz. Los avances en los implantes, particularmente, han mejorado las técnicas de inserción, lo que ha aumentado la seguridad para las clientas y la eficiencia de los proveedores. Los anticonceptivos más nuevos, como el parche anticonceptivo y el anillo vaginal, están diseñados para aumentar la eficacia, el cumplimiento y la continuación de uso, ofreciendo a las clientas métodos menos

dependientes de los proveedores y que no requieren el uso de regímenes diarios de píldoras. Estos cambios han expandido la gama de métodos anticonceptivos, agregando más opciones para mujeres y hombres que desean limitar o espaciar los embarazos.

No todas las personas se han visto beneficiadas actualmente por estos nuevos avances.

Importantes obstáculos financieros, geográficos y de provisión de servicios a menudo limitan el suministro y el acceso a nuevos métodos anticonceptivos en los países en desarrollo. Es necesario aunar esfuerzos para aumentar la disponibilidad de métodos así como para garantizar que clientes y proveedores cuenten con información clara, precisa y oportuna sobre

la seguridad y la eficacia, tanto de los productos nuevos como de los antiguos. El apoyo constante de la comunidad de desarrollo internacional es fundamental para garantizar que las parejas en todo el mundo se beneficien de la investigación y el desarrollo de métodos anticonceptivos.

### Referencias

1. UN Population Division. Demographic prospects 2000–2050 according to the 2002 revision of the United Nations populations projections. *Population and Development Review*. 2003;29(10):139–145.
2. Bongaarts J, Johansson E. Future trends in contraceptive prevalence and method mix in the developing world. *Studies in Family Planning*. 2002;33(1):24–36.
3. United Nations (UN). *World Contraceptive Use 2003* [wall chart]. Sales No. E.04.XIII.20. New York: UN; 2004.
4. Ross J, Hardee K, Mumford E, Eid S. Contraceptive method choice in developing countries. *International Family Planning Perspectives*. 2002;28(1):32–40.
5. International Planned Parenthood Federation (IPPF). *IMAP Statement on Intrauterine Devices*. London: IPPF; 2003.
6. Skegg DC. Safety and efficacy of fertility-regulating methods: a decade of research. *Bulletin of the World Health Organization*. 1999;77(9):713–721.
7. Peterson HB, Xia Z, Hughes JM, Wilcox LS, Tylor LR, Trussell J. The risk of pregnancy after tubal sterilization: findings from the U.S. Collaborative Review of Sterilization. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 1996;88(2):246–250.
8. Johns Hopkins University/Center for Communication Programs. *Care for Each Other Campaign, Georgia, 1999–2002*. Final report. Baltimore, MD: JHU/CCP; 2003.
9. WHO. Summary of changes from the second edition. *Improving Access to Quality Care in Family Planning. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*. 3rd ed. Disponible en: [www.who.int/reproductive-health/publications/MEC\\_3/changes\\_tables.html](http://www.who.int/reproductive-health/publications/MEC_3/changes_tables.html). Revisado en línea el 2 de abril de 2004.
10. Hubacher D, Lara-Ricalde R, Taylor DJ, GuerraInfante F, Guzman-Rodriguez R. Use of copper intrauterine devices and the risk of tubal infertility among nulligravid women. *New England Journal of Medicine*. 2001;345(8):561–567.
11. Rivera R, Best K. Current opinion: consensus statement on intrauterine contraception. *Contraception*. 2002;65(6):385–388.
12. Grimes DA. Intrauterine device and uppergenital-tract infection. *The Lancet*. 2000;356(9234):1013–1019.
13. Trussell J, Leveque JA, Koenig JD, et al. The economic value of contraception: a comparison of 15 methods. *American Journal of Public Health*. 1995;85(4):494–503.
14. Family Health International. *How to Be Reasonably Sure a Client Is Not Pregnant*. Research Triangle Park, NC: FHI; 2002. Disponible en: [www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/pregnancy/index.htm](http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/pregnancy/index.htm).



Fuente: Sitio web de NuvaRing.  
[www.nuvaring.com](http://www.nuvaring.com).



Fuente: Sitio web de OrthoEvra.  
[www.orthoevra.com](http://www.orthoevra.com).

15. Kenya Ministry of Health, FHI, USAID. An extremely low-cost option. Nairobi: Kenya MOH; 2003. *A New Look at IUDs*. IUCD Method Briefs, No. 3.
16. Katz KR, Johnson LM, Janowitz B, Miguel Carranza J. Reasons for the low level of IUD use in El Salvador. *International Family Planning Perspectives*. 2002;28(1):26-31.
17. Population Council. *Clients and Providers Need Better Support and Guidance on IUDs (Ghana and Guatemala)*. FRONTIERS Operations Research Summary, No. 32. Washington, DC: Population Council; 2003.
18. Intrauterine devices page. Reproductive Health Technologies Project website. Disponible en: <http://rhtp.org/iuds/iud.htm>. Revisado en línea el 21 de abril de 2004.
19. Otero-Flores JB, Guerrero-Carreño FJ, Vasquez-Estrada LA. A comparative randomized study of three different IUDs in nulliparous Mexican women. *Contraception*. 2003;67(4):273-276.
20. Population Reference Bureau (PRB). *Family Planning Worldwide, 2002 Data Sheet*. Washington, DC: PRB. Disponible en: [www.prb.org](http://www.prb.org).
21. Morrison CS, Sekadde-Kigundu C, Sinei SK, Weiner DH, Kwok C, Kokonya D. Is the intrauterine device appropriate contraception for HIV-1-infected women? *British Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2001;108:784-790.
22. Fortney JA, Feldblum PJ, Raymond EG. Intrauterine devices: the optimal long-term contraceptive method? *The Journal of Reproductive Medicine*. 1999;44(3):269-274.
23. Baldaszti E, Wimmer-Puchinger B, Loschke K. Acceptability of the long-term contraceptive levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena<sup>®</sup>): a 3-year follow-up study. *Contraception*. 2003;67(2):87-91.
24. Diaz J, Bahamondes L, Monteiro I, Petta C, Hildalgo MM, Arce XE. Acceptability and performance of the levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena<sup>®</sup>) in Campinas, Brazil. *Contraception*. 2000;62(2):59-61.
25. Farley TM, Rosenberg MJ, Rowe PJ, Chen JH, Meirik O. Intrauterine devices and pelvic inflammatory disease: an international perspective. *The Lancet*. 1992;339(8796):785-788.
26. Best K. IUD not recommended for increased STD risk. *Network*. 2000;20(1):12-15.
27. Shelton JD. Risk of clinical pelvic inflammatory disease attributable to an intrauterine device. *The Lancet*. 2001;357(9254):443.
28. Grimes DA, Schulz KF. Prophylactic antibiotics for intrauterine device insertion: a metaanalysis of the randomized controlled trials. *Contraception*. 1999;60(2):57-63.
29. Meirik O, Farley TM, Sivin I. Safety and efficacy of levonorgestrel implant, intrauterine device, and sterilization. *Obstetrics & Gynecology*. 2001;97(4):539-547.
30. Sivin I, Croxatto H, Bahamondes L, et al. Two-year performance of a Nestorone-releasing contraceptive implant: a three-center study of 300 women. *Contraception*. 2004;69(2):137-144.
31. Diaz S. Contraceptive implants and lactation. *Contraception*. 2002;65(1):39-46.
32. Croxatto HB. Progestin implants for female contraception. *Contraception*. 2002;65(1):15-19.
33. International Planned Parenthood Federation Africa Region. *Contraceptive Update: A Handbook for Health Workers*. Nairobi: IPPFAR; 1996.
34. Women and Aids Support Network. *Women's Health and HIV/AIDS: Contraception and HIV/AIDS*. Harare: WASN; 2001. Disponible en: [www.wasn.org.zw](http://www.wasn.org.zw).
35. Zheng SR, Zheng HM, Qian SZ, Sang GW, Kaper RF. A randomized multicenter study comparing the efficacy and bleeding pattern of a single-rod (Implanon<sup>®</sup>) and a six-capsule (Norplant<sup>®</sup>) hormonal contraceptive implant. *Contraception*. 1999;60(1):1-8.
36. Hickey M, d'Arcangues C. Vaginal bleeding disturbances and implantable contraceptives. *Contraception*. 2002;65(1):75-84.
37. Ortayli N. Users' perspectives on implantable contraceptives for women. *Contraception*. 2002;65(1):107-111.
38. Sivin I, Nash H, Waldman S. *Jadelle<sup>®</sup> Levonorgestrel Rod Implants: A Summary of Scientific Data and Lessons Learned from Programmatic Experience*. New York: Population Council; 2002.
39. WHO/RHR. Contraceptive implants come of age. *Progress in Reproductive Health Research*. 2003;61:1-8.
40. WHO. *Cervical Cancer, Oral Contraceptives and Parity*. Geneva: WHO; 2002. Disponible en: [www.who.int/reproductive-health/cancers/cacx\\_ocs.en.html](http://www.who.int/reproductive-health/cancers/cacx_ocs.en.html).
41. Association of Reproductive Health Professionals. *Myths About Oral Contraception*. Washington, DC: ARHP; 1998. Disponible en: [www.arhp.org/healthcareproviders/onlinepublications](http://www.arhp.org/healthcareproviders/onlinepublications).
42. Myths about oral contraceptives. *Contraception Report*. 2003;13(4):14. Available at: [www.contraceptiononline.org/contrareport/pdfs/13\\_04.pdf](http://www.contraceptiononline.org/contrareport/pdfs/13_04.pdf).
43. FHI. Combined Oral Contraceptives (COCs) FAQs. Disponible en: [www.fhi.org/en/RH/FAQs/index.htm](http://www.fhi.org/en/RH/FAQs/index.htm). Revisado en línea el 21 de abril de 2003.
44. Anderson FD, Hait H, the Seasonale-301 Study Group. A multicenter, randomized study of an extended cycle oral contraceptive. *Contraception*. 2003;68(2):89-96.
45. Dieben TO, Roumen FJ, Apter D. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. *Obstetrics and Gynecology*. 2002;100(3):585-593.
46. Gallo MF, Grimes DA, Schulz KF. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. Cochrane database of systematic reviews. 2003;(1):CD003552.
47. Aude MC, Moreau M, Koltun WD, et al. Evaluation of contraceptive efficacy and cycle control of a transdermal contraceptive patch vs. an oral contraceptive: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2001;285(18):2347-2354.

Agradecemos a los lectores que participaron en la evaluación de *Outlook* realizada durante el año 2003. Apreciamos sus sugerencias. Sus comentarios han influido en el nuevo diseño de este número y han sido de gran ayuda para la elección de temas de interés que serán tratados en *Outlook* en el futuro.

ISSN:0737-3732

*Outlook* es publicado por PATH, cuya misión es mejorar la salud de las personas en todo el mundo desarrollando tecnologías, fortaleciendo los sistemas y fomentando conductas saludables. Algunos números se encuentran disponibles en chino, francés, indonesio, portugués, ruso y español. *Outlook* presenta noticias sobre aspectos de salud reproductiva de interés para lectores de países en desarrollo. *Outlook* es financiado parcialmente por un aporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los contenidos u opiniones expresadas en *Outlook* no son necesariamente aquellas de sus patrocinadores, de los miembros de la Junta Asesora de *Outlook* o de PATH. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) traduce, publica y distribuye la edición en español de *Outlook*. Las personas de ICMER a cargo de la traducción y producción de *Outlook* son Ana María Concha, Kane Sugiyra y Ximena Toro.

#### Suscripciones

*Outlook* se envía sin costo alguno a los lectores de los países en desarrollo; la suscripción en los países desarrollados tiene un costo de US\$40 al año. Por favor dirija sus cheques a PATH. Para suscribirse, contacte a: Jack Kirshbaum, Editor PATH 1455 NW Leary Way Seattle, WA 98107-5136 U.S.A. Teléfono: 206-285-3500 i Fax: 206-285-6619 E-mail: [outlook@path.org](mailto:outlook@path.org)

#### Números anteriores

Los números anteriores de *Outlook* se encuentran en [www.path.org/resources/pub\\_outlook.htm](http://www.path.org/resources/pub_outlook.htm). Si desea obtener más información sobre otros temas de salud reproductiva visite el sitio web Reproductive Health Outlook (RHO) [www.rho.org](http://www.rho.org).

#### Junta asesora

Giuseppe Benagiano, M.D., Ph.D., Universidad La Sapienza, Italia • Gabriel Bialy, Ph.D. National Institute of Child Health & Human Development, EE.UU. • Willard Cates, Jr., M.D., M.P.H., Family Health International, EE.UU. • Lawrence Corey, M.D., Universidad de Washington, EE.UU. • Horacio Croxatto, M.D., Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Chile • Judith A. Fortney, Ph.D., Family Health International, EE.UU. • John Guillebaud, M.A., FRCSE, MRCOG, Margaret Pyke Centre for Study and Training in Family Planning, Reino Unido • Atiqur Rahman Khan, M.D., Technical Assistance Inc., Bangladesh • Roberto Rivera, M.D., Family Health International, EE.UU. • Pramilla Senanayake, MBBS, DTPH, Ph.D., Sri Lanka y Reino Unido • Melvin R. Sikov, Ph.D., Battelle Pacific Northwest Labs, EE.UU. • Irving Sivin, M.S., Population Council, EE.UU. • Richard Soderstrom, M.D., Universidad de Washington, EE.UU. • Martin P. Vessey, M.D., FRCGP, FFCM, FRCGP, Universidad de Oxford, Reino Unido.

#### Colaboradores

La redacción de este número estuvo a cargo de Wendy Castro. Los responsables de la edición y la producción fueron Jack Kirshbaum y Kristin Dahlquist. Las siguientes personas revisaron este número: Dr. H. Croxatto, Dr. R. Rivera, Dr. J. Shelton y Dra. F. Stewart. *Outlook* agradece sus comentarios y sugerencias.

Copyright © 2004, Programa para una Tecnología Apropriada en Salud (PATH). Todos los derechos reservados. Este material puede ser usado libremente con propósitos educativos y no comerciales, siempre y cuando el material incluya una línea en que se reconozca la autoría de PATH.