

**Novedades de la Quinta Edición de los
“Criterios Médicos de Elegibilidad para
el Uso de Anticonceptivos”
de la Organización Mundial de la Salud**

**Dra. Daniela Capella Sepúlveda
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER)
Abril, 2016**




“Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos, el intervalo entre éstos, a disponer de la información y los medios para ello y el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva.”

Beijing Declaration and Platform for Action. In: Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 4–15 September, 1995). United Nations; 1995

Introducción

- Guía con respecto a la seguridad de los métodos anticonceptivos en varias situaciones médicas
 1. ¿El método empeora la situación médica?
 2. ¿La situación médica disminuye la efectividad del método?
- Revisión de la 4ta. edición durante 2013 y 2014
- Publicación de la 5ta. edición en 2015 en www.who.int



Novedades de la 5° Edición

Agrega nuevos métodos

- Acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) subcutánea
- Anillo vaginal de progesterona
- Sino-Implant (II)
- Acetato de Ulipristal (nuevo método anticonceptivo de emergencia)

Modifica algunas categorías de recomendación

- Lactancia materna
- Postparto
- Dislipidemias conocidas
- Terapia antiretroviral

DMPA subcutánea



Comparación entre DMPA administrada por vía intramuscular (IM) y subcutánea (SC)

	DMPA IM	DMPA SC
Dosis	150 mg/1 ml	104 mg/ 0.65 ml
Concentración plasmática máxima	3.73 ng/mL	1.56 ng/ml
Exposición total a MPA		30% menor
Efectividad	Similar (0 de 263 mujeres en un año, Pearl 0)	Similar (1 de 265 en un año, Pearl 0,2)

Comparación entre DMPA administrada por vía intramuscular (IM) y subcutánea (SC)

	DMPA IM	DMPA SC
Efectos adversos	Similares	Similares Salvo: mayor reacción en el sitio de punción
Pérdida de masa ósea a los 2 años de uso	Similar *Ambos con recuperación total al año de discontinuación	Similar
Beneficios no anticonceptivos	Disminuye dismenorrea Disminuye pérdida de sangre Manejo de hiperplasia endometrial*	Disminuye dismenorrea Disminuye pérdida de sangre No estudiada para hiperplasia endometrial

DMPA

- DMPA im y sc aparecen como terapéuticamente equivalentes (farmacocinética, eficacia, efectos colaterales)
- Las recomendaciones para la vía subcutánea son las mismas que para la administrada vía intramuscular

Anillo Vaginal de Progesterona

- Indicación: anticoncepción durante la lactancia
- Composición:
 - Homogenizado de silastic que contiene 2 gr de progesterona (22,5%)



Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997

Anillo Vaginal de Progesterona

- Libera 10 mg de progesterona diaria por 3 meses
 - Concentraciones plasmáticas: 25 nmol/l primera semana, descendiendo hasta 10 nmol/l al final del 3er mes
- Forma:
 - Diámetro central 8,4 mm y total de 58 mm

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997

Anillo Vaginal de Progesterona

- Mecanismo de acción:
 - Aumento de la sensibilidad del sistema hipotálamo-hipófisis a la succión, reforzando el mecanismo fisiológico de anovulación y amenorrea de lactancia
- Efectividad:
 - Tasas acumuladas de embarazo de 0 a 1,5 por 100 años mujer

Anillo Vaginal de Progesterona

- Modo de uso
 - Uso a partir del día 30 post parto en mujeres que estén con lactancia materna (al menos 4 veces al día)
 - Uso continuo
 - Debe ser reemplazado cada 90 días hasta máximo 1 año postparto
 - Uso sin restricción

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997

Anillo Vaginal de Progesterona

- Beneficios
 - Sin alteración de la lactancia ni del crecimiento de los niños
 - Prolonga el periodo de amenorrea de lactancia
 - Sin contraindicaciones médicas
 - Sin efectos sistémicos
 - No requiere preocupación diaria

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols, Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols, Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997; Massai y cols, Contraception, 1999

Anillo Vaginal de Progesterona

- Efectos colaterales
 - Irritación, dolor y aumento de la secreción vaginal
 - Molestias durante la actividad sexual
- Expulsión: Hay riesgo de expulsión en alrededor del 11% de los casos

Sino-Implant (II)

- Implantes previamente incorporados:
 - Levonorgestrel: Norplant, Jadelle
 - Etonorgestrel: implanon e implanon nxt
- En esta edición se agrega Sino-Implant: 2 barillas de 75 mg LNG aprobadas para su uso por 4 años
- Manufacturado en China



Sino-Implant (II)

- Las recomendaciones son las mismas que para el resto de los implantes
- Sino-Implant (II) tiene seguridad, farmacocinética y efectos colaterales similares a la de otros implantes con LNG en mujeres sanas

Sino-Implant (II)

- Los estudios se han realizado en población oriental salvo 2 estudios de solo un año de seguimiento:
 - Madagascar (Lendvay, 2014)
 - Kenia y Pakistán (Feldblum, 2013)
- No hay estudios directos en mujeres con condiciones específicas de salud

Sino-implant (II)

- Probabilidad de embarazo acumulada al
 - Primer año: 0 a 0,1% (Jadelle 0,1%)
 - Cuarto año: 0,9-1,06%
 - Quinto año: 0,7-2.1% (Jadelle 1,5%)

Anticonceptivo de emergencia: Acetato de Ulipristal

- Mecanismo de acción:
 - Modulador selectivo de los receptores de progesterona
- Aprobada para este uso en Europa (2009) y Estados Unidos (US FDA, 2010)



Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal como Anticoncepción de Emergencia

	Levonorgestrel	Acetato de Ulipristal
Presentación	1 dosis 150 mg VO	1 dosis 30 mg VO
Mecanismo de acción	Feedback negativo sobre hipófisis, disminuyendo LH (efectivo previo a pick LH)*	Retrasa la ruptura folicular Podría ser efectivo hasta posterior a pick de LH**

*Durand & cols., *Contraception*, 2001; Palomino & cols., *Ginecol Endocrinol*, 2010

**Brache & cols., *Human Reproduction*, 2010

Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal como Anticoncepción de Emergencia

	Levonorgestrel	Acetato de Ulipristal
Embarazo al usar el método hasta 72hrs posterior a RS no protegida	Cercano al 2%	Cercano a 2%
Embarazo al usar el método entre 72 -120 hrs posterior a RS no protegida	2,6%	1.8%

Brache & cols., Human Reproduction, 2010; Glasier, Lancet, 2010

Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal como Anticoncepción de Emergencia

	Levonorgestrel	Acetato de Ulipristal
Efecto sobre endometrio *	Sin cambios, o mínimos cambios	Produce alteraciones sobre el endometrio: adelgazamiento y receptores glandulares de progesterona
Reacciones adversas	Similares: cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga	Similares: cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga

**Stratton, Fertil Steril, 2010; Rosato, Frontiers in Pharmacology, 2016*

Modificación de categorías

Lactancia
materna

Postparto

Dislipidemias
conocidas

Terapia
antiretroviral



Lactancia Materna

Condition	COC/P/ CVR	CIC	POP	DMPA NET-EN	LNG/ ETG implants
Breastfeeding					
a) < 6 weeks postpartum	4	4	2 ^a	3 ^a	2 ^a
b) ≥ 6 weeks to < 6 months (primarily breastfeeding)	3	3	1	1	1
c) ≥ 6 months postpartum	2	2	1	1	1

Lactancia Materna

- La evidencia demuestra que no hay efectos de los anticonceptivos de progestágeno solo en la lactancia, ni en el crecimiento y desarrollo de los niños
- No hay estudios para determinar el efecto a largo plazo

Lactancia Materna

¿Y por qué DMPA no se podría administrar las primeras 6 semanas postparto?

Hay preocupación teórica por la posible exposición del neonato, en las primeras 6 semanas, a los mayores niveles hormonales en leche producidos por DMPA al ser administrada por vía parenteral.



Postparto



Condition	Cu-IUD	LNG-IUD
Postpartum (breastfeeding or non-breastfeeding including after caesarean section)		
a) < 48 hours including insertion after delivery of the placenta	1	not BF=1; BF=2
b) ≥ 48 hours to < 4 weeks	3	3
c) ≥ 4 weeks	1	1
d) Puerperal sepsis	4	4

Postparto

- Inserción hasta 48 horas postparto:
 - Menores porcentajes de expulsión que la posterior a 48 horas.
- Pocos estudios realizados y controversias en sus resultados con respecto a la posible disminución de la lactancia al comparar la inserción inmediata postparto de DIU-LNG versus la inserción tardía



Postparto



Condition	COC/P/ CVR	CIC	POP	DMPA NET-EN	LNG/ ETG implants
Postpartum (non-breastfeeding women)					
a) < 21 days			1	1	1
(i) without other risk factors for VTE	3 ^a	3 ^a			
(ii) with other risk factors for VTE	4 ^a	4 ^a			
b) ≥ 21 days to 42 days			1	1	1
(i) without other risk factors for VTE	2 ^a	2 ^a			
(ii) with other risk factors for VTE	3 ^a	3 ^a			
c) > 42 days	1	1	1	1	1

*Otros factores de riesgo: inmovilización, IMC>30, fumadora, antecedentes personales trombosis

Dislipidemias Conocidas

Condition	COC/P/ CVR	CIC	POP	DMPA NET-EN	LNG/ ETG implants	Cu-IUD	LNG-IUD
Known dyslipidaemias without other known cardiovascular risk factors	2 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a

→ Hubo aclaración del título de la condición

¿Existe mayor riesgo de trombosis venosa o arterial en mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados?



No existe clara asociación entre dislipidemias y riesgo de TV en mujeres en edad reproductiva

No se recomienda el tamizaje habitual de dislipidemias

Terapia anti-retroviral



- Se agrega categorización sobre cada medicamento.
- Categoría de inhibidores de la proteasa pueden ser usados (categoría 2)

**Muchas gracias
por su atención**