

# Saber sobre la PAE

## Lo que hay que saber sobre la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE)

---

### ¿Qué son las PAE?


Son píldoras anticonceptivas que se usan en dosis especiales para prevenir un embarazo no planeado o no deseado después de una relación sexual sin protección anticonceptiva. También se las conoce como “la píldora del día después”.

Si necesitas PAE, solicítala en ICMER. [Contáctenos](#)

### ¿Qué píldoras se usan?

Las que contienen levonorgestrel solo o las que contienen etinil estradiol y levonorgestrel.


- Píldoras que contienen levonorgestrel (LNG) solo en dosis única: Se puede usar una sola píldora que contiene 1.5 mg de levonorgestrel. El producto que se vende en Chile es Escapel 1.
- Píldoras que contienen levonorgestrel (LNG) solo en dos dosis: Se pueden usar píldoras que contienen 0,75 mg de levonorgestrel. Vienen 2 píldoras por envase y el producto disponible se llama Escapel 2. Se pueden tomar las 2 píldoras juntas o en dos dosis separadas. La segunda dosis debe tomarse 12 horas después de la primera:



Como puede haber problemas para conseguirlas también se puede usar

- Levonorgestrel en minidosis. Se pueden tomar dos dosis de 25 píldoras de LNG en minidosis, separadas por 12 horas (son las píldoras que se usan durante la lactancia y

tienen una dosis muy baja de hormona, por lo que la cantidad de levonorgestrel de las 25 píldoras es igual a la que contiene una píldora de Escapel 2). Se compran en farmacia, sin receta y sus nombres comerciales son Levonorgestrel y Microval.



- Píldoras que contienen etinilestradiol y levonorgestrel o Método de Yuzpe: Se usan algunas píldoras anticonceptivas combinadas de uso habitual, que contienen 0.3 mg de etinilestradiol y 0.15 mg de levonorgestrel. Se toman 4 píldoras primero y se repite la dosis (4 pastillas) a las 12 horas. Se compran en farmacia y sus nombres comerciales son Anovulatorios Microdosis, Microgynon, Nordette, Anulette, Norvetal, Innova CD.



- Otra forma de usar el Método de Yuzpe, es tomando otros preparados comerciales que contienen levonorgestrel y etinilestradiol (Anulette 20, Norvetal 20 y Miranova), pero que, en cada píldora, contienen una dosis un poco menor que los productos nombrados anteriormente. La dosis de cada píldora es menor (0.10 mg de levonorgestrel y 0.02 mg de etinilestradiol), por lo que se deben tomar 5 píldoras juntas y 12 horas después 5 píldoras más.

De acuerdo a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el levonorgestrel solo es el método anticonceptivo de emergencia más efectivo y mejor tolerado.

### ¿Cuándo y cómo se usan?

- En caso de violación.
- Después de una relación sexual sin protección anticonceptiva.
- Si el método anticonceptivo falló, por ejemplo, se rompió el condón o este se quedó dentro de su vagina, olvidó tomar la píldora, expulsó el dispositivo intrauterino, no hizo abstinencia sexual en los días fértiles, etc.

**Deben tomarse dentro de las 120 horas, es decir, hasta cinco días después de la relación sexual no protegida. Son más efectivas mientras antes se tomen.**

### ¿Cómo funcionan?

Evitan la ovulación o que el óvulo sea fecundado. No impiden la implantación ni interrumpen un embarazo. **No son abortivas.**

### ¿Cuál es su eficacia?

De 100 mujeres que usan PAE se pueden embarazar entre 1 a 3, siendo las píldoras de levonorgestrel más efectivas que las píldoras combinadas. Son casi 100% efectivas si se toman en las primeras 24 horas. **Por eso, mientras antes se tomen mejor.** No son efectivas si hay un embarazo en curso.

### ¿Qué molestias producen?

Algunas mujeres pueden sentir náuseas, dolor de cabeza, cansancio, sensibilidad en los senos (pechos). Si vomita antes de dos horas de ingeridas las PAE, debe repetir la dosis. Las molestias no duran más de 24 horas.

- Las PAE pueden usarlas todas las mujeres, jóvenes y adultas.
- Las PAE sólo se usan en caso de emergencia, no es un método regular de anticoncepción porque su protección es menor que los métodos anticonceptivos de uso regular.
- No protegen de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

### Contraindicaciones

Las PAE no tienen contraindicaciones.

Las PAE están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), las agencias reguladoras de Europa y América del Norte, y la mayoría de las agencias de Asia y América del Sur.

Para recibir más información sobre las PAE, puedes [consultar a un\(a\) profesional de salud en ICMER](#)