

# NOCIONES BASICAS SOBRE LA GENERACION DE UN NUEVO INDIVIDUO Y SOBRE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA

Dr. Horacio Croxatto

Prof. Maria Elena Ortiz

Dra. Soledad Diaz

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

Revisión actualizada al 27 de Noviembre 2006

## *El comienzo de un nuevo individuo*

Está bien establecido que en la especie humana, y en muchas otras, cada nuevo individuo se forma habitualmente por la unión de un espermatozoide con un ovocito, más comúnmente conocido como óvulo. Esta unión se llama fecundación. Tanto el espermatozoide como el óvulo son células; ambas están vivas en el momento de unirse y siempre lo estuvieron, ya que se formaron a partir de otras células vivas. Al unirse, dan origen a una célula única llamada cigoto, que también está viva. Si los gametos (espermatozoide y óvulo) que se unieron eran humanos, el cigoto resultante también lo es. Por lo tanto, la pregunta ¿Cuándo comienza la vida humana? no es pertinente, pues la vida no comienza, sólo continúa. En cambio, sí es pertinente preguntarse ¿Cuándo se inicia un nuevo individuo? La respuesta simple es que el nuevo individuo se inicia cuando ocurre la fecundación.

## *¿En qué momento del ciclo menstrual ocurre la fecundación?*

El ciclo menstrual comienza con el primer día de la menstruación y –si todo es normal –termina 24 a 35 días después, a no ser que se produzca un embarazo. Para que se produzca embarazo, tiene que haber fecundación y desarrollo del cigoto. Sin embargo, no todos los cigotos se desarrollan y dan lugar a un embarazo. Para que haya fecundación, tiene que ocurrir la ovulación y tiene que haber una relación sexual cercana a ella, pues los gametos tienen que estar en buenas condiciones para poder unirse y generar un embrión viable. Esto sólo se logra cuando el coito antecede a la ovulación por no más de cinco días o si coincide con el día de la ovulación. Aún así, en la mitad de los casos en que esta condición se cumple, no se produce la fecundación, ya sea porque los gametos no se encuentran, porque son defectuosos o porque el medio ambiente que los rodea no es propicio.

Aproximadamente el 90% de los ciclos menstruales son ovulatorios y en ellos lo normal es que la ovulación ocurra en cualquier día del ciclo, desde el día 10 al día 22. La ovulación es el proceso por el cual el óvulo completa su maduración y sale del ovario. Una vez que ocurre la ovulación, el óvulo tiene que ser fecundado dentro de las próximas horas. Si ello no ocurre, se deteriora y pierde la capacidad de formar un nuevo individuo. Por lo tanto, estas características del óvulo y el momento en que ocurre la ovulación determinan que la fecundación sólo puede ocurrir en uno de los 13 días comprendidos entre el día 10 y el día 22 del ciclo menstrual.

### ***¿Cuándo ocurre la fecundación después de un coito?***

Muchas personas creen que la fecundación se produce inmediatamente después de una relación sexual, pero no es así. Después de un coito, los espermatozoides pueden permanecer en el interior de la mujer en un estado capaz de fecundar por un plazo de hasta de cinco días. Si el coito ocurre el mismo día de la ovulación, la fecundación puede ocurrir en el mismo día del coito. Si el coito ocurre cinco días antes del día en que ocurre la ovulación, la fecundación ocurrirá cinco días después del coito. Por lo tanto, no todos los individuos inician su existencia al día siguiente de un coito.

### ***El desarrollo del cigoto desde la fecundación hasta la implantación***

La fecundación ocurre habitualmente en la trompa de Fallopio, que es un tubo que conecta el ovario con el útero. El cigoto resultante de la fecundación es una célula que tiene la potencialidad de desarrollarse y llegar a formar un ser humano constituido por miles de millones de células, del mismo modo que una semilla puede llegar a ser un árbol a través de un proceso de crecimiento y desarrollo. Si bien la semilla puede llegar a ser un árbol, aún no lo es; o si bien un huevo puede llegar a ser una gallina, aún no lo es. Asimismo, el cigoto humano puede llegar a ser un embrión, un feto, un recién nacido o una persona adulta, pero aún no lo es. Necesita desarrollarse.

Aproximadamente tres días después de la fecundación, si el cigoto se ha desarrollado normalmente, está constituido por 8 a 10 células y pasa al útero donde continúa desarrollándose, inmerso en el escaso fluido que llena la cavidad del útero. En este medio alcanza el estado llamado mórula y posteriormente el estado de blastocisto. Antes de implantarse, el blastocisto consta de unas 200 células, y es más pequeño que la cabeza de un alfiler. La mayoría de estas células están destinadas a formar la placenta y otras estructuras que no son parte del embrión.

propriadamente tal. Un 7 a 10% de las células del blastocisto están destinadas a formar el embrión. Hasta aquí, la mujer no tiene manera alguna de reconocer que tiene un nuevo individuo en su útero.

En el séptimo día de desarrollo, el blastocisto humano se anida o implanta en la capa interna del útero, llamada endometrio. Para que esto ocurra, es preciso que el endometrio se haya hecho receptivo por la acción que ejercen sobre él las hormonas del ovario, llamadas estradiol y progesterona. La implantación consiste en que el blastocisto se sumerge en este tejido materno. A partir de la implantación, el cuerpo materno reconoce de un modo evidente que hay un nuevo individuo en desarrollo y comienza a reaccionar a su presencia. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo, que es una condición de la madre y no del nuevo individuo en desarrollo, comienza con la implantación. Dicha reacción del cuerpo materno se debe, en parte, al hecho de que cuando ocurre la implantación, las células que van a dar origen a la placenta comienzan a secretar una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana (HCG). Esta hormona pasa a la sangre materna y actúa sobre el ovario para impedir que se produzca la menstruación.

### ***El desarrollo del embrión a partir de la implantación***

La menstruación, comúnmente conocida como la regla, es el desprendimiento del endometrio acompañado de sangrado, que se produce debido a que el ovario deja de producir progesterona. Cuando no hay embarazo, esto ocurre aproximadamente unos 14 días después de la ovulación. Si llega a ocurrir la menstruación después que se ha implantado un blastocisto, éste es expulsado junto con la sangre menstrual. Para evitarlo, el blastocisto le da una señal al organismo materno (la HCG), para que el ovario siga produciendo progesterona, la cual es indispensable tanto para que el blastocisto se pueda implantar como para que se mantenga el embarazo. De este modo, cuando el blastocisto que se anidó en el útero continúa su desarrollo, no se produce la menstruación. La mujer nota que no le llegó la regla y esto suele ser el primer indicio que ella tiene de estar embarazada.

A esta altura del proceso, está empezando a formarse el embrión. Desde la perspectiva biológica, aún es un individuo muy incipiente pues carece de cerebro, de corazón, de extremidades y de todos los órganos que posee el feto, el recién nacido o el adulto. Su desarrollo es mínimo y no posee aún el substrato biológico indispensable para tener sensaciones, emociones, pensamientos o deseos, o siquiera saber que existe. No obstante, está dotado de una gran capacidad para

seguir desarrollándose y eventualmente adquirir los órganos y funciones que le permitirán funcionar como persona humana.

### ***Las fallas naturales del proceso generativo humano***

En la mujer, aproximadamente la mitad de los cigotos que se forman se eliminan natural y espontáneamente antes de que se produzca el atraso menstrual. En esos casos, la mujer no alcanza a notar que tuvo un cigoto, un blastocisto o un embrión en su interior. Cuando se hace un seguimiento a cien parejas fértiles que tienen relaciones sexuales libremente varias veces en el mes y que no hacen nada para evitar el embarazo, se observa que en 25 de las mujeres se produce embarazo en el primer mes; en el 25% de las 75 mujeres restantes se produce embarazo en el segundo mes y así sucesivamente. La explicación es que, en cada mes, en el 50% de las parejas no hay fecundación y que del 50% de las fecundaciones que ocurren, la mitad de ellas no dan lugar a embarazo, porque el producto de la fecundación se elimina espontáneamente antes de que se produzca el atraso menstrual.

### ***Lo que pasa normalmente con los espermatozoides después de un coito***

Un coito deja millones de espermatozoides en la vagina. En las mejores condiciones, miles de estos entran al cuello del útero donde la inmensa mayoría se estaciona. Unos pocos cientos ascienden en minutos hasta la trompa de Fallopio. Sin embargo, observaciones hechas en animales de experimentación muestran que estos espermatozoides no tienen capacidad de fecundar. Los que quedan en el cuello del útero constituyen un reservorio del cual salen sucesivas oleadas de espermatozoides que ascienden hasta la trompa de Fallopio en los días que siguen. Algunos de estos se adhieren durante horas a la pared de la trompa, proceso en el cual adquieren la capacidad de fecundar. Una vez que se desprenden, mantienen esta capacidad por pocas horas o minutos mientras van en busca del óvulo. Por ello, es necesario que sigan llegando nuevos espermatozoides que los reemplacen, hasta que se produzca la ovulación.

La migración de los espermatozoides hasta el sitio donde se produce la fecundación puede ocurrir en la forma descrita hasta que se produce la ovulación, pero en ningún caso se prolonga por más de 5 días después de un coito. Si bien los espermatozoides pueden esperar al óvulo durante días, el óvulo puede esperar a los espermatozoides sólo por algunas horas después de la ovulación.

## ***Métodos anticonceptivos de emergencia***

Se denomina anticoncepción de emergencia (AE) a los métodos anticonceptivos que las mujeres pueden utilizar después de haber tenido una relación sexual sin protección anticonceptiva, con el fin de evitar un embarazo no deseado. Para tal efecto, se recomienda usar pastillas de levonorgestrel solo, o pastillas combinadas de etinilestradiol y levonorgestrel, que son hormonas contenidas también en las píldoras anticonceptivas de uso regular. La diferencia es que la AE se administra en dosis más altas y solamente dentro de los 5 días que siguen a la relación sexual no protegida, y es más efectiva cuanto antes se tome. Las píldoras registradas en Chile (Postinor-2, Tace) contienen solamente levonorgestrel, es más efectiva para prevenir el embarazo y tiene menos efectos molestos que las píldoras combinadas con etinilestradiol.

Las pastillas de levonorgestrel son inocuas y no tienen contraindicaciones médicas. Están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por las agencias reguladoras de medicamentos de Europa, Estados Unidos y muchas de las de Asia y de América Latina. Estas agencias, así como la correspondiente chilena, exigen que los productos pasen por un riguroso escrutinio de su seguridad y eficacia antes de ser aprobados. La AE permite evitar embarazos no deseados: cuando no se ha usado otro método antes del acto sexual, cuando el método utilizado ha fallado o cuando ha habido una violación.

Se estima que después de un acto sexual único que tenga lugar en la segunda o tercera semana de un ciclo menstrual solamente se embarazan 8 de cada 100 mujeres. Si las mismas mujeres usan las pastillas de levonorgestrel dentro de los primeros 4 días después del coito, se estima que no se embarazan más de dos, es decir es efectivo en cerca del 75% de los casos, pero ya al quinto día pierde eficacia y solo previene el 31% de los embarazos. Por lo tanto, la eficacia de este método es mayor mientras más pronto se use después de una relación sexual.

## ***Lo que pasa después de tomar la píldora anticonceptiva de emergencia***

Cuando una mujer toma la píldora de levonorgestrel dentro de los primeros días después de un coito, es posible que ésta impida la ovulación si aún no ha ocurrido, que interfiera con la migración de espermatozoides desde el cuello uterino hasta la trompa o que interfiera con el proceso de adhesión y capacitación de los espermatozoides en la trompa. A través de cualquiera de estos mecanismos es que la píldora puede impedir la fecundación. Si ya ha ocurrido la fecundación cuando la mujer toma la píldora, tiene no más de un 50% de probabilidades de

embarazarse, ya que como se describió en los párrafos anteriores, el 50% de los cigotos se pierde espontáneamente. Si el cigoto es normal y viable, la píldora no impedirá ni alterará su desarrollo, pues la sustancia que contiene es una progestina sintética y las progestinas favorecen el embarazo. Esto explica por qué el método es poco eficaz para prevenir el embarazo cuando se usa tardíamente.

Una progestina sintética es una molécula semejante a la progesterona y actúa en el organismo del mismo modo que ella. La progesterona se produce en el ovario a partir de la ovulación y su función principal es transformar el endometrio que creció estimulado por los estrógenos en un endometrio receptivo al embrión. La administración de progesterona antes de la ovulación suprime la ovulación y la migración espermática, pero la progesterona que se administra después de la fecundación ayuda a que se establezca y se mantenga el embarazo. De ahí su nombre, que viene de pro-gestación. El levonorgestrel hace lo mismo que la progesterona. La progesterona no es abortiva, aunque se administre en altas dosis. Por el contrario, es esencial para el embarazo.

Hasta el año 2001 sabíamos muy poco sobre el mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia y los científicos se limitaban a proponer mecanismos hipotéticos. En los últimos años, se han realizado investigaciones cruciales para poner a prueba las hipótesis y se han logrado decisivos avances. Para hacerlo, fue necesario llevar a cabo investigaciones difíciles y costosas debido a las realidades éticas, logísticas y técnicas que había que superar. Nunca hubo datos disponibles en la literatura científica que avalaran que el levonorgestrel impida el embarazo por un mecanismo que impida la implantación. No obstante, ese mecanismo fue la hipótesis favorita de muchos. Ahora tenemos evidencia de que no es así. En dos especies animales muy distantes como son la rata y el mono Capuchino se administró levonorgestrel o placebo (una inyección sin droga) después de la fecundación y luego se contó el número de animales preñados en ambos grupos. Si el levonorgestrel interfiriera con la implantación del embrión, deberíamos encontrar menos hembras preñadas entre las que recibieron la droga que entre las que recibieron placebo. El resultado fue que el número de hembras preñadas fue idéntico en ambos grupos, lo cual permite rechazar la hipótesis de que el levonorgestrel interfiere con la implantación. Por otra parte, tanto en esas dos especies como en la mujer se demostró que el levonorgestrel dado antes de que ocurra la ovulación interfiere con ese proceso impidiendo que se fecunde el óvulo. Estos hallazgos concuerdan con un estudio reciente desarrollado en Australia en el cual se comprobó que si una mujer tiene una relación no protegida al final de su período fértil, en un momento cercano a la ovulación, y toma las píldoras anticonceptivas de emergencia después de ocurrida la ovulación, tiene las mismas

posibilidades de embarazarse como si no las hubiera tomado. Por otra parte, los estudios destinados a evaluar la posibilidad de que el levonorgestrel impida la implantación muestran que no produce cambios en el endometrio que puedan interferir con este proceso cuando es administrado en las dosis que contienen las píldoras anticonceptivas de emergencia.

En resumen, la inhibición de la ovulación y la alteración de la migración espermática son los únicos mecanismos documentados con datos experimentales que pueden explicar cómo las píldoras anticonceptivas de emergencia evitan el embarazo. Por lo tanto, porque previenen el embarazo solamente cuando impiden la fecundación, no son abortivas.

### ***Bibliografía***

- Blanchard K, Bungay H, Furedi A, Sanders L. Evaluation of an emergency contraception advance provision service. *Contraception* 2003; 67:343-348.
- Croxatto HB, Devoto L, Durand M y cols. Mechanism of action of hormonal preparations used for emergency contraception: a review of the literature. *Contraception* 63:111-21, 2001.
- Cook RJ, Dickens BM, Ngwena C, Plata MI. Emergency contraception. *Int J Gynecol Obstet* 2001; 75:185-191
- Croxatto HB, Fuentealba B, Brache V y cols. Effects of the Yuzpe regimen, given during the follicular phase, upon ovarian function. *Contraception* 65:121-8, 2002.
- Croxatto HB. Gamete Transport. In: Adashi EY, Rock JA, Rosenwaks Z (eds.). *Reproductive Endocrinology, Surgery, and Technology*. New York, USA: Lippincot-Raven, 1996 pg 386
- Croxatto HB, Fuentealba B, Brache V y cols. Effects of the Yuzpe regimen, given during the follicular phase, upon ovarian function. *Contraception* 2002; 65:121-128.
- Croxatto HB, Ortiz ME, Muller L. Mechanism of action of emergency contraception. *Steroids* 2003; 68:1095-1098.
- Croxatto HB, Brache V, Pavez M y cols. Pituitary-ovarian function following the standard levonorgestrel emergency contraception. *Contraception* 70:442-450, 2004.
- Croxatto HB. El proceso Generativo Humano y la Anticoncepción de Emergencia. En: [www.anticoncepciondeemergencia.cl](http://www.anticoncepciondeemergencia.cl)

- Croxatto HB. Píldora anticonceptiva y generación de un nuevo individuo. *Reflexión y Liberación* 61:33-9, 2004.
- De Santis M, Cavaliere AF, Straface G, Carducci B, Caruso A. Failure of the emergency contraceptive levonorgestrel and the risk of adverse effects in pregnancy and on fetal development: an observational cohort study. *Fertil Steril* 84: 296-9, 2005.
- Díaz S, Croxatto HB. Anticoncepción de Emergencia. En: *Ginecología*, 3a edición. (ed) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile, 2003. pp. 1067-73.
- Díaz S, Hardy E, Alvarado G, Ezcurra E. Acceptability of emergency contraception in Brazil, Chile and Mexico. 1. Perceptions of emergency oral contraceptives. *Cad. Saúde Pública* 19:1507-17, 2003.
- Díaz S, Hardy E, Alvarado G, Ezcurra E. Acceptability of emergency contraception in Brazil, Chile and Mexico. 2. Facilitating factors versus obstacles. *Cad. Saúde Pública* 19:1729-37, 2003.
- Díaz S. Ética en la regulación de la fertilidad. En *Bioética, Fundamentos y Clínica*. (eds) Pérez M, Ecríbar A, Villarroel R. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile. 2004.
- Díaz S, Croxatto HB. En: *Anticoncepción Hormonal de Emergencia*. En: *Tratado de Anticoncepción*. (eds) WR Barbato, JT Charalambopoulos. Editorial Corpus, Rosario, Argentina, 2005. pp. 267-276.
- Durand M, Cravioto MC, Raymond EG y cols. On the mechanism of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. *Contraception* 64:227-34, 2001.
- Ellertson C, Trussel J, Stewart FH, Winikoff B. Should Emergency Contraceptive Pills be Available without Prescription? *Journal of the American Medical Women's Association* 1998; 53(5):226-229,232.
- Ellertson C, Ambardekar S, Hedley A y cols. Emergency contraception: randomized comparison of advance provision and information only. *Obstetrics and Gynecology* 2001; 98:570-575.
- Ellertson C, Evans M, Ferden S y cols. Extending the time limit for starting the Yuzpe regimen of emergency contraception to 120 hours. *Obstet Gynecol* 101:1168-71, 2003.
- Espinós JJ. Emergency Contraception: Evaluation of Effectiveness. *Resúmenes del XVII FIGO Congress of Gynecology and Obstetrics*. 2-7 November 2003, Santiago, Chile.
- Federación de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Recommendations on Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology. *Emergency Contraception*.

FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health. London, 2003.

- Galvão L, Diaz J, Diaz M, Osis MJ, Clark S and Ellertson C. Emergency Contraception: Knowledge, Attitudes and Practices among Brazilian Obstetrician and Gynecologists. *International Family Planning Perspectives* 1999; 25(4):168-171.
- Glasier A, Baird D. The Effects of Self-administering Emergency Contraception. *New England Journal of Medicine* 1998; 339:1-4.
- Glasier A. Safety of emergency contraception. *Journal of the American Medical Women's Association* 1998; 53(suppl 2):219-221.
- Graham A, Moore L, Sharp D, Diamond I. Improving teenagers' knowledge of emergency contraception: cluster randomized controlled trial of a teacher-led intervention. *British Medical Journal* 2002; 324:1179-1184.
- Gemzell-Danielsson K, Marions L. Mechanisms of action of mifepristone and levonorgestrel when used for emergency contraception. *Human Reproduction Update* 2004; 10:341-348.
- Grimes DA. Switching emergency contraception to Over-the-counter status. *New England Journal of Medicine* 2002; 347:846-850.
- Hapangama D, Glasier AF, Baird DT. The effects of pre-ovulatory administration of the levonorgestrel on the menstrual cycle. *Contraception* 2001; 63:123-129.
- International Planned Parenthood Federation (Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF). Declaración del Panel Médico Asesor (IMAP) sobre Anticoncepción de Emergencia. *IPPF Medical Bulletin* 38 (1):1-2, 2004.
- International Consortium for Emergency Contraception. *Emergency Contraceptive Pills: Medical and service delivery guidelines*. Second Edition, 2004. Washington DC, USA.
- Kesserü E, Garmendia F, Westphal N, Parada J. The hormonal and peripheral effects of d-Norgestrel in postcoital contraception. *Contraception* 1974; 10:411-424.
- Langer A, Garcia-Barrios C, Schiavon R, Heimburger A, Elul B, Renoso Delgado S, Ellertson C. Emergency contraception in Mexico City: what do health care providers and potential users know and think about it? *Contraception* 1999; 60:233-241.
- Marions L, Hultenby K, Lindell I y cols. Emergency contraception with levonorgestrel and mifepristone: mechanism of action. *Obstetrics and Gynecology* 2002; 100:65-71.

- Marions L, Cekan SZ, Bygdeman M, Gemzell-Danielsson K. Effect of emergency contraception with levonorgestrel or mifepristone on ovarian function. *Contraception* 2004; 69: 373-377
- Muller AL, Lladós C, Croxatto HB. Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt postfertilization events in the rat. *Contraception* 67:415-19, 2003.
- Norris Turner A, Ellertson C. How safe is emergency contraception? *Drug Safety* 2002; 25:695-706.
- Ortiz ME, Ortiz RE, Fuentes M, Parraguez VH, Croxatto HB. Post-coital administration of levonorgestrel does not interfere with post-fertilization events in the new-world monkey *Cebus apella*. *Human Reproduction* 19:1352-56, 2004.
- Palomino A, Boric A, Gabler F y cols. Efecto de levonorgestrel como anticoncepción de emergencia sobre receptores de endometrio durante la ventana de implantación. Resúmenes de la XVIII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Varadero, Cuba 28-31 Mayo, 2003.
- Piaggio G, von Hertzen H, Grimes DA y cols. On behalf of the Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Timing of emergency contraception with levonorgestrel or the Yuzpe regimen. *Lancet* 353:9154, 1999.
- Piaggio G, von Hertzen H. Effect of the delay in the administration of levonorgestrel for emergency contraception. Resúmenes del XVII FIGO Congress of Gynecology and Obstetrics, 2-7 November 2003, Santiago, Chile.
- Raymond EG, Lovely LP, Chen-Mok M, y cols. Effect of the Yuzpe regimen of emergency contraception on markers of endometrial receptivity. *Human Reproduction* 15:2351-5, 2000.
- Rodríguez I, Grou F, Jly J. Effectiveness of emergency contraceptive pills between 72 and 120 hours after unprotected intercourse. *Am J Obstet Gynecol* 184:531-37, 2001.
- Trussell J, Koenig J, Ellertson C, Stewart F. Preventing Unintended Pregnancy: The Cost-Effectiveness of Three Methods of Emergency Contraception. *American Journal of Public Health* 1997; 87: 932-937.
- Trussell J, Rodríguez G, Ellertson Ch. Updated estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. *Contraception* 59:147-51, 1999.
- Trussell J, Ellertson Ch, von Hertzen H y col. Estimating the effectiveness of emergency contraception pills. *Contraception* 67:259-65, 2003.

- Society for Adolescent Medicine (USA). Provision of Emergency Contraception to Adolescents. Position paper. Preparado por Gold M, Sucato GS, Conard LAE, Adams Hilliard PJ. Journal of Adolescent Health 2004, 35:66-70.
- Vargas M Tapia A, Henríquez S, Quezada M, Reyes P, Cárdenas H, Noe G, Salvatierra A, Gangi L, Monroe D, Velasquez L, Croxatto HB. Efecto de la administración postovulatoria de levonorgestrel sobre el perfil de expresión de 20.383 genes durante el período de receptividad endometrial analizado por microarreglos de ADN. XIX Reunión Bienal de la Asociación latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana ALIRH. Cartagena de Indias, Colombia Mayo 10-13 de 2006.
- Vasilaskis C, Jick SS, Jick H. The risk of venous thromboembolism in users of postcoital contraceptive pills. Contraception 59:79, 1999.
- Von Hertzen H, Piaggio G, Ding J y cols. Low dose mifepristone and two regimnes of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomized trial. Lancet 360:1803-10, 2002.
- Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. New Engl J Med 333:1517-21, 1995.
- Wilcox AJ, Weinberg, CR, Baird DD. Post-ovulatory ageing of the human oocyte and embryo failure. Human Reproduction 1998; 13: 394-397.
- World Health Organization. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomized controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Lancet 352:428-33, 1998.
- World Health Organization (Organización Mundial de la Salud). Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Efficacy and side effects of immediate post coital levonorgestrel used repeatedly for contraception. Contraception 2000; 61:303-308.
- World Health Organization. Levonorgestrel for Emergency Contraception Fact Sheet - March 2005. [www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health)
- World Health Organization, Reproductive Health and Research. Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use. 3rd edition. Geneva, 2004. [www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health)
- World Health Organization, Reproductive Health and Research. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. 3rd edition. Geneva, 2005. [www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health)